

附件六 藥品給付規定修正對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
|--|--|--|
| <p>第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system</p> <p>1.1. 疼痛解除劑 Drugs used for pain relief</p> <p>1.1.1. 非類固醇抗發炎劑外用製劑：(88/9/1、92/2/1、94/9/1)</p> <p>1. 外用非類固醇抗發炎軟膏，限不適合口服非類固醇抗發炎製劑之軟組織風濕症或關節炎病患使用，每月至多以處方40gm為限(94/9/1)。</p> <p>2. Flurbiprofen 40mg patch (如 Flur Di Fen Patch)：限同時符合下列條件之病患使用：(92/2/1)</p> <p>(1)單一關節(部位)或軟組織風濕症。</p> <p>(2)不適合口服非類固醇抗發炎製劑者。</p> <p>(3)不得同時併用口服或其他外用非類固醇發炎製劑。</p> <p>(4)每月限處方十六片以內。</p> <p>1.1.2. 非類固醇抗發炎劑(NSAIDs)之注射劑：(88/12/1、97/7/1)</p> <p>1. 非類固醇抗發炎劑(NSAIDs)之注射劑(ketorolac成分之注射劑除外)：</p> <p>(1)限不能口服，且不能使用肛門栓劑之病患</p> | <p>第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system</p> <p>1.1. 疼痛解除劑 Drugs used for pain relief</p> <p>1.1.1. 非類固醇抗發炎劑外用製劑：(88/9/1、92/2/1、94/9/1)</p> <p>1. 外用非類固醇抗發炎軟膏，限不適合口服非類固醇抗發炎製劑之軟組織風濕症或關節炎病患使用，每月至多以處方40gm為限(94/9/1)。</p> <p>2. Flurbiprofen 40mg patch (如 Flur Di Fen Patch)：限同時符合下列條件之病患使用：(92/2/1)</p> <p>(1)單一關節(部位)或軟組織風濕症。</p> <p>(2)不適合口服非類固醇抗發炎製劑者。</p> <p>(3)不得同時併用口服或其他外用非類固醇發炎製劑。</p> <p>(4)每月限處方十六片以內。</p> <p>1.1.2. 非類固醇抗發炎劑(NSAIDs)之注射劑：(88/12/1、97/7/1)</p> <p>1. 非類固醇抗發炎劑(NSAIDs)之注射劑(ketorolac成分之注射劑除外)：</p> <p>(1)限不能口服，且不能使用肛門栓劑之病患</p> | <p>一、增修保險人暫予公告之藥品給付規定於本標準附件六。</p> <p>二、本附件之修正係依據本標準相關規定辦理，內容包括第一節、第二節、第四節、第五節、第八節、第九節、第十節、第十三節及第十四節。</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>使用。</p> <p>(2)本類藥品不可作為急性上呼吸道感染之例行或長期性使用。</p> <p>(3)使用本類藥品，每次不可連續超過五天。</p> <p>2. Ketorolac 成分之注射劑：(97/7/1)</p> <p>限用於無法口服之病人且為手術後中重度急性疼痛之短期治療（治療期間為≤5天），惟禁止使用於產科止痛。</p> <p>1.1.3. Tramadol (87/4/1) 限</p> <p>1. 癌症病例使用。</p> <p>2. 用於非癌症慢性頑固性疼痛（疼痛期超過六個月）之病人，需同時符合下述條件：(1)需為服用 NSAIDs 仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。</p> <p>(2)需檢附疼痛評估報告，內容需包括疼痛強度及疼痛緩解的 VAS 與 VRS (Visual Analogue Scale 和 Verbal Rating Scale)。</p> <p>1.1.4. Tramadol HCl + acetaminophen (如 Ultracet Tablets) (93/7/1、95/5/1)</p> <p>限用於中度至嚴重性疼痛之病人，需符合下述條件：</p> <p>1. 經其他止痛藥、或非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs) 治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。</p> | <p>使用。</p> <p>(2)本類藥品不可作為急性上呼吸道感染之例行或長期性使用。</p> <p>(3)使用本類藥品，每次不可連續超過五天。</p> <p>2. Ketorolac 成分之注射劑：(97/7/1)</p> <p>限用於無法口服之病人且為手術後中重度急性疼痛之短期治療（治療期間為≤5天），惟禁止使用於產科止痛。</p> <p>1.1.3. Tramadol (87/4/1) 限</p> <p>1. 癌症病例使用。</p> <p>2. 用於非癌症慢性頑固性疼痛（疼痛期超過六個月）之病人，需同時符合下述條件：(1)需為服用 NSAIDs 仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。</p> <p>(2)需檢附疼痛評估報告，內容需包括疼痛強度及疼痛緩解的 VAS 與 VRS (Visual Analogue Scale 和 Verbal Rating Scale)。</p> <p>1.1.4. Tramadol HCl + acetaminophen (如 Ultracet Tablets) (93/7/1、95/5/1)</p> <p>限用於中度至嚴重性疼痛之病人，需符合下述條件：</p> <p>1. 經其他止痛藥、或非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs) 治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>2. 非癌症病患使用超過五天時，需檢附疼痛評估報告，並每隔三個月再評估乙次，內容需包括疼痛強度及疼痛緩解的VAS與VRS (Visual Analogue Scale 和 Verbal Rating Scale)。</p> <p>1.1.5. 非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品 (如 celecoxib、nabumetone、meloxicam、etodolac、nimesulide) (90/7/1、97/9/1) etoricoxib (96/1/1、99/10/1)、含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑 (101/10/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合下列條件之一者 (99/10/1)：</p> <p>(1) 年齡大於等於六十歲之骨關節炎病患。</p> <p>(2) 類風濕性關節炎、僵直性脊髓炎、乾癱性關節炎等慢性病發炎性關節病變，需長期使用非類固醇抗發炎劑者。</p> <p>(3) 合併有急性嚴重創傷、急性中風及急性心血管事件者 (97/2/1)。</p> <p>(4) 同時併有腎上腺類固醇之患者。</p> <p>(5) 曾有消化性潰瘍、上消化道出血或胃穿孔病史者。</p> | <p>2. 非癌症病患使用超過五天時，需檢附疼痛評估報告，並每隔三個月再評估乙次，內容需包括疼痛強度及疼痛緩解的VAS與VRS (Visual Analogue Scale 和 Verbal Rating Scale)。</p> <p>1.1.5. 非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品 (如 celecoxib、nabumetone、meloxicam、etodolac、nimesulide) (90/7/1、97/9/1) etoricoxib (96/1/1、99/10/1)、含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑 (101/10/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合下列條件之一者 (99/10/1)：</p> <p>(1) 年齡大於等於六十歲之骨關節炎病患。</p> <p>(2) 類風濕性關節炎、僵直性脊髓炎、乾癱性關節炎等慢性病發炎性關節病變，需長期使用非類固醇抗發炎劑者。</p> <p>(3) 合併有急性嚴重創傷、急性中風及急性心血管事件者 (97/2/1)。</p> <p>(4) 同時併有腎上腺類固醇之患者。</p> <p>(5) 曾有消化性潰瘍、上消化道出血或胃穿孔病史者。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(6)同時併有抗凝血劑者。</p> <p>(7)肝硬化患者。</p> <p>2. 使用本類製劑之病患不得預防性併用乙型組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦阻斷劑及其他消化性潰瘍用藥，亦不得合併使用前列腺素劑（如 misoprostol）</p> <p>3. Nimesulide 限用於急性疼痛緩解，其連續處方不得超過 15 日（97/9/1）。</p> <p>4. 含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑不得作為急性疼痛的初始治療。（101/10/1）</p> <p>1. 1. 6. Gabapentin、lidocaine 貼片劑（97/12/1、98/4/1、98/9/1、101/2/1、101/5/1、102/2/1）限使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：</p> <p>1. 使用其他止痛劑或非類固醇抗發炎劑（NSAIDs）藥品治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。（97/12/1、98/4/1）</p> <p>2. Gabapentin 成分口服製劑，限每日最大劑量為 3,600mg，且日劑量超過 2,400mg 時，需於病歷記載理由。臨床症狀改善，應逐步調低劑量。（97/12/1、98/4/1、98/9/1、</p> | <p>(6)同時併有抗凝血劑者。</p> <p>(7)肝硬化患者。</p> <p>2. 使用本類製劑之病患不得預防性併用乙型組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦阻斷劑及其他消化性潰瘍用藥，亦不得合併使用前列腺素劑（如 misoprostol）</p> <p>3. Nimesulide 限用於急性疼痛緩解，其連續處方不得超過 15 日（97/9/1）。</p> <p>4. 含 naproxen 及 esomeprazole 複方製劑不得作為急性疼痛的初始治療。（101/10/1）</p> <p>1. 1. 6. Gabapentin、lidocaine 貼片劑（97/12/1、98/4/1、98/9/1、101/2/1、101/5/1、102/2/1）限使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：</p> <p>1. 使用其他止痛劑或非類固醇抗發炎劑（NSAIDs）藥品治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。（97/12/1、98/4/1）</p> <p>2. Gabapentin 成分口服製劑，限每日最大劑量為 3,600mg，且日劑量超過 2,400mg 時，需於病歷記載理由。臨床症狀改善，應逐步調低劑量。（97/12/1、98/4/1、98/9/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>101/5/1)</p> <p>3.Lidocaine 貼片劑(限使用 Lidopat Patch)： (98/9/1)</p> <p>(1)限每日最大劑量為 3 片，且日劑量超過 2 片時，需於病歷記載理由。臨床症狀改善，應逐步調低劑量。限使用 Lidopat Patch。(98/9/1)</p> <p>(2)Lidopat 貼片劑不得與 gabapentin 或 pregabalin 成分口服製劑併用。 (101/2/1)</p> <p>1.1.7.Pregabalin(如 Lyrica) (101/2/1、102/2/1、105/1/1)</p> <p>1. 使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：</p> <p>(1)經使用其他止痛劑或非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。 (97/12/1、98/4/1)</p> <p>(2)每日最大劑量為 600mg。</p> <p>2. 使用於纖維肌痛 (fibromyalgia)</p> <p>(1)需符合 American College of Rheumatology (ACR) 及臨床試驗實證纖維肌痛診斷標準： I.WPI(wide spread pain index)≥7、Symptom severity</p> | <p>101/5/1)</p> <p>3.Lidocaine 貼片劑(限使用 Lidopat Patch)： (98/9/1)</p> <p>(1)限每日最大劑量為 3 片，且日劑量超過 2 片時，需於病歷記載理由。臨床症狀改善，應逐步調低劑量。限使用 Lidopat Patch。(98/9/1)</p> <p>(2)Lidopat 貼片劑不得與 gabapentin 或 pregabalin 成分口服製劑併用。 (101/2/1)</p> <p>1.1.7.Pregabalin(如 Lyrica) (101/2/1、102/2/1、105/1/1)</p> <p>1. 使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：</p> <p>(1)經使用其他止痛劑或非類固醇抗發炎劑 (NSAIDs) 藥品治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。 (97/12/1、98/4/1)</p> <p>(2)每日最大劑量為 600mg。</p> <p>2. 使用於纖維肌痛 (fibromyalgia)</p> <p>(1)需符合 American College of Rheumatology (ACR) 及臨床試驗實證纖維肌痛診斷標準： I.WPI(wide spread pain index)≥7、Symptom severity</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(SS)≥5 且 pain rating scale≥6 分或 WPI 3-6、SS scale≥9 且 pain rating scale≥6 分。</p> <p>II. 症狀持續超過三個月。</p> <p>III. 應排除其他疾病因素，並於病歷詳載。</p> <p>(2)限風濕免疫科、神經內科、復健科及疼痛專科醫師使用，不得併用同適應症之它類藥品。</p> <p>(3)如使用 3 個月後 pain rating scale 未減少 2 分以上應予停藥。</p> <p>(4)病歷每 3 個月應記載一次評估結果，每日最大劑量為 450mg。</p> <p>3. 使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件 (105/1/1):</p> <p>(1)經神經科專科醫師診斷或經神經傳導 (NCV) 檢查證實之多發性神經病變 (polyneuropathy)。</p> <p>(2)Pain rating scale≥4 分。</p> <p>(3)不得併用同類適應症之藥品。</p> <p>(4)使用後應每 3 個月評估一次，並於病歷中記載評估結果，倘</p> | <p>(SS)≥5 且 pain rating scale≥6 分或 WPI 3-6、SS scale≥9 且 pain rating scale≥6 分。</p> <p>II. 症狀持續超過三個月。</p> <p>III. 應排除其他疾病因素，並於病歷詳載。</p> <p>(2)限風濕免疫科、神經內科、復健科及疼痛專科醫師使用，不得併用同適應症之它類藥品。</p> <p>(3)如使用 3 個月後 pain rating scale 未減少 2 分以上應予停藥。</p> <p>(4)病歷每 3 個月應記載一次評估結果，每日最大劑量為 450mg。</p> <p>3. 使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件 (105/1/1):</p> <p>(1)經神經科專科醫師診斷或經神經傳導 (NCV) 檢查證實之多發性神經病變 (polyneuropathy)。</p> <p>(2)Pain rating scale≥4 分。</p> <p>(3)不得併用同類適應症之藥品。</p> <p>(4)使用後應每 3 個月評估一次，並於病歷中記載評估結果，倘</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Pain rating scale 較前一次評估之數值未改善或未持續改善，應予停止使用。</p> <p>(5)每日最大劑量為 300 mg。</p> <p>1.1.8. Duloxetine (如 Cymbalta)： (102/8/1、105/2/1)</p> <p>1. 使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件：</p> <p>(1)經神經科專科醫師診斷或經神經傳導 (NCV) 檢查證實之多發性神經病變 (polyneuropathy)。</p> <p>(2)Pain rating scale \geq 4 分。</p> <p>(3)<u>不得併用同類適應症之藥品。</u></p> <p>(4)<u>使用後應每 3 個月評估一次，並於病歷中記載評估結果，倘 Pain rating scale 較前一次評估之數值未改善或未持續改善，應予停止使用。</u></p> <p>(5)<u>每日最大劑量為 60 mg。</u></p> <p>2. 使用於纖維肌痛 (fibromyalgia)(105/2/1)</p> <p>(1)需符合 <u>American College of Rheumatology (ACR) 及臨床試驗實證纖維肌痛診斷標準：</u></p> | <p>Pain ratingscale 較前一次評估之數值未改善或未持續改善，應予停止使用。</p> <p>(5)每日最大劑量為 300 mg。</p> <p>1.1.8. Duloxetine (如 Cymbalta)：(102/8/1)</p> <p>1. 使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件：</p> <p>(1)經神經科專科醫師診斷或經神經傳導 (NCV) 檢查證實之多發性神經病變 (polyneuropathy)。</p> <p>(2)Pain rating scale \geq 4 分。</p> <p>2. <u>不得併用同類適應症之藥品。</u></p> <p>3. <u>使用後應每 3 個月評估一次，並於病歷中記載評估結果，倘 Pain rating scale 較前一次評估之數值未改善或未持續改善，應予停止使</u></p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>I. WPI(wide spread pain index) ≥ 7、Symptom severity (SS) ≥ 5 且 pain rating scale ≥ 6 分或 WPI 3-6、SS scale ≥ 9 且 pain rating scale ≥ 6 分。</u></p> <p><u>II. 症狀持續超過三個月。</u></p> <p><u>III. 應排除其他疾病因素，並於病歷詳載。</u></p> <p><u>(2) 限風濕免疫科、神經內科、復健科、疼痛專科及精神科醫師使用，不得併用同適應症之它類藥品。</u></p> <p><u>(3) 如使用 3 個月後 pain rating scale 未減少 2 分以上應予停藥。</u></p> <p><u>(4) 病歷每 3 個月應記載一次評估結果，每日最大劑量為 60mg。</u></p> <p>1. 2. 精神治療劑 Psychotherapeutic drugs</p> <p>1. 2. 1. 選擇性血清促進素再吸收抑制劑 (SSRI)、血清促進素及正腎上腺素再吸收抑制劑 (SNRI) 及其他抗憂鬱劑 (fluvoxamine maleate、fluoxetine、paroxetine、sertraline、venlafaxine、milnacipran、</p> | <p>用。</p> <p>4. 每日最大劑量為 60 mg。</p> <p>1. 2. 精神治療劑 Psychotherapeutic drugs</p> <p>1. 2. 1. 選擇性血清促進素再吸收抑制劑 (SSRI)、血清促進素及正腎上腺素再吸收抑制劑 (SNRI) 及其他抗憂鬱劑 (fluvoxamine maleate、fluoxetine、paroxetine、sertraline、venlafaxine、milnacipran、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>mirtazapine、 citalopram、 escitalopram、 duloxetine、 agomelatine 等製劑)： (88/12/1、89/10/1、 91/5/1、92/6/1、 93/5/1、94/2/1、 94/12/1、99/10/1、 101/7/1)</p> <p>使用時病歷上應詳細註 明診斷依據及使用理 由。</p> <p>1.2.1.1. Bupropion HCL： (92/1/1、99/10/1) 作為戒菸治療者不予給 付。</p> <p>1.2.2. 抗精神病劑 Antipsychotics</p> <p>1.2.2.1. Clozapine (如 Clozaril)</p> <p>1. 限精神科專科醫師使 用。</p> <p>2. 前 18 週使用時，每週需 作白血球檢驗，每次處 方以七日為限，使用 18 週後，每月作一次白血 球檢驗。</p> <p>3. 申報費用時，應檢附白 血球檢驗報告。</p> <p>1.2.2.2. Second generation antipsychotics (簡稱第 二代抗精神病藥品，如 clozapine、 olanzapine、 risperidone、 quetiapine、 amisulpride、 ziprasidone、 aripiprazole、</p> | <p>mirtazapine、 citalopram、 escitalopram、 duloxetine、 agomelatine 等製劑)： (88/12/1、89/10/1、 91/5/1、92/6/1、 93/5/1、94/2/1、 94/12/1、99/10/1、 101/7/1)</p> <p>使用時病歷上應詳細註 明診斷依據及使用理 由。</p> <p>1.2.1.1. Bupropion HCL： (92/1/1、99/10/1) 作為戒菸治療者不予給 付。</p> <p>1.2.2. 抗精神病劑 Antipsychotics</p> <p>1.2.2.1. Clozapine (如 Clozaril)</p> <p>1. 限精神科專科醫師使 用。</p> <p>2. 前 18 週使用時，每週需 作白血球檢驗，每次處 方以七日為限，使用 18 週後，每月作一次白血 球檢驗。</p> <p>3. 申報費用時，應檢附白 血球檢驗報告。</p> <p>1.2.2.2. Second generation antipsychotics (簡稱第 二代抗精神病藥品，如 clozapine、 olanzapine、 risperidone、 quetiapine、 amisulpride、 ziprasidone、 aripiprazole、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>paliperidone、 lurasidone 等)： (91/9/1、92/1/1、 92/7/1、94/1/1、 95/10/1、97/5/1、 99/10/1、106/1/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合 下列條件(95/10/1、 97/5/1、99/10/1、 106/1/1)：</p> <p>(1)開始使用「第二代抗 精神病藥品」時需於 病歷記載： 醫療理由或診斷，以 及臨床整體評估表 (Clinical Global Impression，簡稱 CGI) 之分數。</p> <p>(2)經規則使用六至八週 後，需整體評估其療 效，並於病歷記載： 臨床整體評估表之分 數。</p> <p>(3)日劑量超過下列治療 劑量時，需於病歷記 載理由：</p> <p>clozapine 400 mg/day risperidone 6 mg/day olanzapine 20 mg/day quetiapine 600 mg/day amisulpride 800mg/day (92/1/1) ziprasidone 120mg/day (92/7/1) aripiprazole 15mg/day (94/1/1)</p> | <p>paliperidone 等)： (91/9/1、92/1/1、 92/7/1、94/1/1、 95/10/1、97/5/1、 99/10/1)</p> <p>1. 本類製劑之使用需符合 下列條件(95/10/1、 97/5/1、99/10/1)：</p> <p>(1)開始使用「第二代抗 精神病藥品」時需於 病歷記載： 醫療理由或診斷，以 及臨床整體評估表 (Clinical Global Impression，簡稱 CGI) 之分數。</p> <p>(2)經規則使用六至八週 後，需整體評估其療 效，並於病歷記載： 臨床整體評估表之分 數。</p> <p>(3)日劑量超過下列治療 劑量時，需於病歷記 載理由：</p> <p>clozapine 400 mg/day risperidone 6 mg/day olanzapine 20 mg/day quetiapine 600 mg/day amisulpride 800mg/day (92/1/1) ziprasidone 120mg/day (92/7/1) aripiprazole 15mg/day (94/1/1)</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>paliperidone 12mg/day (97/5/1) <u>lurasidone</u> <u>120mg/day</u> <u>(106/1/1)</u></p> <p>2. 本類藥品不得使用於雙極性疾患之鬱症發作。(95/10/1)</p> <p>3. Olanzapine 用於預防雙極性疾患復發時，限 lithium、carbamazepine、valproate 等藥品至少使用兩種以上，治療無效或無法耐受副作用時使用。(95/10/1)</p> <p>1. 2. 3. Zaleplon、zolpidem、zopiclone 及 eszopiclone (98/1/1、98/5/1、98/10/1、102/11/1)</p> <p>1. 使用安眠藥物，病歷應詳載病人發生睡眠障礙的情形，並作適當的評估和診斷，探討可能的原因，並提供衛教建立良好睡眠習慣。(98/5/1)</p> <p>2. 非精神科醫師、神經科專科醫師若需開立本類藥品，每日不宜超過一顆，連續治療期間不宜超過 6 個月。若因病情需長期使用，病歷應載明原因，必要時轉精神科、神經科專科醫師評估其繼續使用的適當性。(98/5/1、98/10/1)</p> <p>3. 精神科、神經科專科醫師應針對必須連續使用</p> | <p>paliperidone 12mg/day (97/5/1)</p> <p>2. 本類藥品不得使用於雙極性疾患之鬱症發作。(95/10/1)</p> <p>3. Olanzapine 用於預防雙極性疾患復發時，限 lithium、carbamazepine、valproate 等藥品至少使用兩種以上，治療無效或無法耐受副作用時使用。(95/10/1)</p> <p>1. 2. 3. Zaleplon、zolpidem、zopiclone 及 eszopiclone (98/1/1、98/5/1、98/10/1、102/11/1)</p> <p>1. 使用安眠藥物，病歷應詳載病人發生睡眠障礙的情形，並作適當的評估和診斷，探討可能的原因，並提供衛教建立良好睡眠習慣。(98/5/1)</p> <p>2. 非精神科醫師、神經科專科醫師若需開立本類藥品，每日不宜超過一顆，連續治療期間不宜超過 6 個月。若因病情需長期使用，病歷應載明原因，必要時轉精神科、神經科專科醫師評估其繼續使用的適當性。(98/5/1、98/10/1)</p> <p>3. 精神科、神經科專科醫師應針對必須連續使用</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>本藥的個案，提出合理的診斷，並在病歷上詳細記錄。(98/5/1、98/10/1)</p> <p>4. 依一般使用指引不建議各種安眠藥併用，應依睡眠障礙型態處方安眠藥，若需不同半衰期之藥物併用應有明確之睡眠障礙型態描述紀錄，且應在合理劑量範圍內。(98/5/1)</p> <p>5. 對於首次就診尚未建立穩定醫病關係之病患，限處方7日內安眠藥管制藥品。(98/5/1)</p> <p>6. zaleplon 成分藥品用於治療難以入睡之失眠病人，僅適用於嚴重，病人功能障礙或遭受極度壓力之失眠症患者，用於65歲以上病患時，起始劑量為每日5mg (98/1/1、98/10/1)</p> <p>7. 成人病患使用eszopiclone 成分藥品之起始劑量為睡前1mg，最高劑量為睡前3mg，65歲以上病患之最高劑量為2mg。(102/11/1)</p> <p>1.3. 神經藥物 Neurologic drugs</p> <p>1.3.1. 骨骼肌鬆弛劑 Skeletal muscle relaxants</p> <p>1.3.1.1. Tizanidine HCl (如 Sirdalud tab)：(90/10/1)</p> <p>限下列病患使用</p> | <p>本藥的個案，提出合理的診斷，並在病歷上詳細記錄。(98/5/1、98/10/1)</p> <p>4. 依一般使用指引不建議各種安眠藥併用，應依睡眠障礙型態處方安眠藥，若需不同半衰期之藥物併用應有明確之睡眠障礙型態描述紀錄，且應在合理劑量範圍內。(98/5/1)</p> <p>5. 對於首次就診尚未建立穩定醫病關係之病患，限處方7日內安眠藥管制藥品。(98/5/1)</p> <p>6. zaleplon 成分藥品用於治療難以入睡之失眠病人，僅適用於嚴重，病人功能障礙或遭受極度壓力之失眠症患者，用於65歲以上病患時，起始劑量為每日5mg (98/1/1、98/10/1)</p> <p>7. 成人病患使用eszopiclone 成分藥品之起始劑量為睡前1mg，最高劑量為睡前3mg，65歲以上病患之最高劑量為2mg。(102/11/1)</p> <p>1.3. 神經藥物 Neurologic drugs</p> <p>1.3.1. 骨骼肌鬆弛劑 Skeletal muscle relaxants</p> <p>1.3.1.1. Tizanidine HCl (如 Sirdalud tab)：(90/10/1)</p> <p>限下列病患使用</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. 神經系統疾病引起痙攣症狀之病例。</p> <p>2. 急性疼痛性肌肉痙攣病例。</p> <p>1.3.2. 抗癲癇劑 Antiepileptic drugs</p> <p>1.3.2.1. Sodium valproate 注射劑 (如 Depakine Lyophilized Injection)(89/7/1、93/2/1、93/6/1、102/10/1)</p> <p>限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：</p> <p>1. 對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 valproic acid 之病患。</p> <p>2. 癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。</p> <p>3. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患。</p> <p>1.3.2.2. Gabapentin (如 Neurontin)、vigabatrin (如 Sabril)、tiagabine (如 Gabitril)、pregabalin(如 Lyrica)、zonisamide(如 Zonegran)、perampanel(如 Fycompa)、lacosamide(如 Vimpat)：(89/9/1、89/2/1、93/6/1、96/3/1、97/1/1、97/10/1、101/2/1、102/1/1、104/6/1、</p> | <p>1. 神經系統疾病引起痙攣症狀之病例。</p> <p>2. 急性疼痛性肌肉痙攣病例。</p> <p>1.3.2. 抗癲癇劑 Antiepileptic drugs</p> <p>1.3.2.1. Sodium valproate 注射劑 (如 Depakine Lyophilized Injection)(89/7/1、93/2/1、93/6/1、102/10/1)</p> <p>限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：</p> <p>1. 對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 valproic acid 之病患。</p> <p>2. 癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。</p> <p>3. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患。</p> <p>1.3.2.2. Gabapentin (如 Neurontin)、vigabatrin (如 Sabril)、tiagabine (如 Gabitril)、pregabalin(如 Lyrica)、zonisamide(如 Zonegran)、perampanel(如 Fycompa)、lacosamide(如 Vimpat)：(89/9/1、89/2/1、93/6/1、96/3/1、97/1/1、97/10/1、101/2/1、102/1/1、104/6/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>104/11/1) 限用於其他抗癲癇藥物 無法有效控制之局部癲 癇發作之輔助性治療 (add on therapy)。</p> <p>1. 3. 2. 3. Topiramate (如 Topamax)(90/9/1、 92/11/1、93/6/1、 94/3/1、94/9/1、 95/1/1、99/5/1、 99/10/1)</p> <p>限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物 無法有效控制之局部癲 癇發作之輔助治療(add on therapy)或作為第二 線之單一藥物治療。</p> <p>2. 用於預防偏頭痛之治療 (94/3/1、94/9/1、 95/1/1、99/5/1、 99/10/1)</p> <p>(1)限符合國際頭痛協會 偏頭痛診斷標準並有 以下任一狀況之偏頭 痛患者，且對現有預 防藥物療效不佳或無 法忍受副作用或有使 用禁忌者使用。</p> <p>I. 即使使用急性藥 物，反覆發作偏頭 痛已嚴重影響到患 者的日常生活。</p> <p>II. 特殊病例，如偏 癱性偏頭痛、基底 性偏頭痛、偏頭痛 之前預兆時間過長 或是偏頭痛梗塞 等。</p> <p>III. 偏頭痛發作頻 繁，每星期 2 次</p> | <p>104/11/1) 限用於其他抗癲癇藥物 無法有效控制之局部癲 癇發作之輔助性治療 (add on therapy)。</p> <p>1. 3. 2. 3. Topiramate (如 Topamax)(90/9/1、 92/11/1、93/6/1、 94/3/1、94/9/1、 95/1/1、99/5/1、 99/10/1)</p> <p>限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物 無法有效控制之局部癲 癇發作之輔助治療(add on therapy)或作為第二 線之單一藥物治療。</p> <p>2. 用於預防偏頭痛之治療 (94/3/1、94/9/1、 95/1/1、99/5/1、 99/10/1)</p> <p>(1)限符合國際頭痛協會 偏頭痛診斷標準並有 以下任一狀況之偏頭 痛患者，且對現有預 防藥物療效不佳或無 法忍受副作用或有使 用禁忌者使用。</p> <p>I. 即使使用急性藥 物，反覆發作偏頭 痛已嚴重影響到患 者的日常生活。</p> <p>II. 特殊病例，如偏 癱性偏頭痛、基底 性偏頭痛、偏頭痛 之前預兆時間過長 或是偏頭痛梗塞 等。</p> <p>III. 偏頭痛發作頻 繁，每星期 2 次</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(含)以上。</p> <p>(2)Topiramate 每日治療劑量超過 100mg 時，需於病歷詳細記載使用理由。</p> <p>1.3.2.4. Levetiracetam (101/6/1、102/10/1)</p> <p>1. 一般錠劑膠囊劑 (如 Keppra Film-Coated Tablets)：(97/1/1、101/6/1)</p> <p>(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>(2)十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作之輔助治療。</p> <p>2. 緩釋錠劑膠囊劑 (如 UFree ER、Nobelin XR)：(101/6/1)</p> <p>限使用於十六歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。</p> <p>3. 口服液劑 (如 Keppra Oral Solution)：(97/4/1)</p> <p>限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy)。</p> <p>4. 注射劑 (如 Keppra 濃縮輸注液)：(101/3/1、102/10/1)</p> <p>限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：</p> | <p>(含)以上。</p> <p>(2)Topiramate 每日治療劑量超過 100mg 時，需於病歷詳細記載使用理由。</p> <p>1.3.2.4. Levetiracetam (101/6/1、102/10/1)</p> <p>1. 一般錠劑膠囊劑 (如 Keppra Film-Coated Tablets)：(97/1/1、101/6/1)</p> <p>(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>(2)十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作之輔助治療。</p> <p>2. 緩釋錠劑膠囊劑 (如 UFree ER、Nobelin XR)：(101/6/1)</p> <p>限使用於十六歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。</p> <p>3. 口服液劑 (如 Keppra Oral Solution)：(97/4/1)</p> <p>限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy)。</p> <p>4. 注射劑 (如 Keppra 濃縮輸注液)：(101/3/1、102/10/1)</p> <p>限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>1. 對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 levetiracetam 之病患。</p> <p>2. 癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。</p> <p>3. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患。</p> <p>1.3.2.5. Lamotrigine (如 Lamictal) (97/10/1) 限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>2. 限使用於 18 歲以上成人且為雙極性疾患者，並依下列原則使用：</p> <p>(1) 急性鬱期：限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或治療後由鬱症轉為躁症之個案。</p> <p>(2) 雙極性疾患之鬱症預防：限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或無法耐受其副作用者，單純用於躁症預防者不得使用。</p> | <p>1. 對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 levetiracetam 之病患。</p> <p>2. 癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。</p> <p>3. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患。</p> <p>1.3.2.5. Lamotrigine (如 Lamictal) (97/10/1) 限下列病患使用：</p> <p>1. 限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。</p> <p>2. 限使用於 18 歲以上成人且為雙極性疾患者，並依下列原則使用：</p> <p>(1) 急性鬱期：限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或治療後由鬱症轉為躁症之個案。</p> <p>(2) 雙極性疾患之鬱症預防：限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或無法耐受其副作用者，單純用於躁症預防者不得使用。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(3)日劑量超過 200mg 時，需於病歷記載理由。</p> <p>1.3.2.6 Carbamazepine (100/8/1)</p> <p>1. 使用於新病患：</p> <p>(1)處方使用 carbamazepine 成分藥品之前，應先檢查病患 IC 健保卡是否已註記曾檢測帶有 HLA-B 1502 基因，檢測結果為陽性者，不得開立 carbamazepine 成分藥品之處方。</p> <p>(2)醫師欲為病患處方 carbamazepine 成分藥品前，應先詢問病患是否對該藥品有過敏病史，若為不確認者或未檢測者，宜先行作 HLA-B 1502 基因檢測。</p> <p>2. 使用於舊病患： 若病患已服用 4 個月以上，且確認未曾出現喉嚨痛、嘴巴破或皮膚症狀（如分散的斑點或斑丘疹症狀）等類似 Steven-Johnson 症候群或其他不良反應時，可依病情繼續處方治療，但仍需提醒病患注意上述症狀之發生。</p> <p>3. 醫師為病患處方使用 carbamazepine 成分藥品，以日劑藥費申報者，應依規定詳實申報處方明細。</p> <p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> | <p>(3)日劑量超過 200mg 時，需於病歷記載理由。</p> <p>1.3.2.6 Carbamazepine (100/8/1)</p> <p>1. 使用於新病患：</p> <p>(1)處方使用 carbamazepine 成分藥品之前，應先檢查病患 IC 健保卡是否已註記曾檢測帶有 HLA-B 1502 基因，檢測結果為陽性者，不得開立 carbamazepine 成分藥品之處方。</p> <p>(2)醫師欲為病患處方 carbamazepine 成分藥品前，應先詢問病患是否對該藥品有過敏病史，若為不確認者或未檢測者，宜先行作 HLA-B 1502 基因檢測。</p> <p>2. 使用於舊病患： 若病患已服用 4 個月以上，且確認未曾出現喉嚨痛、嘴巴破或皮膚症狀（如分散的斑點或斑丘疹症狀）等類似 Steven-Johnson 症候群或其他不良反應時，可依病情繼續處方治療，但仍需提醒病患注意上述症狀之發生。</p> <p>3. 醫師為病患處方使用 carbamazepine 成分藥品，以日劑藥費申報者，應依規定詳實申報處方明細。</p> <p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>1. 限用於依 NINDS-ADRDA 或 DSM 或 ICD 標準診斷為阿滋海默氏症或帕金森氏症之失智症病患。</p> <p>2. 如有腦中風病史，臨床診斷為「血管性失智症」，或有嚴重心臟傳導阻斷 (heart block) 之病患，不建議使用。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用，第一次申請須檢附以下資料：</p> <p>(1)CT、MRI 或哈金斯氏量表 (Hachinski Ischemic Score) 三項其中之任一結果報告。</p> <p>(2)CBC, VDRL, BUN, Creatinine, GOT, GPT, T4, TSH 檢驗。</p> <p>(3)病歷摘要。</p> <p>(4)MMSE 或 CDR 智能測驗報告。</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症 由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症： 限使用 donepezil、rivastigmine 及 galantamine 口服製劑(90/10/1、92/1/1、95/6/1、100/3/1、102/8/1)：</p> <p>i. 智能測驗結果為</p> | <p>1. 限用於依 NINDS-ADRDA 或 DSM 或 ICD 標準診斷為阿滋海默氏症或帕金森氏症之失智症病患。</p> <p>2. 如有腦中風病史，臨床診斷為「血管性失智症」，或有嚴重心臟傳導阻斷 (heart block) 之病患，不建議使用。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用，第一次申請須檢附以下資料：</p> <p>(1)CT、MRI 或哈金斯氏量表 (Hachinski Ischemic Score) 三項其中之任一結果報告。</p> <p>(2)CBC, VDRL, BUN, Creatinine, GOT, GPT, T4, TSH 檢驗。</p> <p>(3)病歷摘要。</p> <p>(4)MMSE 或 CDR 智能測驗報告。</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症 由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症： 限使用 donepezil、rivastigmine 及 galantamine 口服製劑(90/10/1、92/1/1、95/6/1、100/3/1、102/8/1)：</p> <p>i. 智能測驗結果為</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。</p> <p>ii. 使用前述三種藥品任一種後，三個月內，因副作用得換用本類另一種藥物，不需另外送審，惟仍應於病歷上記載換藥理由。其中 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品，倘因副作用，需換用 donepezil、rivastigmine 或 galantamine 口服製劑之另一種藥物，需另經事前審查核准後使用。(93/4/1、102/8/1)</p> <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如</p> | <p>MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。</p> <p>ii. 使用前述三種藥品任一種後，三個月內，因副作用得換用本類另一種藥物，不需另外送審，惟仍應於病歷上記載換藥理由。其中 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品，倘因副作用，需換用 donepezil、rivastigmine 或 galantamine 口服製劑之另一種藥物，需另經事前審查核准後使用。(93/4/1、102/8/1)</p> <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)</p> <p>iv. 使用 rivastigmine 貼片劑(如 Exelon Patch)，每日限用一片，且不得併用同成分之口服藥品(100/3/1)。</p> <p>II. 中重度失智症：限使用 memantine 口服製劑(95/6/1、99/10/1、102/8/1)</p> <p>i. 智能測驗結果為 $10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級之患者。</p> <p>ii. 曾使用過 donepezil, rivastigmine, galantamine 其中任一種藥品之患者，若不再適用上述其中任一藥物，且 MMSE 或 CDR 智能測驗達標準($10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級)，並經事前審查核准後得換用 memantine。惟 memantine 不得與前項三種藥品併用。</p> | <p>MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)</p> <p>iv. 使用 rivastigmine 貼片劑(如 Exelon Patch)，每日限用一片，且不得併用同成分之口服藥品(100/3/1)。</p> <p>II. 中重度失智症：限使用 memantine 口服製劑(95/6/1、99/10/1、102/8/1)</p> <p>i. 智能測驗結果為 $10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級之患者。</p> <p>ii. 曾使用過 donepezil, rivastigmine, galantamine 其中任一種藥品之患者，若不再適用上述其中任一藥物，且 MMSE 或 CDR 智能測驗達標準($10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級)，並經事前審查核准後得換用 memantine。惟 memantine 不得與前項三種藥品併用。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 2 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)</p> <p>III. 重度失智症： (99/10/1、102/8/1) 限使用 donepezil 及 memantine 口服製劑 (102/8/1)</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 5-9 分且 CDR 3 級之患者。</p> <p>ii. 臥床或無行動能力者不得使用。</p> <p>iii. 曾使用過 memantine, donepezil, rivastigmine, galantamine 而不再適用者，不得使用。</p> <p>iv. donepezil 及</p> | <p>iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 2 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)</p> <p>III. 重度失智症： (99/10/1、102/8/1) 限使用 donepezil 及 memantine 口服製劑 (102/8/1)</p> <p>i. 智能測驗結果為 MMSE 5-9 分且 CDR 3 級之患者。</p> <p>ii. 臥床或無行動能力者不得使用。</p> <p>iii. 曾使用過 memantine, donepezil, rivastigmine, galantamine 而不再適用者，不得使用。</p> <p>iv. donepezil 及</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>memantine 二者不能併用。</p> <p>v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets、Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 5 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。</p> <p>(99/10/1、102/8/1)</p> <p>(2) 帕金森氏症之失智症 (99/5/1、100/3/1、102/8/1)</p> <p>限神經科醫師診斷及處方使用於輕度至中度之失智症。</p> <p>限使用 rivastigmine 口服製劑 (102/8/1)</p> <p>I. 智能測驗結果為 MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。</p> <p>II. 失智症發生於帕金森氏症診斷至少一年以後。</p> <p>III. 使用後每一年需</p> | <p>memantine 二者不能併用。</p> <p>v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets、Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 5 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。</p> <p>(99/10/1、102/8/1)</p> <p>(2) 帕金森氏症之失智症 (99/5/1、100/3/1、102/8/1)</p> <p>限神經科醫師診斷及處方使用於輕度至中度之失智症。</p> <p>限使用 rivastigmine 口服製劑 (102/8/1)</p> <p>I. 智能測驗結果為 MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。</p> <p>II. 失智症發生於帕金森氏症診斷至少一年以後。</p> <p>III. 使用後每一年需</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(99/5/1、102/8/1)</p> <p>備註:起步治療定義:係指同組藥品第一次申請同意治療之評分</p> <p>1.3.4. 帕金森氏症治療藥品:(91/11/1、93/2/1、95/9/1、96/9/1、97/7/1、100/6/1、101/6/1)</p> <p>1. 如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine)，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone: 如 Comtan film-coated tab.)</p> <p>2. Levodopa + carbidopa + entacapone 三合一製劑 (如 Stalevo Film-Coated Tablets 150/37.5/200mg 等 3 品項):</p> <p>限用於表現藥效終期運動功能波動現象，以左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑無法達到穩定治療效</p> | <p>重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(99/5/1、102/8/1)</p> <p>備註:起步治療定義:係指同組藥品第一次申請同意治療之評分</p> <p>1.3.4. 帕金森氏症治療藥品:(91/11/1、93/2/1、95/9/1、96/9/1、97/7/1、100/6/1、101/6/1)</p> <p>1. 如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine)，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone: 如 Comtan film-coated tab.)</p> <p>2. Levodopa + carbidopa + entacapone 三合一製劑 (如 Stalevo Film-Coated Tablets 150/37.5/200mg 等 3 品項):</p> <p>限用於表現藥效終期運動功能波動現象，以左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑無法達到穩定治療效</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>果之巴金森氏症病人。 (95/9/1)</p> <p>3. 若已同時使用上述藥物且達高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症（如異動症或肌強直），需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。</p> <p>4. Rasagiline：(101/6/1) (1) 可單獨使用，每日最高劑量為 1 mg；或與 levodopa 併用，rasagiline 每日最高劑量為 0.5 mg。 (2) 本品不得與 levodopa 以外之其他帕金森氏症治療藥品併用。</p> <p>5. Pramipexole 及 ropinirole 用於治療原發性腿部躁動症時需先排除腎衰竭、鐵缺乏症及多發性神經病變，且不得與 dopamine agonist 及 levodopa 併用。(96/9/1、97/7/1) (1) pramipexole 每日最大劑量為 0.75mg。(96/9/1) (2) ropinirole 每日最大劑量為 4mg。(97/7/1)</p> <p>6. Rotigotine 貼片劑（如 Neupro Patch），限用於原發性帕金森氏症，每日限用一片，且不得併用其他 dopamine agonist 之口服藥品</p> | <p>果之巴金森氏症病人。 (95/9/1)</p> <p>3. 若已同時使用上述藥物且達高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症（如異動症或肌強直），需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。</p> <p>4. Rasagiline：(101/6/1) (1) 可單獨使用，每日最高劑量為 1 mg；或與 levodopa 併用，rasagiline 每日最高劑量為 0.5 mg。 (2) 本品不得與 levodopa 以外之其他帕金森氏症治療藥品併用。</p> <p>5. Pramipexole 及 ropinirole 用於治療原發性腿部躁動症時需先排除腎衰竭、鐵缺乏症及多發性神經病變，且不得與 dopamine agonist 及 levodopa 併用。(96/9/1、97/7/1) (1) pramipexole 每日最大劑量為 0.75mg。(96/9/1) (2) ropinirole 每日最大劑量為 4mg。(97/7/1)</p> <p>6. Rotigotine 貼片劑（如 Neupro Patch），限用於原發性帕金森氏症，每日限用一片，且不得併用其他 dopamine agonist 之口服藥品</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(100/6/1)</p> <p>1. 3. 5. 注意力不全過動症治療藥品 methylphenidate HCl 緩釋劑型 (如 Concerta Extended Release Tablets) ; atomoxetine HCl (如 Strattera Hard capsules) (93/9/1、96/5/1、96/9/1、97/5/1)</p> <p>1. 限六歲至十八歲(含), 依 DSM 或 ICD 標準診斷為注意力不全過動症患者且對短效型 methylphenidate (如 Ritalin) 治療之副作用無法耐受, 或治療一個月以上, 療效不佳者使用, 並於病歷上記載使用理由。(96/9/1)</p> <p>2. 如符合前項規定且已使用本類藥品治療半年以上, 而十八歲後仍需服用者, 需於病歷上詳細記載以往病史及使用理由。(96/9/1)</p> <p>3. Atomoxetine HCl 原則上每日限使用 1 粒, 惟每日劑量需超過 60mg 時, 應於病歷中記載理由, 則每日至多可使用 2 粒, 每日最大劑量為 100mg。(97/5/1)</p> <p>1. 3. 6. Modafinil (如 Provigil Tablets 200mg) 給付規定: (96/2/1)</p> <p>同時需符合下列條件:</p> <p>1. 限猝睡症(narcolepsy)</p> | <p>(100/6/1)</p> <p>1. 3. 5. 注意力不全過動症治療藥品 methylphenidate HCl 緩釋劑型 (如 Concerta Extended Release Tablets) ; atomoxetine HCl (如 Strattera Hard capsules) (93/9/1、96/5/1、96/9/1、97/5/1)</p> <p>1. 限六歲至十八歲(含), 依 DSM 或 ICD 標準診斷為注意力不全過動症患者且對短效型 methylphenidate (如 Ritalin) 治療之副作用無法耐受, 或治療一個月以上, 療效不佳者使用, 並於病歷上記載使用理由。(96/9/1)</p> <p>2. 如符合前項規定且已使用本類藥品治療半年以上, 而十八歲後仍需服用者, 需於病歷上詳細記載以往病史及使用理由。(96/9/1)</p> <p>3. Atomoxetine HCl 原則上每日限使用 1 粒, 惟每日劑量需超過 60mg 時, 應於病歷中記載理由, 則每日至多可使用 2 粒, 每日最大劑量為 100mg。(97/5/1)</p> <p>1. 3. 6. Modafinil (如 Provigil Tablets 200mg) 給付規定: (96/2/1)</p> <p>同時需符合下列條件:</p> <p>1. 限猝睡症(narcolepsy)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>患者有日間過度睡眠症狀，且使用 methylphenidate 無效或無法忍受其副作用時使用。</p> <p>2. 猝睡症之診斷需符 2005 年國際睡眠障礙分類標準 (International Classification of Sleep Disorder II, ICSD II)，且夜間多頻睡眠檢查 (nocturnal Polysomnography, PSG) 和之後隔日之日間多次入睡睡眠檢查 (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) 需顯示前一夜睡眠至少有 6 小時，MSLT 之平均入睡潛伏期 (sleep latency) 需小於或等於 8 分鐘，並需至少有兩次或以上的入睡出現之快速動眼睡眠 (Sleep-onset REM periods (SOREMP))。</p> <p>3. 日間過度睡眠持續至少 3 個月以上，應有客觀評估，如成人的愛普沃斯嗜睡量表 ESS (Epworth sleepiness Scale) 需高於 9 分，或兒童青少年日間嗜睡量表 PDSS (Pediatric daytime sleepiness Scale) 或史丹福嗜睡評量表 SSS (Stanford sleepiness scale)，且需排除阻塞性睡眠呼吸障礙 (obstructive</p> | <p>患者有日間過度睡眠症狀，且使用 methylphenidate 無效或無法忍受其副作用時使用。</p> <p>2. 猝睡症之診斷需符 2005 年國際睡眠障礙分類標準 (International Classification of Sleep Disorder II, ICSD II)，且夜間多頻睡眠檢查 (nocturnal Polysomnography, PSG) 和之後隔日之日間多次入睡睡眠檢查 (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) 需顯示前一夜睡眠至少有 6 小時，MSLT 之平均入睡潛伏期 (sleep latency) 需小於或等於 8 分鐘，並需至少有兩次或以上的入睡出現之快速動眼睡眠 (Sleep-onset REM periods (SOREMP))。</p> <p>3. 日間過度睡眠持續至少 3 個月以上，應有客觀評估，如成人的愛普沃斯嗜睡量表 ESS (Epworth sleepiness Scale) 需高於 9 分，或兒童青少年日間嗜睡量表 PDSS (Pediatric daytime sleepiness Scale) 或史丹福嗜睡評量表 SSS (Stanford sleepiness scale)，且需排除阻塞性睡眠呼吸障礙 (obstructive</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>sleep apnea)、週期性下肢抽動 (Periodic leg movement disorder) 和睡眠相位後移症候群 (Delayed sleep phase syndrome) 等造成日間過度睡眠之可能性。</p> <p>4. 限有睡眠實驗室之醫院之神經內科、精神科、胸腔內科、耳鼻喉科專科醫師使用。</p> <p>5. 經事前審查核准後使用。首次申請時需檢附以下資料：1. 病歷紀錄 2. ICSD II 診斷 3. PSG 報告 4. MSLT 報告 5. 日間過度睡眠量表，如 ESS、PDSS、SSS 等。使用後每 3-6 個月施測日間過量睡眠症狀量表 ESS、或 PDSS、SSS，以評估療效。</p> <p>6. 使用期程：第 1 次申請獲准 1 年後，需重新進行 MSLT 檢查以評估客觀療效，並同時檢附過去 1 年之 ESS 或 PDSS、SSS。連續 2 年申請，如病人服藥順從性高，且藥效確定，則可每次核准 3 年。否則仍需每年申請 1 次，若 ESS 或 MSLT 其中之一顯示療效不佳，應即停用。</p> <p>7. 限制每日最大劑量 200mg。</p> <p>1.4. 麻醉劑 Drugs used in anesthesia</p> <p>1.4.1. Propofol：(91/2/1、</p> | <p>sleep apnea)、週期性下肢抽動 (Periodic leg movement disorder) 和睡眠相位後移症候群 (Delayed sleep phase syndrome) 等造成日間過度睡眠之可能性。</p> <p>4. 限有睡眠實驗室之醫院之神經內科、精神科、胸腔內科、耳鼻喉科專科醫師使用。</p> <p>5. 經事前審查核准後使用。首次申請時需檢附以下資料：1. 病歷紀錄 2. ICSD II 診斷 3. PSG 報告 4. MSLT 報告 5. 日間過度睡眠量表，如 ESS、PDSS、SSS 等。使用後每 3-6 個月施測日間過量睡眠症狀量表 ESS、或 PDSS、SSS，以評估療效。</p> <p>6. 使用期程：第 1 次申請獲准 1 年後，需重新進行 MSLT 檢查以評估客觀療效，並同時檢附過去 1 年之 ESS 或 PDSS、SSS。連續 2 年申請，如病人服藥順從性高，且藥效確定，則可每次核准 3 年。否則仍需每年申請 1 次，若 ESS 或 MSLT 其中之一顯示療效不佳，應即停用。</p> <p>7. 限制每日最大劑量 200mg。</p> <p>1.4. 麻醉劑 Drugs used in anesthesia</p> <p>1.4.1. Propofol：(91/2/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療且需要每日進行神智評估之病例使用(100/7/1)。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 2. Cis-atracurium、atracurium：(91/2/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療且肝或腎功能衰竭之病患使用(100/7/1)。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 3. Vecuronium、rocuronium：(91/2/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療之血液動力學不穩定之重症病患，且具有下述情形者(100/7/1)： <ol style="list-style-type: none"> (1)心臟功能不穩定者。 (2)心搏過速可能惡化者。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 4. 局部麻醉劑 (local anesthetics) Xylocaine 2 % jelly：限直腸外科人工肛門造口病例需居家定期插入導管或脊椎畸形合併有神經功能障礙之病童需長期居家間歇導尿病例使用。</p> <p>1. 4. 5. Dexmedetomidine (如 Precedex Inj.)：</p> | <p>100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療且需要每日進行神智評估之病例使用(100/7/1)。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 2. Cis-atracurium、atracurium：(91/2/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療且肝或腎功能衰竭之病患使用(100/7/1)。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 3. Vecuronium、rocuronium：(91/2/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用人工呼吸器治療之血液動力學不穩定之重症病患，且具有下述情形者(100/7/1)： <ol style="list-style-type: none"> (1)心臟功能不穩定者。 (2)心搏過速可能惡化者。 2. 每次使用以不超過七十二小時為原則。 3. 不得作為例行性使用。 <p>1. 4. 4. 局部麻醉劑 (local anesthetics) Xylocaine 2 % jelly：限直腸外科人工肛門造口病例需居家定期插入導管或脊椎畸形合併有神經功能障礙之病童需長期居家間歇導尿病例使用。</p> <p>1. 4. 5. Dexmedetomidine (如 Precedex Inj.)：</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(96/8/1) 限用於短期可拔管之 18 歲以上外科病患，術後 24 小時內需鎮靜與止痛病患使用，且使用時間不得超過 24 小時。</p> <p>1. 5. Parasympathomimetic (Cholinergic) Agents (93/8/1、94/2/1、96/7/1、97/5/1、102/2/1)</p> <p>1. 5. 1. Pilocarpine hydrochloride 口服劑型</p> <p>1. 使用於修格蘭氏症候群 (Sjogren's syndrome) 病人：</p> <p>(1) 使用對象：需符合修格蘭氏症候群之診斷標準。</p> <p>(2) 使用時機：原發性或續發性修格蘭氏症候群病人具有口乾燥症狀者。</p> <p>(3) 治療期程及評量：使用後每半年需檢附 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療後症狀改善評量表 (如附表十九) 於病歷上，證明 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療有效方可繼續使用。(102/2/1)</p> <p>(4) 使用劑量：每日三至四次，每次一錠 (5mg/tab) 依病人反映，可做劑量調整參考。</p> <p>2. 使用於頭頸部癌放射線</p> | <p>(96/8/1) 限用於短期可拔管之 18 歲以上外科病患，術後 24 小時內需鎮靜與止痛病患使用，且使用時間不得超過 24 小時。</p> <p>1. 5. Parasympathomimetic (Cholinergic) Agents (93/8/1、94/2/1、96/7/1、97/5/1、102/2/1)</p> <p>1. 5. 1. Pilocarpine hydrochloride 口服劑型</p> <p>1. 使用於修格蘭氏症候群 (Sjogren's syndrome) 病人：</p> <p>(1) 使用對象：需符合修格蘭氏症候群之診斷標準。</p> <p>(2) 使用時機：原發性或續發性修格蘭氏症候群病人具有口乾燥症狀者。</p> <p>(3) 治療期程及評量：使用後每半年需檢附 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療後症狀改善評量表 (如附表十九) 於病歷上，證明 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療有效方可繼續使用。(102/2/1)</p> <p>(4) 使用劑量：每日三至四次，每次一錠 (5mg/tab) 依病人反映，可做劑量調整參考。</p> <p>2. 使用於頭頸部癌放射線</p> | |
|---|---|--|

治療病人

- (1)使用對象：頭頸部癌放射線治療超過 26GY 之患者，造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症狀。
- (2)使用時機：適用於放射線治療期間及治療後所引起的口乾燥症狀需藥物控制時。
- (3)治療期程及評量：每使用兩個月後，需以 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療後症狀改善評量表（如附表十九）評估，認定確有改善者達 10 分(含)以上者方可繼續使用。

(96/7/1)

- (4)使用劑量：每日三至四次，每次一錠 (5mg/tab) 依病人反應，可做劑量調整參考。

備註：修格蘭氏症候群之診斷標準如下：

【修格蘭氏症候群 (Sjogren's syndrome) 之診斷標準依據 2002 年修立之歐洲分類標準】

1. 眼睛主觀症狀：至少符合下列問題之一：

- (1)是否有每天，持續性，令人困擾的乾眼症狀持續三個月以上？
- (2)眼睛是否有反覆性的異物感？

治療病人

- (1)使用對象：頭頸部癌放射線治療超過 26GY 之患者，造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症狀。
- (2)使用時機：適用於放射線治療期間及治療後所引起的口乾燥症狀需藥物控制時。
- (3)治療期程及評量：每使用兩個月後，需以 pilocarpine hydrochloride 口服劑型治療後症狀改善評量表（如附表十九）評估，認定確有改善者達 10 分(含)以上者方可繼續使用。

(96/7/1)

- (4)使用劑量：每日三至四次，每次一錠 (5mg/tab) 依病人反應，可做劑量調整參考。

備註：修格蘭氏症候群之診斷標準如下：

【修格蘭氏症候群 (Sjogren's syndrome) 之診斷標準依據 2002 年修立之歐洲分類標準】

1. 眼睛主觀症狀：至少符合下列問題之一：

- (1)是否有每天，持續性，令人困擾的乾眼症狀持續三個月以上？
- (2)眼睛是否有反覆性的異物感？

| | | |
|--|--|--|
| <p>(3)是否使用人工淚液一天大於三次？</p> <p>2. 口腔主觀症狀：至少符合下列問題之一：</p> <p>(1)是否每天都覺得口乾症狀持續三個月以上？</p> <p>(2)是否於成年後曾經有反覆性或持續性唾液腺體腫大的現象？</p> <p>(3)是否經常使用流質來幫助吞食較乾的食物？</p> <p>3. 眼睛客觀表現：兩項檢查之中至少有一項呈陽性反應：</p> <p>(1)Shirmer's 試驗：在無麻醉下測試，5分鐘後小於或等於5公厘。</p> <p>(2)Rose Bengal score 或其他眼睛染色之評分，大於或等於4分（依據 van Bijsterveld's 評分系統）。</p> <p>4. 組織病理學：在4mm²的唾液腺組織切片中顯示腺體發炎而且≥1 focus的淋巴球浸潤（1 Focus：≥50個淋巴球聚集）。</p> <p>5. 唾液腺之侵犯：下列檢查之中至少有一項呈陽性反應：</p> <p>(1)無刺激下唾液的分泌總量減少（15分鐘少於1.5 cc）</p> <p>(2)腮腺唾液管X光照像呈現瀰漫性唾液腺管</p> | <p>(3)是否使用人工淚液一天大於三次？</p> <p>2. 口腔主觀症狀：至少符合下列問題之一：</p> <p>(1)是否每天都覺得口乾症狀持續三個月以上？</p> <p>(2)是否於成年後曾經有反覆性或持續性唾液腺體腫大的現象？</p> <p>(3)是否經常使用流質來幫助吞食較乾的食物？</p> <p>3. 眼睛客觀表現：兩項檢查之中至少有一項呈陽性反應：</p> <p>(1)Shirmer's 試驗：在無麻醉下測試，5分鐘後小於或等於5公厘。</p> <p>(2)Rose Bengal score 或其他眼睛染色之評分，大於或等於4分（依據 van Bijsterveld's 評分系統）。</p> <p>4. 組織病理學：在4mm²的唾液腺組織切片中顯示腺體發炎而且≥1 focus的淋巴球浸潤（1 Focus：≥50個淋巴球聚集）。</p> <p>5. 唾液腺之侵犯：下列檢查之中至少有一項呈陽性反應：</p> <p>(1)無刺激下唾液的分泌總量減少（15分鐘少於1.5 cc）</p> <p>(2)腮腺唾液管X光照像呈現瀰漫性唾液腺管</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>擴大（呈像為斑點狀，空洞狀或不規則狀）且無唾液管阻塞現象。</p> <p>(3) 唾液腺閃爍造影檢查呈現放射性同位元素之延遲顯影，低濃度以及/或排出延遲。</p> <p>6. 自體免疫抗體：出現以下自體抗體：</p> <p>(1) SSA 或 SSB 或兩者皆有</p> <p>合乎修格蘭氏症候群診斷標準之判定：</p> <p>1. 原發性修格蘭氏症：無任何相關疾病且需合乎下述</p> <p>(1) 或(2) 項條件：</p> <p>(1) 6 項條件中 4 項符合，其中需有第 4 項（組織病理）或第 6 項（血清檢查）條件符合。</p> <p>(2) 4 項客觀條件（即第 3、4、5、6 項）中，任 3 項條件符合。</p> <p>2. 次發性修格蘭氏症：</p> <p>患者有潛在相關疾病（例如：任何明確結締組織疾病）而且存在有上述診斷標準中第 1 項條件，或第 2 條件，再加上第 3、4、5 項條件中任何 2</p> | <p>擴大（呈像為斑點狀，空洞狀或不規則狀）且無唾液管阻塞現象。</p> <p>(3) 唾液腺閃爍造影檢查呈現放射性同位元素之延遲顯影，低濃度以及/或排出延遲。</p> <p>6. 自體免疫抗體：出現以下自體抗體：</p> <p>(1) SSA 或 SSB 或兩者皆有</p> <p>合乎修格蘭氏症候群診斷標準之判定：</p> <p>1. 原發性修格蘭氏症：無任何相關疾病且需合乎下述</p> <p>(1) 或(2) 項條件：</p> <p>(1) 6 項條件中 4 項符合，其中需有第 4 項（組織病理）或第 6 項（血清檢查）條件符合。</p> <p>(2) 4 項客觀條件（即第 3、4、5、6 項）中，任 3 項條件符合。</p> <p>2. 次發性修格蘭氏症：</p> <p>患者有潛在相關疾病（例如：任何明確結締組織疾病）而且存在有上述診斷標準中第 1 項條件，或第 2 條件，再加上第 3、4、5 項條件中任何 2</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>項，即考慮次發性修格蘭氏症候群。</p> <p>1.5.2. Cevimeline hydrochloride (如 Evoxac Capsules) (97/5/1、102/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用對象：需符合修格蘭氏症候群之診斷標準。 2. 使用時機：原發性或續發性修格蘭氏症候群病人具有口乾燥症狀者。 3. 治療期程及評量：使用後每半年需檢附 cevimeline hydrochloride 治療後症狀改善評量表 (如附表二十) 於病歷上，證明 cevimeline hydrochloride 治療有效方可繼續使用。(102/2/1)。 4. 使用劑量：每日三次，每次一顆 (30mg/cap) 依病人反映，可做劑量調整參考。 <p>1.6. 其他 Miscellaneous</p> <p>1.6.1. Riluzole (如 Rilutek) (87/4/1、92/11/1、95/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經兩位神經科專科醫師診斷為運動神經元疾病 (ALS/MND)，且未氣管切開或使用人工呼吸器之病患。(92/11/1、95/4/1) 2. 遺傳性運動神經元萎縮症 (如 spinal muscular atrophy 等)，幼年性遠端肢體萎 | <p>項，即考慮次發性修格蘭氏症候群。</p> <p>1.5.2. Cevimeline hydrochloride (如 Evoxac Capsules) (97/5/1、102/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用對象：需符合修格蘭氏症候群之診斷標準。 2. 使用時機：原發性或續發性修格蘭氏症候群病人具有口乾燥症狀者。 3. 治療期程及評量：使用後每半年需檢附 cevimeline hydrochloride 治療後症狀改善評量表 (如附表二十) 於病歷上，證明 cevimeline hydrochloride 治療有效方可繼續使用。(102/2/1)。 4. 使用劑量：每日三次，每次一顆 (30mg/cap) 依病人反映，可做劑量調整參考。 <p>1.6. 其他 Miscellaneous</p> <p>1.6.1. Riluzole (如 Rilutek) (87/4/1、92/11/1、95/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經兩位神經科專科醫師診斷為運動神經元疾病 (ALS/MND)，且未氣管切開或使用人工呼吸器之病患。(92/11/1、95/4/1) 2. 遺傳性運動神經元萎縮症 (如 spinal muscular atrophy 等)，幼年性遠端肢體萎 | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>縮症（如 segmental or focal motor neuron disease 等），感染性神經元疾病（如 polio 等）不適用。</p> <p>1.6.2. Botulinum toxin type A</p> <p>本類藥品限以下適應症使用，每一個案每一年需重新評估一次，惟用於成人中風後之手臂痙攣時，需經事前審查核准後使用（98/5/1）。</p> <p>1.6.2.1. Botox(90/1/1、93/1/1、94/6/1、98/3/1、98/5/1、100/8/1、104/5/1、104/9/1)</p> <p>1. 使用於眼瞼痙攣或半面痙攣：</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區域以上（含）教學醫院之眼科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為眼瞼痙攣或半面痙攣之病患使用。</p> <p>(2) 需符合 Spasm Intensity Scale 3 級（含）以上，另有病歷記載病史 6 個月以上者可申請治療。（94/6/1）</p> <p>(3) 每次注射最高劑量：眼瞼痙攣為每側 20 單位，半面痙攣為每側 30 單位。每年最多注射 3 次為原則。</p> <p>2. 使用於局部肌張力不全症（focal dystonia）</p> | <p>縮症（如 segmental or focal motor neuron disease 等），感染性神經元疾病（如 polio 等）不適用。</p> <p>1.6.2. Botulinum toxin type A</p> <p>本類藥品限以下適應症使用，每一個案每一年需重新評估一次，惟用於成人中風後之手臂痙攣時，需經事前審查核准後使用（98/5/1）。</p> <p>1.6.2.1. Botox(90/1/1、93/1/1、94/6/1、98/3/1、98/5/1、100/8/1、104/5/1、104/9/1)</p> <p>1. 使用於眼瞼痙攣或半面痙攣：</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區域以上（含）教學醫院之眼科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為眼瞼痙攣或半面痙攣之病患使用。</p> <p>(2) 需符合 Spasm Intensity Scale 3 級（含）以上，另有病歷記載病史 6 個月以上者可申請治療。（94/6/1）</p> <p>(3) 每次注射最高劑量：眼瞼痙攣為每側 20 單位，半面痙攣為每側 30 單位。每年最多注射 3 次為原則。</p> <p>2. 使用於局部肌張力不全症（focal dystonia）</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(如斜頸、書寫性痙攣、口顎部肌張力不全等)</p> <p>(1)限12歲以上，經區域以上(含)教學醫院之神經內科、小兒神經科或復健科專科醫師診斷為局部張力不全症之病患使用。</p> <p>(2)需有病歷記載已持續以其他方式治療6個月以上無效，且斜頸症者需符合Tsui's rating scale for cervical dystonia 分數11分(含)以上者。</p> <p>(3)每次注射最高劑量：斜頸症為150單位，書寫性痙攣及口顎部肌張力不全為70單位，且每年最多注射3次為原則。</p> <p>(4)全身性肌張力不全症不在給付範圍。</p> <p>3. 使用於腦性麻痺病患</p> <p>(1)限滿2歲以上，經區域以上(含)教學醫院復健科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為痙攣型腦性麻痺之病患使用。</p> <p>(2)其肢體之痙攣影響主動功能(如行走或手部動作)，該肢體之痙攣程度以Modified Ashworth Scale 評估為2或3級，且經藥物、復健或輔具治療至少6個月以上無效</p> | <p>(如斜頸、書寫性痙攣、口顎部肌張力不全等)</p> <p>(1)限12歲以上，經區域以上(含)教學醫院之神經內科、小兒神經科或復健科專科醫師診斷為局部張力不全症之病患使用。</p> <p>(2)需有病歷記載已持續以其他方式治療6個月以上無效，且斜頸症者需符合Tsui's rating scale for cervical dystonia 分數11分(含)以上者。</p> <p>(3)每次注射最高劑量：斜頸症為150單位，書寫性痙攣及口顎部肌張力不全為70單位，且每年最多注射3次為原則。</p> <p>(4)全身性肌張力不全症不在給付範圍。</p> <p>3. 使用於腦性麻痺病患</p> <p>(1)限滿2歲以上，經區域以上(含)教學醫院復健科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為痙攣型腦性麻痺之病患使用。</p> <p>(2)其肢體之痙攣影響主動功能(如行走或手部動作)，該肢體之痙攣程度以Modified Ashworth Scale 評估為2或3級，且經藥物、復健或輔具治療至少6個月以上無效</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>者。</p> <p>(3)無固定不可逆之關節攣縮。</p> <p>(4)每次注射最高劑量每公斤體重 12~15 單位 (總劑量不超過 300 單位)，下肢每塊肌肉每公斤體重使用 3~6 單位，上肢每塊肌肉每公斤體重使用 1~2 單位，且每年最多注射 3 次。 (94/6/1)</p> <p>(5)治療年齡 (以申請日期起計)：下肢為 2~10 歲，上肢為 2~12 歲。(94/6/1)</p> <p>(6)經外科手術治療之同肌肉部位不得再行注射。</p> <p>4. 使用於成人中風後之手臂痙攣：(93/1/1、94/6/1、98/3/1、100/8/1)</p> <p>(1)限 20 歲以上，中風發生後，經復健、輔具或藥物治療至少 6 個月以上仍有手臂痙攣，影響其日常活動 (如飲食、衛生、穿衣等)者，痙攣程度符合 Modified Ashworth Scale 評估 2 或 3 級，且關節活動度 (R1/R2) 顯示顯著痙攣，並排除臥床、手臂攣縮或關節固定不可逆攣縮者。 (94/6/1、98/3/1)</p> <p>(2)限地區醫院以上</p> | <p>者。</p> <p>(3)無固定不可逆之關節攣縮。</p> <p>(4)每次注射最高劑量每公斤體重 12~15 單位 (總劑量不超過 300 單位)，下肢每塊肌肉每公斤體重使用 3~6 單位，上肢每塊肌肉每公斤體重使用 1~2 單位，且每年最多注射 3 次。 (94/6/1)</p> <p>(5)治療年齡 (以申請日期起計)：下肢為 2~10 歲，上肢為 2~12 歲。(94/6/1)</p> <p>(6)經外科手術治療之同肌肉部位不得再行注射。</p> <p>4. 使用於成人中風後之手臂痙攣：(93/1/1、94/6/1、98/3/1、100/8/1)</p> <p>(1)限 20 歲以上，中風發生後，經復健、輔具或藥物治療至少 6 個月以上仍有手臂痙攣，影響其日常活動 (如飲食、衛生、穿衣等)者，痙攣程度符合 Modified Ashworth Scale 評估 2 或 3 級，且關節活動度 (R1/R2) 顯示顯著痙攣，並排除臥床、手臂攣縮或關節固定不可逆攣縮者。 (94/6/1、98/3/1)</p> <p>(2)限地區醫院以上</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(含)神經內科或復健科專科醫師診斷及注射。(94/6/1、100/8/1)</p> <p>(3)每次注射最高劑量 Botox 360 單位，且每年最多 3 次。(94/6/1)</p> <p>(4)需經事前審查核准後使用，申請時需檢附病歷資料、治療計畫及照片。</p> <p>(5)再次申請時需提出使用效果評估結果。</p> <p>(6)如因再次中風而導致臥床、手部肌肉攣縮或關節固定不可逆攣縮者，則應停用。(98/3/1)</p> <p>5. 使用於脊髓病變所引起的逼尿肌過動而導致尿失禁(104/5/1)</p> <p>(1)事前審查，每年附尿動力學審查，確診為逼尿肌過動症。</p> <p>(2)18 歲以上(含)之成人病患。</p> <p>(3)泌尿專科或神經內科或復健科醫師診斷為因脊髓病變引發的逼尿肌過動症病患，由泌尿專科醫師施行注射。</p> <p>(4)每週尿失禁次數至少 14 次。</p> <p>(5)病患需經至少一種抗膽鹼藥物治療三個月無效(仍有明顯逼尿肌過動症狀)，或無法耐受抗膽鹼藥物副作</p> | <p>(含)神經內科或復健科專科醫師診斷及注射。(94/6/1、100/8/1)</p> <p>(3)每次注射最高劑量 Botox 360 單位，且每年最多 3 次。(94/6/1)</p> <p>(4)需經事前審查核准後使用，申請時需檢附病歷資料、治療計畫及照片。</p> <p>(5)再次申請時需提出使用效果評估結果。</p> <p>(6)如因再次中風而導致臥床、手部肌肉攣縮或關節固定不可逆攣縮者，則應停用。(98/3/1)</p> <p>5. 使用於脊髓病變所引起的逼尿肌過動而導致尿失禁(104/5/1)</p> <p>(1)事前審查，每年附尿動力學審查，確診為逼尿肌過動症。</p> <p>(2)18 歲以上(含)之成人病患。</p> <p>(3)泌尿專科或神經內科或復健科醫師診斷為因脊髓病變引發的逼尿肌過動症病患，由泌尿專科醫師施行注射。</p> <p>(4)每週尿失禁次數至少 14 次。</p> <p>(5)病患需經至少一種抗膽鹼藥物治療三個月無效(仍有明顯逼尿肌過動症狀)，或無法耐</p> | <p>(含)神經內科或復健科專科醫師診斷及注射。(94/6/1、100/8/1)</p> <p>(3)每次注射最高劑量 Botox 360 單位，且每年最多 3 次。(94/6/1)</p> <p>(4)需經事前審查核准後使用，申請時需檢附病歷資料、治療計畫及照片。</p> <p>(5)再次申請時需提出使用效果評估結果。</p> <p>(6)如因再次中風而導致臥床、手部肌肉攣縮或關節固定不可逆攣縮者，則應停用。(98/3/1)</p> <p>5. 使用於脊髓病變所引起的逼尿肌過動而導致尿失禁(104/5/1)</p> <p>(1)事前審查，每年附尿動力學審查，確診為逼尿肌過動症。</p> <p>(2)18 歲以上(含)之成人病患。</p> <p>(3)泌尿專科或神經內科或復健科醫師診斷為因脊髓病變引發的逼尿肌過動症病患，由泌尿專科醫師施行注射。</p> <p>(4)每週尿失禁次數至少 14 次。</p> <p>(5)病患需經至少一種抗膽鹼藥物治療三個月無效(仍有明顯逼尿肌過動症狀)，或無法耐</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>用。</p> <p>(6)第1次注射後6-12週評估尿失禁頻率改善未達50%者，不得再注射。</p> <p>(7)每次治療建議劑量200個單位，二次注射時間應間隔24週以上，且病患有治療前症狀(頻尿、急尿與尿失禁)時再次注射，每年注射以兩次為限。</p> <p>6. 使用於膀胱過動症： (104/9/1)</p> <p>(1)經尿路動力學檢查診斷為原發性膀胱過動症 (idiopathic overactive bladder) 且有尿失禁 (wet type)每週大於14次的成年患者，且經至少一種抗膽鹼藥物治療無效。</p> <p>(2)需經事前審查核准後使用，每次治療建議劑量為100單位，每年限用兩次，兩次注射時間需相隔三個月以上，且第二次使用限於第一次注射後在6-12週評估有尿失禁頻率減少50%以上的患者。</p> <p>(3)限由泌尿專科或婦產科醫師診斷及施行注射。</p> <p>◎前開注射劑量單位僅適用於Botox®劑量計算。</p> <p>1. 6. 2. 2. Dysport (91/2/1、</p> | <p>用。</p> <p>(6)第1次注射後6-12週評估尿失禁頻率改善未達50%者，不得再注射。</p> <p>(7)每次治療建議劑量200個單位，二次注射時間應間隔24週以上，且病患有治療前症狀(頻尿、急尿與尿失禁)時再次注射，每年注射以兩次為限。</p> <p>6. 使用於膀胱過動症： (104/9/1)</p> <p>(1)經尿路動力學檢查診斷為原發性膀胱過動症 (idiopathic overactive bladder) 且有尿失禁 (wet type)每週大於14次的成年患者，且經至少一種抗膽鹼藥物治療無效。</p> <p>(2)需經事前審查核准後使用，每次治療建議劑量為100單位，每年限用兩次，兩次注射時間需相隔三個月以上，且第二次使用限於第一次注射後在6-12週評估有尿失禁頻率減少50%以上的患者。</p> <p>(3)限由泌尿專科或婦產科醫師診斷及施行注射。</p> <p>◎前開注射劑量單位僅適用於Botox®劑量計算。</p> <p>1. 6. 2. 2. Dysport (91/2/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>93/1/1、94/6/1、 98/3/1、98/5/1、 100/8/1)</p> <p>1. 使用於眼瞼痙攣或半面 痙攣：</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區 域以上（含）教學醫 院之眼科、神經內科 或小兒神經科專科醫 師診斷為眼瞼痙攣或 半面痙攣之病患使 用。</p> <p>(2) 需符合 Spasm Intensity Scale 3 級（含）以上，另有 病歷記載病史 6 個月 以上者可申請治療。 (94/6/1)</p> <p>(3) 每次注射最高劑量： 眼瞼痙攣為每側 80 單 位，半面痙攣為每側 120 單位。每年最多 注射 3 次為原則。</p> <p>2. 使用於局部肌張力不全 症（focal dystonia） （如斜頸、書寫性痙 攣、口顎部肌張力不全 等）</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區 域以上（含）教學醫 院之神經內科、小兒 神經科或復健科專科 醫師診斷為局部張力 不全症之病患使用。</p> <p>(2) 需有病歷記載已持續 以其他方式治療 6 個 月以上無效，且斜頸 症者需符合 Tsui' s rating scale for cervical dystonia</p> | <p>93/1/1、94/6/1、 98/3/1、98/5/1、 100/8/1)</p> <p>1. 使用於眼瞼痙攣或半面 痙攣：</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區 域以上（含）教學醫 院之眼科、神經內科 或小兒神經科專科醫 師診斷為眼瞼痙攣或 半面痙攣之病患使 用。</p> <p>(2) 需符合 Spasm Intensity Scale 3 級（含）以上，另有 病歷記載病史 6 個月 以上者可申請治療。 (94/6/1)</p> <p>(3) 每次注射最高劑量： 眼瞼痙攣為每側 80 單 位，半面痙攣為每側 120 單位。每年最多 注射 3 次為原則。</p> <p>2. 使用於局部肌張力不全 症（focal dystonia） （如斜頸、書寫性痙 攣、口顎部肌張力不全 等）</p> <p>(1) 限 12 歲以上，經區 域以上（含）教學醫 院之神經內科、小兒 神經科或復健科專科 醫師診斷為局部張力 不全症之病患使用。</p> <p>(2) 需有病歷記載已持續 以其他方式治療 6 個 月以上無效，且斜頸 症者需符合 Tsui' s rating scale for cervical dystonia</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>分數 11 分（含）以上者。</p> <p>(3)每次注射最高劑量：斜頸症為 600 單位，書寫性痙攣及口顎部肌張力不全為 280 單位，且每年最多注射 3 次為原則。</p> <p>(4)全身性肌張力不全症不在給付範圍。</p> <p>3. 使用於腦性麻痺病患</p> <p>(1)限滿 2 歲以上，經區域以上（含）教學醫院復健科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為痙攣型腦性麻痺之病患使用。</p> <p>(2)其肢體之痙攣影響主動功能（如行走或手部動作），該肢體之痙攣程度以 Modified Ashworth Scale 評估為 2 或 3 級，且經藥物、復健或輔具治療至少 6 個月以上無效者。</p> <p>(3)無固定不可逆之關節攣縮。</p> <p>(4)每次注射最高劑量每公斤體重 30 單位（總劑量不超過 900 單位），下肢每塊肌肉每公斤體重使用 9~18 單位，上肢每塊肌肉每公斤體重使用 3~6 單位，且每年最多注射 3 次。（94/6/1）</p> <p>(5)治療年齡（以申請日期起計）：下肢為 2~10 歲，上肢為 2~12</p> | <p>分數 11 分（含）以上者。</p> <p>(3)每次注射最高劑量：斜頸症為 600 單位，書寫性痙攣及口顎部肌張力不全為 280 單位，且每年最多注射 3 次為原則。</p> <p>(4)全身性肌張力不全症不在給付範圍。</p> <p>3. 使用於腦性麻痺病患</p> <p>(1)限滿 2 歲以上，經區域以上（含）教學醫院復健科、神經內科或小兒神經科專科醫師診斷為痙攣型腦性麻痺之病患使用。</p> <p>(2)其肢體之痙攣影響主動功能（如行走或手部動作），該肢體之痙攣程度以 Modified Ashworth Scale 評估為 2 或 3 級，且經藥物、復健或輔具治療至少 6 個月以上無效者。</p> <p>(3)無固定不可逆之關節攣縮。</p> <p>(4)每次注射最高劑量每公斤體重 30 單位（總劑量不超過 900 單位），下肢每塊肌肉每公斤體重使用 9~18 單位，上肢每塊肌肉每公斤體重使用 3~6 單位，且每年最多注射 3 次。（94/6/1）</p> <p>(5)治療年齡（以申請日期起計）：下肢為 2~10 歲，上肢為 2~12</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>歲。(94/6/1)</p> <p>(6)經外科手術治療之同肌肉部位不得再行注射。</p> <p>4. 使用於成人中風後之手臂痙攣：(93/1/1、94/6/1、98/3/1、100/8/1)</p> <p>(1)限 20 歲以上，中風發生後，經復健、輔具或藥物治療至少 6 個月以上仍有手臂痙攣，影響其日常活動(如飲食、衛生、穿衣等)者，痙攣程度符合 Modified Ashworth Scale 評估 2 或 3 級，且關節活動度 (R1/R2) 顯示顯著痙攣，並排除臥床、手臂攣縮或關節固定不可逆攣縮者。(94/6/1、98/3/1)</p> <p>(2)限地區醫院以上(含)神經內科或復健科專科醫師診斷及注射。(94/6/1、100/8/1)</p> <p>(3)每次注射最高劑量 Dysport 1000 單位，且每年最多 3 次。(94/6/1)</p> <p>(4)需經事前審查核准後使用，申請時需檢附病歷資料、治療計畫及照片。</p> <p>(5)再次申請時需提出使用效果評估結果。</p> <p>(6)如因再次中風而導致臥床、手部肌肉攣縮</p> | <p>歲。(94/6/1)</p> <p>(6)經外科手術治療之同肌肉部位不得再行注射。</p> <p>4. 使用於成人中風後之手臂痙攣：(93/1/1、94/6/1、98/3/1、100/8/1)</p> <p>(1)限 20 歲以上，中風發生後，經復健、輔具或藥物治療至少 6 個月以上仍有手臂痙攣，影響其日常活動(如飲食、衛生、穿衣等)者，痙攣程度符合 Modified Ashworth Scale 評估 2 或 3 級，且關節活動度 (R1/R2) 顯示顯著痙攣，並排除臥床、手臂攣縮或關節固定不可逆攣縮者。(94/6/1、98/3/1)</p> <p>(2)限地區醫院以上(含)神經內科或復健科專科醫師診斷及注射。(94/6/1、100/8/1)</p> <p>(3)每次注射最高劑量 Dysport 1000 單位，且每年最多 3 次。(94/6/1)</p> <p>(4)需經事前審查核准後使用，申請時需檢附病歷資料、治療計畫及照片。</p> <p>(5)再次申請時需提出使用效果評估結果。</p> <p>(6)如因再次中風而導致臥床、手部肌肉攣縮</p> | |
|--|--|--|

或關節固定不可逆攣縮者，則應停用。

(98/3/1)

◎前開注射劑量單位僅適用於 Dysport 劑量計算。

◎Spasm Intensity

Scale :

- 0 正常眨眼次數。
- 1 眨眼次數因對外界刺激（如光、風等）而增加。
- 2 輕微但明顯之眼瞼震顫（無痙攣），且未引起生活不便。
- 3 中度，且極明顯之眼瞼痙攣，且引起生活不便。
- 4 嚴重影響生活（無法閱讀、駕駛等）。

◎ Modified Ashworth

Scale :

- 0 無肌張力增加。
- 1 肌肉張力輕微增加，表現在關節活動範圍之末端。
- 1+ 肌張力輕微增加，表現在關節活動一半範圍之內。
- 2 肌肉張力明顯增加，表現在整個關節活動範圍內。
- 3 肌張力更明顯增加，關節活動出現困難。
- 4 肌張力極高，無關節活動可言。

1. 6. 3. Tolterodine L-tartrate（如

或關節固定不可逆攣縮者，則應停用。

(98/3/1)

◎前開注射劑量單位僅適用於 Dysport 劑量計算。

◎Spasm Intensity

Scale :

- 0 正常眨眼次數。
- 1 眨眼次數因對外界刺激（如光、風等）而增加。
- 2 輕微但明顯之眼瞼震顫（無痙攣），且未引起生活不便。
- 3 中度，且極明顯之眼瞼痙攣，且引起生活不便。
- 4 嚴重影響生活（無法閱讀、駕駛等）。

◎ Modified Ashworth

Scale :

- 0 無肌張力增加。
- 1 肌肉張力輕微增加，表現在關節活動範圍之末端。
- 1+ 肌張力輕微增加，表現在關節活動一半範圍之內。
- 2 肌肉張力明顯增加，表現在整個關節活動範圍內。
- 3 肌張力更明顯增加，關節活動出現困難。
- 4 肌張力極高，無關節活動可言。

1. 6. 3. Tolterodine L-tartrate（如

| | | |
|---|---|--|
| <p>Detrusitol) ; solifenacin succinate (如 Vesicare) ; mirabegron (如 Betmiga):(90/7/1、 93/10/1、96/4/1、 104/2/1)</p> <p>1. 限符合下列診斷標準條件之一者： (1)頻尿：每天（24小時）排尿次數超過八次，並有詳實病歷紀錄。 (2)急尿：病患自述經常有一種很突然、很強烈想解尿的感覺。 (3)急迫性尿失禁：對於尿急的感覺無法控制，並於24小時內至少也有一次漏尿之情形。</p> <p>2. 不宜使用本類藥品者： (1)小兒夜尿。 (2)單純性應力性尿失禁。 (3)膀胱逼尿肌無反射（detrusor areflexia）或膀胱不收縮所引起之排尿困難或尿失禁之症狀。</p> <p>3. Solifenacin succinate（如 Vesicare）及 mirabegron（如 Betmiga）藥品每天限使用1錠。(104/2/1)</p> <p>第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs 2.1. 抗血栓劑 Antithrombotic agents 2.1.1. 血小板凝集抑制劑</p> | <p>Detrusitol) ; solifenacin succinate (如 Vesicare) ; mirabegron (如 Betmiga):(90/7/1、 93/10/1、96/4/1、 104/2/1)</p> <p>1. 限符合下列診斷標準條件之一者： (1)頻尿：每天（24小時）排尿次數超過八次，並有詳實病歷紀錄。 (2)急尿：病患自述經常有一種很突然、很強烈想解尿的感覺。 (3)急迫性尿失禁：對於尿急的感覺無法控制，並於24小時內至少也有一次漏尿之情形。</p> <p>2. 不宜使用本類藥品者： (1)小兒夜尿。 (2)單純性應力性尿失禁。 (3)膀胱逼尿肌無反射（detrusor areflexia）或膀胱不收縮所引起之排尿困難或尿失禁之症狀。</p> <p>3. Solifenacin succinate（如 Vesicare）及 mirabegron（如 Betmiga）藥品每天限使用1錠。(104/2/1)</p> <p>第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs 2.1. 抗血栓劑 Antithrombotic agents 2.1.1. 血小板凝集抑制劑</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Platelet aggregation inhibitors (100/7/1)</p> <p>2.1.1.1. Acetylsalicylic acid (Aspirin) 製劑 (89/2/1)</p> <p>如用於抗血小板凝集，以每日一粒為原則。</p> <p>2.1.1.2. Ticlopidine (原 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 合併使用之情況條文修訂)：(87/4/1、88/9/1、90/1/1、100/7/1)</p> <p>1. 限無法忍受 acetylsalicylic acid (Aspirin) 或對 acetylsalicylic acid (Aspirin) 有禁忌而需使用抗血小板製劑之病患使用(88/9/1)。</p> <p>2. 原則上本類製劑與 acetylsalicylic acid (Aspirin) 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後三個月內，得依病情需要合併使用。(87/4/1、90/1/1)</p> <p>3. 申報費用時需註明放置支架 (stent) 之日期。(87/4/1、90/1/1、100/7/1)</p> <p>2.1.1.3. Tirofiban (如 Aggrastat)：(91/2/1、99/10/1、100/7/1)</p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時，作為 heparin 的輔</p> | <p>Platelet aggregation inhibitors (100/7/1)</p> <p>2.1.1.1. Acetylsalicylic acid (Aspirin) 製劑 (89/2/1)</p> <p>如用於抗血小板凝集，以每日一粒為原則。</p> <p>2.1.1.2. Ticlopidine (原 ticlopidine 與 acetylsalicylic acid 合併使用之情況條文修訂)：(87/4/1、88/9/1、90/1/1、100/7/1)</p> <p>1. 限無法忍受 acetylsalicylic acid (Aspirin) 或對 acetylsalicylic acid (Aspirin) 有禁忌而需使用抗血小板製劑之病患使用(88/9/1)。</p> <p>2. 原則上本類製劑與 acetylsalicylic acid (Aspirin) 不宜合併使用，僅於冠狀動脈支架植入術後三個月內，得依病情需要合併使用。(87/4/1、90/1/1)</p> <p>3. 申報費用時需註明放置支架 (stent) 之日期。(87/4/1、90/1/1、100/7/1)</p> <p>2.1.1.3. Tirofiban (如 Aggrastat)：(91/2/1、99/10/1、100/7/1) <u>附表十二</u></p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時，作為 heparin 的輔</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 tirofiban。</p> <p>2.1.1.4. Abciximab (如 ReoPro) : (90/7/1、100/7/1)</p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 abciximab。</p> <p>2.1.1.5. Cilostazol (如 Pletaal) : (90/6/1、100/7/1、104/4/1、<u>105/5/1</u>)</p> <p>1. 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人 (周邊動脈疾病 Fontaine stage II)，用於增加最大及無痛行走距離。</p> <p>2. 經生活模式改變及其他治療後，仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。</p> <p>3. 用於無法耐受 <u>acetylsalicylic acid</u> 且屬非心因性栓塞之腦梗塞患者，以預防腦梗塞之再復發，並符合下列條件之一</p> | <p>助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 tirofiban。</p> <p>2.1.1.4. Abciximab (如 ReoPro) : (90/7/1、100/7/1)</p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 abciximab。</p> <p>2.1.1.5. Cilostazol (如 Pletaal) : (90/6/1、100/7/1、104/4/1)</p> <p>1. 使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人 (周邊動脈疾病 Fontaine stage II)，用於增加最大及無痛行走距離。</p> <p>2. 經生活模式改變及其他治療後，仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>(105/5/1) :</u></p> <p><u>(1)對 acetylsalicylic acid 過敏。</u></p> <p><u>(2)臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid 所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。</u></p> <p><u>(3)最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時間。</u></p> <p><u>(4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者（如 75 歲（含）以上罹有中風或長期卧床者）不在此限。</u></p> <p>2.1.1.6 Clopidogrel（如 Plavix）：(90/1/1、93/4/1、94/8/1、96/10/1、100/7/1、101/12/1)</p> <p>1. 限近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病</p> | <p>2.1.1.6 Clopidogrel（如 Plavix）：(90/1/1、93/4/1、94/8/1、96/10/1、100/7/1、101/12/1)</p> <p>1. 限近期發生中風、心肌梗塞或週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病</p> | |
|--|--|--|

人，並符合下列條件之一者使用。(90/1/1、94/8/1、96/10/1)

- (1)對 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)過敏。
 - (2)臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。
 - (3)最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時間。
 - (4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者(如 75 歲(含)以上罹有中風、心肌梗塞、週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化或長期卧床者)不在此限。(101/12/1)
2. 置放金屬支架 3 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併

人，並符合下列條件之一者使用。(90/1/1、94/8/1、96/10/1)

- (1)對 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)過敏。
 - (2)臨床診斷確定為 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)所導致之消化性潰瘍或上消化道出血、穿孔病史者。需於病歷註明發生時間。
 - (3)最近一年內臨床診斷確定為消化性潰瘍者。病歷上應有明確消化性潰瘍之典型症狀紀錄及發病時間。
 - (4)最近一年內經上消化道內視鏡檢查或上消化道 X 光攝影檢查證實消化性潰瘍或發生上消化道出血、穿孔病史。需於病歷註明上消化道內視鏡或上消化道 X 光攝影檢查時間。但對 acetylsalicylic acid 無法耐受，且身體狀況無法忍受內視鏡或消化道 X 光攝影檢查者(如 75 歲(含)以上罹有中風、心肌梗塞、週邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化或長期卧床者)不在此限。(101/12/1)
2. 置放金屬支架 3 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin)合併

| | | |
|--|--|--|
| <p>使用；置放塗藥支架 6 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(90/1/1、94/8/1、101/12/1)</p> <p>3. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用期間可再延長 1 個月。(101/12/1)</p> <p>4. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。(93/4/1、94/8/1、96/10/1)</p> <p>2.1.1.7. Eptifibatide (如 Integrilin)：</p> <p>(95/8/1、100/7/1)</p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔</p> | <p>使用；置放塗藥支架 6 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(90/1/1、94/8/1、101/12/1)</p> <p>3. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1 個月內得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併使用期間可再延長 1 個月。(101/12/1)</p> <p>4. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。(93/4/1、94/8/1、96/10/1)</p> <p>2.1.1.7. Eptifibatide (如 Integrilin)：</p> <p>(95/8/1、100/7/1)</p> <p>1. 限不穩定型心絞痛，對傳統療法無反應者，已預定施行經冠狀動脈成形術之不穩定狹心症時、作為 heparin 的輔</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 eptifibatide。</p> <p>2.1.1.8. Clopidogrel-acetylsalicylic acid (如 CoPlavix) : (100/9/1、101/12/1)</p> <p>1. 置放金屬支架 3 個月內得使用；置放塗藥支架 6 個月內得使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(100/9/1、101/12/1)</p> <p>2. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1 個月內得使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，使用期間可再延長 1 個月。(101/12/1)</p> <p>3. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。(100/9/1)</p> <p>2.1.1.9. Ticagrelor (如 Brilinta) : (102/7/1)</p> <p>限用於已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與</p> | <p>助療法，或非 Q 波之心肌梗塞之病患使用。</p> <p>2. 急性 Q 波心肌梗塞於症狀發生十二小時內，於執行 PTCA 時得併用 eptifibatide。</p> <p>2.1.1.8. Clopidogrel-acetylsalicylic acid (如 CoPlavix) : (100/9/1、101/12/1)</p> <p>1. 置放金屬支架 3 個月內得使用；置放塗藥支架 6 個月內得使用。需於病歷註明支架置放手術之日期。(100/9/1、101/12/1)</p> <p>2. 置放金屬支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，1 個月內得使用；置放塗藥支架後發生支架內再狹窄而施行藥物釋放型冠狀動脈氣球導管者，使用期間可再延長 1 個月。(101/12/1)</p> <p>3. 用於已發作之急性冠心症(不穩定性心絞痛和心肌梗塞)而住院的病人時，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。(100/9/1)</p> <p>2.1.1.9. Ticagrelor (如 Brilinta) : (102/7/1)</p> <p>限用於已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。</p> <p>2.1.2. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs (100/7/1)</p> <p>2.1.2.1. r-TPA (如 Actilyse Inj)、tenecteplase (如 Metalyse)： 用於血管（不含腦血管）血栓時： (91/12/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限具有心臟專科醫師之醫院使用。 2. 應使用於胸痛急性發作十二小時內，心電圖至少有二導極呈現心肌缺氧變化，使用硝化甘油舌下片歷經三十分鐘尚未能解除胸痛，有急性心肌梗塞之臆斷者。 3. 懷疑有急性肺動脈栓塞病人。 4. 有周邊血管血栓病人。 (93/1/1) 5. 應使用於無出血傾向之病人。有出血傾向之病人，或最近有手術或出血現象之病人應避免使用。 6. 使用本藥劑前宜先檢查病患血小板、出血時間、凝血時間、凝血原時間及血漿纖維原含量。 7. 醫院於病例發生時，應填寫「全民健康保險使用 r-TPA (Actilyse) 或 tenecteplase | <p>acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 9 個月。需於病歷註明住院時間。</p> <p>2.1.2. 血栓溶解劑 Thrombolytic drugs (100/7/1)</p> <p>2.1.2.1. r-TPA (如 Actilyse Inj)、tenecteplase (如 Metalyse)： 用於血管（不含腦血管）血栓時： (91/12/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限具有心臟專科醫師之醫院使用。 2. 應使用於胸痛急性發作十二小時內，心電圖至少有二導極呈現心肌缺氧變化，使用硝化甘油舌下片歷經三十分鐘尚未能解除胸痛，有急性心肌梗塞之臆斷者。 3. 懷疑有急性肺動脈栓塞病人。 4. 有周邊血管血栓病人。 (93/1/1) 5. 應使用於無出血傾向之病人。有出血傾向之病人，或最近有手術或出血現象之病人應避免使用。 6. 使用本藥劑前宜先檢查病患血小板、出血時間、凝血時間、凝血原時間及血漿纖維原含量。 7. 醫院於病例發生時，應填寫「全民健康保險使用 r-TPA (Actilyse) 或 tenecteplase | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(Metalyse Inj.) 申報表 (血管 (不含腦血管) 血栓病患用) (請詳附表二-A) 併附兩張有意義之不同時段心電圖於當月份醫療費用申報。(93/1/1)</p> <p>8. 醫院如擬將 r-TPA 或 tenecteplase 列為常備藥品, 請於申報時檢附心臟病診斷設備, 加護病房 (ICU 或 CCU) 之相關資料, 經本保險同意後再按使用規定辦理。</p> <p>2.1.2.2. r-TPA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時: (93/1/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限急性缺血性腦中風三小時內使用。 2. 使用醫院應具有神經內、外專科醫師及加護病房或同等級之設施。 3. 使用本藥品前, 應先作病人腦部電腦斷層或磁共振造影檢查、神經學檢查 (含 NIHSS)、心電圖、胸部 X 光、凝血時間、凝血酶原時間、肝腎功能及血糖, 並且必須符合「急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表」(請詳附表二-C) 之條件。 4. 醫院於病例發生後, 於當月醫療費用申報時, 應填寫「全民健康保險使用 r-TPA (Actilyse) 申請表 (急 | <p>(Metalyse Inj.) 申報表 (血管 (不含腦血管) 血栓病患用) (請詳附表二-A) 併附兩張有意義之不同時段心電圖於當月份醫療費用申報。(93/1/1)</p> <p>8. 醫院如擬將 r-TPA 或 tenecteplase 列為常備藥品, 請於申報時檢附心臟病診斷設備, 加護病房 (ICU 或 CCU) 之相關資料, 經本保險同意後再按使用規定辦理。</p> <p>2.1.2.2. r-TPA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時: (93/1/1、100/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限急性缺血性腦中風三小時內使用。 2. 使用醫院應具有神經內、外專科醫師及加護病房或同等級之設施。 3. 使用本藥品前, 應先作病人腦部電腦斷層或磁共振造影檢查、神經學檢查 (含 NIHSS)、心電圖、胸部 X 光、凝血時間、凝血酶原時間、肝腎功能及血糖, 並且必須符合「急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表」(請詳附表二-C) 之條件。 4. 醫院於病例發生後, 於當月醫療費用申報時, 應填寫「全民健康保險使用 r-TPA (Actilyse) 申請表 (急 | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>性缺血性腦中風病患用)」（請詳附表二-B），並附注射前及 24 小時、36 小時後之腦部電腦斷層（或磁振造影檢查）與 NIHSS。</p> <p>2.1.2.3. 刪除(101/4/1)</p> <p>2.1.3. 肝素類 Heparin group</p> <p>2.1.3.1. Tinzaparin 注射劑（如 Innohep）： 90/7/1、91/9/1、100/7/1)</p> <p>1. 用於治療深層靜脈栓塞，每療程以二瓶為限。</p> <p>2. 用於預防手術病人深層靜脈栓塞，每療程以一瓶為限。</p> <p>3. 用於治療肺栓塞。</p> <p>2.1.4. 其他抗血栓劑 Other antithrombotic agents：(100/7/1)</p> <p>2.1.4.1. Fondaparinux（如 Arixtra）：(100/4/1、100/7/1、103/2/1) 限用於</p> <p>1. 治療 ST 段升高型心肌梗塞(STEMI)的急性冠狀症候群之病患，藉以預防使用血栓溶解劑治療或原先即不準備接受任何其它型式之再灌流治療的患者發生死亡和心肌再度梗塞。</p> <p>2. 治療年齡大於或等於 60 歲患有不穩定型心絞痛或非 ST 段升高型心肌梗塞(UA/NSTEMI)且不適合接受緊急(120 分鐘內)侵入性治療(PCI)</p> | <p>性缺血性腦中風病患用)」（請詳附表二-B），並附注射前及 24 小時、36 小時後之腦部電腦斷層（或磁振造影檢查）與 NIHSS。</p> <p>2.1.2.3. 刪除(101/4/1)</p> <p>2.1.3. 肝素類 Heparin group</p> <p>2.1.3.1. Tinzaparin 注射劑（如 Innohep）： 90/7/1、91/9/1、100/7/1)</p> <p>1. 用於治療深層靜脈栓塞，每療程以二瓶為限。</p> <p>2. 用於預防手術病人深層靜脈栓塞，每療程以一瓶為限。</p> <p>3. 用於治療肺栓塞。</p> <p>2.1.4. 其他抗血栓劑 Other antithrombotic agents：(100/7/1)</p> <p>2.1.4.1. Fondaparinux（如 Arixtra）：(100/4/1、100/7/1、103/2/1) 限用於</p> <p>1. 治療 ST 段升高型心肌梗塞(STEMI)的急性冠狀症候群之病患，藉以預防使用血栓溶解劑治療或原先即不準備接受任何其它型式之再灌流治療的患者發生死亡和心肌再度梗塞。</p> <p>2. 治療年齡大於或等於 60 歲患有不穩定型心絞痛或非 ST 段升高型心肌梗塞(UA/NSTEMI)且不適合接受緊急(120 分鐘內)侵入性治療(PCI)</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>者，其症狀開始時間需在 24 小時之內，且血清肌酸酐需小於 3.0 mg/dL。(103/2/1)</p> <p>3. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髌或膝關節置換術或再置換術後，預防其術後之靜脈血栓（VTE），限用 2.5 mg 針劑皮下注射，每日一劑，最多 5 週： (103/2/1)</p> <p>(1) 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。</p> <p>(2) 經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2.1.4.2. Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1、105/5/1) 限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髌或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用 10mg 錠劑，每日一粒，人工髌關節手術術後治療，最多 5 週；人工膝關節</p> | <p>者，其症狀開始時間需在 24 小時之內，且血清肌酸酐需小於 3.0 mg/dL。(103/2/1)</p> <p>3. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髌或膝關節置換術或再置換術後，預防其術後之靜脈血栓（VTE），限用 2.5 mg 針劑皮下注射，每日一劑，最多 5 週： (103/2/1)</p> <p>(1) 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。</p> <p>(2) 經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2.1.4.2. Rivaroxaban (如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1) 限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髌或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用 10 mg 錠劑，每日一粒，人工髌關節手術術後治療，最多 5 週；人工膝關節</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>手術術後治療，最多 2 週：</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患；</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、103/5/1、105/5/1)</p> <p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>(6)每日 1 次，每次限 1 顆。(103/5/1)</p> <p>(7)排除標準： I 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。 II 14 天內發生中風。</p> | <p>手術術後治療，最多 2 週：</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患；</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、103/5/1)</p> <p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>(6)每日 1 次，每次限 1 顆。(103/5/1)</p> <p>(7)排除標準： I 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。 II 14 天內發生中風。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>III 收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>IV 有增加出血風險的情況。</p> <p>V 肌酸酐清除率<u>小於 15mL/min</u>。</p> <p>VI 活動性肝病和懷孕。</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞 (103/5/1、104/12/1)：</p> <p>(1) 須經影像學或血管超音波檢查診斷。</p> <p>(2) 第 1 日至 21 日，每日早晚各一次，每次限用一粒。</p> <p>(3) 第 22 日起，每日一次，每次限用一粒，每 6 個月評估一次。</p> <p>2.1.4.3. Apixaban (如 Eliquis) (103/6/1)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <p>(1) 曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2) 左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3) 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4) 年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5) 年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> | <p>III 收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>IV 有增加出血風險的情況。</p> <p>V 肌酸酐清除率小 30 mL/min。</p> <p>VI 活動性肝病和懷孕。</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞 (103/5/1、104/12/1)：</p> <p>(1) 須經影像學或血管超音波檢查診斷。</p> <p>(2) 第 1 日至 21 日，每日早晚各一次，每次限用一粒。</p> <p>(3) 第 22 日起，每日一次，每次限用一粒，每 6 個月評估一次。</p> <p>2.1.4.3. Apixaban (如 Eliquis) (103/6/1)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <p>(1) 曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2) 左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3) 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4) 年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5) 年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> | |
|---|--|--|

(6)每日2次，每次限用1顆。

2. 排除標準：

(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

(2)14天內發生中風。

(3)收案前的6個月內發生嚴重中風。

(4)有增加出血風險的情況。

(5)肌酸酐清除率小於30 mL/min。

(6)活動性肝病和懷孕。

2.1.4.4. Edoxaban(如

Lixiana)：

(105/9/1)

限用於

1. 非瓣膜性心房纖維顫動

病患：

(1)須符合下列條件之

一：

I. 曾發生中風或全身性栓塞。

II. 左心室射出分率小於40%。

III. 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。

IV. 年齡75歲(含)以上。

V. 年齡介於65歲至74歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。

(2)每日1次，每次限1顆。

(3)排除標準：

I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

(6)每日2次，每次限用1顆。

2. 排除標準：

(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

(2)14天內發生中風。

(3)收案前的6個月內發生嚴重中風。

(4)有增加出血風險的情況。

(5)肌酸酐清除率小於30 mL/min。

(6)活動性肝病和懷孕。

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>II. 14 天內發生中風。</u></p> <p><u>III. 收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</u></p> <p><u>IV. 有增加出血風險的情況。</u></p> <p><u>V. 肌酸酐清除率小於 15 mL/min，或大於 95 mL/min。</u></p> <p><u>VI. 活動性肝病和懷孕。</u></p> <p>2. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞：</p> <p>(1) 須經影像學或血管超音波檢查診斷。</p> <p>(2) 接受至少 5 日非經腸道抗凝血劑注射治療後，開始每日 1 次，每次限 1 顆，每 6 個月評估一次。</p> <p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑 (Direct thrombin inhibitors (101/6/1、104/12/1))</p> <p>2.1.5.1. Dabigatran 110mg 及 150mg (如 Pradaxa 110mg 及 150mg) (101/6/1、104/12/1)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <p>(1) 曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2) 左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3) 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4) 年齡 75 歲(含)以</p> | <p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑 (Direct thrombin inhibitors (101/6/1、104/12/1))</p> <p>2.1.5.1. Dabigatran 110mg 及 150mg (如 Pradaxa 110mg 及 150mg) (101/6/1、104/12/1)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <p>(1) 曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2) 左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3) 有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4) 年齡 75 歲(含)以</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>2. 排除標準：</p> <p>(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>(2)14 天內發生中風。</p> <p>(3)收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>(4)有增加出血風險的情況。</p> <p>(5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。</p> <p>(6)活動性肝病和懷孕。</p> <p>2.1.5.2. Dabigatran 75mg (如 Pradaxa 75mg) (104/12/1)</p> <p>1. 限用於靜脈血栓高危險 (符合下列條件之一) 病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用 75mg，每日至多二粒，人工髖關節手術術後治療，最多 5 週；人工膝關節手術術後治療，最多 2 週：</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程) 之病患。</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography)、靜脈攝影 (Venography) 或血</p> | <p>上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> <p>2. 排除標準：</p> <p>(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>(2)14 天內發生中風。</p> <p>(3)收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>(4)有增加出血風險的情況。</p> <p>(5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。</p> <p>(6)活動性肝病和懷孕。</p> <p>2.1.5.2. Dabigatran 75mg (如 Pradaxa 75mg) (104/12/1)</p> <p>1. 限用於靜脈血栓高危險 (符合下列條件之一) 病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用 75mg，每日至多二粒，人工髖關節手術術後治療，最多 5 週；人工膝關節手術術後治療，最多 2 週：</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程) 之病患。</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography)、靜脈攝影 (Venography) 或血</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 排除標準：</p> <p>(1) 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>(2) 14 天內發生中風。</p> <p>(3) 收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>(4) 有增加出血風險的情況。</p> <p>(5) 肌酸酐清除率小於 30 mL/min。</p> <p>(6) 活動性肝病和懷孕。</p> <p>2.2. 血管擴張劑 Vasodilators</p> <p>2.2.1. (刪除) (101/9/1)</p> <p>2.2.2. Nimodipine inj (如 Nimotop) : (87/4/1、93/2/1)</p> <p>預防、治療因動膜瘤引起之蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損，可使用二星期，需附電腦斷層掃描 (CT Scan) 報告。</p> <p>2.2.3. Papaverine inj : 限血管攝影及血管手術病例使用。</p> <p>2.3. 血管收縮劑 Vasoconstrictors</p> <p>2.3.1. Sumatriptan succinate (如 Imigran) ; rizatriptan (如 Migoff) : (88/9/1、93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/6/1、97/9/1)</p> <p>1. 限符合國際頭痛協會 (International</p> | <p>中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 排除標準：</p> <p>(1) 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>(2) 14 天內發生中風。</p> <p>(3) 收案前的 6 個月內發生嚴重中風。</p> <p>(4) 有增加出血風險的情況。</p> <p>(5) 肌酸酐清除率小於 30 mL/min。</p> <p>(6) 活動性肝病和懷孕。</p> <p>2.2. 血管擴張劑 Vasodilators</p> <p>2.2.1. (刪除) (101/9/1)</p> <p>2.2.2. Nimodipine inj (如 Nimotop) : (87/4/1、93/2/1)</p> <p>預防、治療因動膜瘤引起之蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損，可使用二星期，需附電腦斷層掃描 (CT Scan) 報告。</p> <p>2.2.3. Papaverine inj : 限血管攝影及血管手術病例使用。</p> <p>2.3. 血管收縮劑 Vasoconstrictors</p> <p>2.3.1. Sumatriptan succinate (如 Imigran) ; rizatriptan (如 Migoff) : (88/9/1、93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/6/1、97/9/1)</p> <p>1. 限符合國際頭痛協會 (International</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Headache Society) 一九八八年訂定的「偏頭痛」診斷標準者： (97/9/1)</p> <p>(1)至少有一次能符合 (2)至(4)項的發作。</p> <p>(2)頭痛發作持續四至七十二小時。</p> <p>(3)頭痛至少具下列二項特徵：</p> <p>I 單側 II 搏動性 III 程度中等或重度(日常生活受限制甚或禁絕) IV 上下樓梯或類似之日常活動會使頭痛加劇</p> <p>(4)當頭痛發作時至少有下列一情形：</p> <p>I 噁心或嘔吐 II 畏光及怕吵</p> <p>2. 偏頭痛之發作嚴重影響日常生活(無法工作或作家事或上課)者。 (97/9/1)</p> <p>3. 經使用其他藥物無效者。</p> <p>4. 每月限用四次，且</p> <p>(1)Sumatriptan succinate 口服劑型藥品每次用量不超過100 mg，每月不超過400 mg。</p> <p>(2)Sumatriptan succinate 鼻噴劑型藥品每次用量不超過一劑(10mg 或20mg)，每月不超過四劑(10mg 或20mg)。</p> | <p>Headache Society) 一九八八年訂定的「偏頭痛」診斷標準者： (97/9/1)</p> <p>(1)至少有一次能符合 (2)至(4)項的發作。</p> <p>(2)頭痛發作持續四至七十二小時。</p> <p>(3)頭痛至少具下列二項特徵：</p> <p>I 單側 II 搏動性 III 程度中等或重度(日常生活受限制甚或禁絕) IV 上下樓梯或類似之日常活動會使頭痛加劇</p> <p>(4)當頭痛發作時至少有下列一情形：</p> <p>I 噁心或嘔吐 II 畏光及怕吵</p> <p>2. 偏頭痛之發作嚴重影響日常生活(無法工作或作家事或上課)者。 (97/9/1)</p> <p>3. 經使用其他藥物無效者。</p> <p>4. 每月限用四次，且</p> <p>(1)Sumatriptan succinate 口服劑型藥品每次用量不超過100 mg，每月不超過400 mg。</p> <p>(2)Sumatriptan succinate 鼻噴劑型藥品每次用量不超過一劑(10mg 或20mg)，每月不超過四劑(10mg 或20mg)。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/9/1)</p> <p>(3) Rizatriptan 口服劑型藥品每次用量不超過 10 mg，每月不超過 40 mg。</p> <p>(97/6/1)</p> <p>5. 不得同時處方含有 ergotamine 製劑或其衍生物類藥物。</p> <p>6. 不得作為預防性使用。</p> <p>7. 不得使用於曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、Prinzmetal 氏狹心症、冠狀血管痙攣者及高血壓未受控制的患者。</p> <p>8. 青少年符合上述第 1、2、3 項者，限使用鼻噴劑型藥品。(97/9/1)</p> <p>2. 4. 泌尿道疾患治療藥物 Agents used to treat urological disorders</p> <p>2. 4. 1. Alprostadil： (86/9/1) 如用於勃起機能障礙之治療，不予給付。</p> <p>2. 4. 2. Potassium citrate (如 Urocit-K tab)： 限泌尿道結石或腎小管性酸毒症病人使用。</p> <p>2. 4. 3. Pentosan Polysulfate Sodium (如 Elmiron Cap)(92/12/1)</p> <p>1. 用於間質性膀胱炎。</p> <p>2. 病患應同時符合下列情形： (1) 出現尿急、頻尿、骨盆腔疼痛、夜尿症狀一年以上。</p> <p>(2) 尿液常規檢查或培養</p> | <p>(93/8/1、94/11/1、97/1/1、97/9/1)</p> <p>(3) Rizatriptan 口服劑型藥品每次用量不超過 10 mg，每月不超過 40 mg。</p> <p>(97/6/1)</p> <p>5. 不得同時處方含有 ergotamine 製劑或其衍生物類藥物。</p> <p>6. 不得作為預防性使用。</p> <p>7. 不得使用於曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病、Prinzmetal 氏狹心症、冠狀血管痙攣者及高血壓未受控制的患者。</p> <p>8. 青少年符合上述第 1、2、3 項者，限使用鼻噴劑型藥品。(97/9/1)</p> <p>2. 4. 泌尿道疾患治療藥物 Agents used to treat urological disorders</p> <p>2. 4. 1. Alprostadil： (86/9/1) 如用於勃起機能障礙之治療，不予給付。</p> <p>2. 4. 2. Potassium citrate (如 Urocit-K tab)： 限泌尿道結石或腎小管性酸毒症病人使用。</p> <p>2. 4. 3. Pentosan Polysulfate Sodium (如 Elmiron Cap)(92/12/1)</p> <p>1. 用於間質性膀胱炎。</p> <p>2. 病患應同時符合下列情形： (1) 出現尿急、頻尿、骨盆腔疼痛、夜尿症狀一年以上。</p> <p>(2) 尿液常規檢查或培養</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>無感染，及尿液細胞學檢查無惡性細胞。</p> <p>(3) 麻醉下膀胱鏡水擴張後出現腎絲球狀出血 (glomerulation) 或 Hunner's 潰瘍，或未出血但膀胱容量在麻醉下小於 500 毫升。</p> <p>(4) 連續二天排尿日誌顯示每次排尿量少於 300 毫升，且每天排尿次數至少大於十次以上。</p> <p>(5) 曾以傳統治療 (包括膀胱擴張、藥物、物理治療等) 治療四週以上仍無效果者。</p> <p>3. 原則上每一療程以六個月為限，療程結束前應評估其療效，如症狀未有改善且無不良反應出現者，可再繼續另一療程。</p> <p>4. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>2. 5. (刪除)(100/7/1)</p> <p>2. 6. 降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia</p> <p>2. 6. 1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表 (86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1)</p> <p>2. 6. 2. Ezetimibe (如 Ezetrol Tablets) : (94/6/1)</p> <p>原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子</p> | <p>無感染，及尿液細胞學檢查無惡性細胞。</p> <p>(3) 麻醉下膀胱鏡水擴張後出現腎絲球狀出血 (glomerulation) 或 Hunner's 潰瘍，或未出血但膀胱容量在麻醉下小於 500 毫升。</p> <p>(4) 連續二天排尿日誌顯示每次排尿量少於 300 毫升，且每天排尿次數至少大於十次以上。</p> <p>(5) 曾以傳統治療 (包括膀胱擴張、藥物、物理治療等) 治療四週以上仍無效果者。</p> <p>3. 原則上每一療程以六個月為限，療程結束前應評估其療效，如症狀未有改善且無不良反應出現者，可再繼續另一療程。</p> <p>4. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>2. 5. (刪除)(100/7/1)</p> <p>2. 6. 降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia</p> <p>2. 6. 1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表 (86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1)</p> <p>2. 6. 2. Ezetimibe (如 Ezetrol Tablets) : (94/6/1)</p> <p>原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者並符合下列條件之一者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表且對 Statins 類藥品發生無法耐受藥物不良反應 (如 Severe myalgia、Myositis) 者。 2. 符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表經使用 Statins 類藥品單一治療 3 個月未達治療目標者，得合併使用本案藥品與 Statins 類藥品。 <p>2.6.3. Ezetimibe + simvastatin (如 Vytorin 10/20mg、Vytorin 10/10mg)：(95/12/1)：</p> <p>限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患並符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表者。</p> <p>2.7. 乙型擬交感神經阻斷劑 Beta blocking agents：metoprolol succinate 23.75mg (如 Betaloc ZOK 25mg) (93/5/1)</p> <p>限用於慢性心衰竭病患。</p> <p>2.8. 其他 Miscellaneous</p> <p>2.8.1. 腦循環改善劑、腦代謝改善劑及血球流變改善劑：(87/4/1)</p> <p>因治療上需要使用腦循環改善劑或腦代謝改善</p> | <p>性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者並符合下列條件之一者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表且對 Statins 類藥品發生無法耐受藥物不良反應 (如 Severe myalgia、Myositis) 者。 2. 符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表經使用 Statins 類藥品單一治療 3 個月未達治療目標者，得合併使用本案藥品與 Statins 類藥品。 <p>2.6.3. Ezetimibe + simvastatin (如 Vytorin 10/20mg、Vytorin 10/10mg)：(95/12/1)：</p> <p>限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH)病患並符合全民健康保險降血脂藥物給付規定表者。</p> <p>2.7. 乙型擬交感神經阻斷劑 Beta blocking agents：metoprolol succinate 23.75mg (如 Betaloc ZOK 25mg) (93/5/1)</p> <p>限用於慢性心衰竭病患。</p> <p>2.8. 其他 Miscellaneous</p> <p>2.8.1. 腦循環改善劑、腦代謝改善劑及血球流變改善劑：(87/4/1)</p> <p>因治療上需要使用腦循環改善劑或腦代謝改善</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>劑或血球流變改善劑時，最多使用一類，且需檢附相關之紀錄或報告，並於病歷上詳細記載。</p> <p>2.8.2. 肺動脈高血壓治療劑 (95/1/1、97/6/1、98/12/1、99/11/1、100/4/1、103/7/1、104/6/1、104/8/1)：</p> <p>此類藥物原則上不得併用，惟符合下列之一情況者，得經事前審查核准通過接受合併治療：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WHO Functional Class III 及 IV 嚴重且危及生命之原發性肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療成效不佳時。 2. WHO Functional Class III 之先天性心臟病續發肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療三個月後成效不佳時。 (104/8/1) <p>2.8.2.1. Iloprost (如 Ventavis、Ilomedin-20)：(95/1/1、99/11/1、100/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 吸入劑：限用於原發性肺動脈高血壓之治療。 2. 輸注液：限用於原發性肺動脈高血壓且合併右心室衰竭嚴重度高於 class III。 3. 需經事前審查核准後使用。 <p>2.8.2.2. Sildenafil (如 Revatio)：(97/6/1、100/4/1、102/8/1)</p> | <p>劑或血球流變改善劑時，最多使用一類，且需檢附相關之紀錄或報告，並於病歷上詳細記載。</p> <p>2.8.2. 肺動脈高血壓治療劑 (95/1/1、97/6/1、98/12/1、99/11/1、100/4/1、103/7/1、104/6/1、104/8/1)：</p> <p>此類藥物原則上不得併用，惟符合下列之一情況者，得經事前審查核准通過接受合併治療：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WHO Functional Class III 及 IV 嚴重且危及生命之原發性肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療成效不佳時。 2. WHO Functional Class III 之先天性心臟病續發肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療三個月後成效不佳時。 (104/8/1) <p>2.8.2.1. Iloprost (如 Ventavis、Ilomedin-20)：(95/1/1、99/11/1、100/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 吸入劑：限用於原發性肺動脈高血壓之治療。 2. 輸注液：限用於原發性肺動脈高血壓且合併右心室衰竭嚴重度高於 class III。 3. 需經事前審查核准後使用。 <p>2.8.2.2. Sildenafil (如 Revatio)：(97/6/1、100/4/1、102/8/1)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. 用於原發性肺動脈高血壓、結締組織病變導致之肺動脈高血壓或先天性心臟病併發之肺動脈高血壓(Eisenmenger 症候群)運動能力差 (WHO Functional Class III 及 IV) 患者。 (102/8/1)。</p> <p>2. 不得與任何有機硝酸鹽藥物合併使用。</p> <p>2.8.2.3. Ambrisentan (如 Volibris) ; macitentan (如 Opsumit) (98/12/1、103/7/1、104/8/1) :</p> <p>1. 限用於原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.4. Riociguat (如 Adempas) (104/6/1) :</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>(2)無法手術或術後仍持續發生或復發、肺功能分級為 WHO 第 II 級到第 III 級的慢性血栓栓塞性肺高壓 (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension)之成年患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.5. Bosentan (如</p> | <p>1. 用於原發性肺動脈高血壓、結締組織病變導致之肺動脈高血壓或先天性心臟病併發之肺動脈高血壓(Eisenmenger 症候群)運動能力差 (WHO Functional Class III 及 IV) 患者。 (102/8/1)。</p> <p>2. 不得與任何有機硝酸鹽藥物合併使用。</p> <p>2.8.2.3. Ambrisentan (如 Volibris) ; macitentan (如 Opsumit) (98/12/1、103/7/1、104/8/1) :</p> <p>1. 限用於原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.4. Riociguat (如 Adempas) (104/6/1) :</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>(2)無法手術或術後仍持續發生或復發、肺功能分級為 WHO 第 II 級到第 III 級的慢性血栓栓塞性肺高壓 (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension)之成年患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.5. Bosentan (如</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Tracleer) (98/12/1、103/7/1、104/8/1)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於原發性肺動脈高血壓。 2. 用於因先天性心臟病續發 WHO Functional Class III 肺動脈高血壓(伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology)。 3. 需經事前審查核准後使用。 4. 每次限用 1 粒。 <p>2.9. 利尿劑 Diuretics (100/1/1)</p> <p>2.9.1. Eplerenone (如 Inspra)：(100/1/1、104/12/1)</p> <p>限使用於對 spironolactone 無法耐受之下述個案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 心肌梗塞後之心衰竭病人。 2. 紐約心臟學會(NYHA)心臟功能分類第 II 級(含)以上之慢性心衰竭及左心室收縮功能不全(LVEF ≤ 30%)的成人患者。(104/12/1) <p>2.10. 抗心律不整劑 Antiarrhythmics (100/8/1)</p> <p>2.10.1. Dronedarone (如 Multaq) (100/8/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律 (sinus | <p>Tracleer) (98/12/1、103/7/1、104/8/1)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於原發性肺動脈高血壓。 2. 用於因先天性心臟病續發 WHO Functional Class III 肺動脈高血壓(伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology)。 3. 需經事前審查核准後使用。 4. 每次限用 1 粒。 <p>2.9. 利尿劑 Diuretics (100/1/1)</p> <p>2.9.1. Eplerenone (如 Inspra)：(100/1/1、104/12/1)</p> <p>限使用於對 spironolactone 無法耐受之下述個案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 心肌梗塞後之心衰竭病人。 2. 紐約心臟學會(NYHA)心臟功能分類第 II 級(含)以上之慢性心衰竭及左心室收縮功能不全(LVEF ≤ 30%)的成人患者。(104/12/1) <p>2.10. 抗心律不整劑 Antiarrhythmics (100/8/1)</p> <p>2.10.1. Dronedarone (如 Multaq) (100/8/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multaq 適用於最近 6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL)，且目前處於竇性節律 (sinus | |
|---|---|--|

rhythm) 狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：

- (1) 年齡 ≥ 70 歲以上，曾有過心房纖維顫動 (AF) 或心房撲動 (AFL) 之病患；
- (2) 65 \leq 年齡 < 70 歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者 (例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑 $\geq 50\text{mm}$ 或左心室射出率【LVEF】 $< 40\%$)。

2. 不得使用於有心衰竭住院診斷史病人。

2.11. 抗痛風劑 Antigout agents

2.11.1. Febuxostat (如 Feburic) : (101/4/1、103/3/1、105/8/1)

限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1. 曾使用過降尿酸藥物 benzbromarone 治療反應不佳，尿酸值仍高於 6.0 mg/dL。
(103/3/1)
2. 患有慢性腎臟病 (eGFR $< 45 \text{ mL/min/1.73m}^2$ 或 serum creatinine $\geq 1.5\text{mg/dL}$)，或具尿酸性腎臟結石或尿酸性尿路結石，或肝硬化之痛風病人。(103/3/1、

rhythm) 狀態或即將接受治療成為正常節律的患者，可降低病患發生心血管疾病而住院的風險：

- (1) 年齡 ≥ 70 歲以上，曾有過心房纖維顫動 (AF) 或心房撲動 (AFL) 之病患；
- (2) 65 \leq 年齡 < 70 歲，且帶有下列心血管相關危險因子之一的患者 (例如：高血壓、糖尿病、曾發生過腦血管意外、左心房直徑 $\geq 50\text{mm}$ 或左心室射出率【LVEF】 $< 40\%$)。

2. 不得使用於有心衰竭住院診斷史病人。

2.11. 抗痛風劑 Antigout agents

2.11.1. Febuxostat (如 Feburic) : (101/4/1、103/3/1)

限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1. 曾使用過降尿酸藥物 benzbromarone 治療反應不佳，尿酸值仍高於 6.0 mg/dL。
(103/3/1)
2. 患有慢性腎臟病 (eGFR $< 45 \text{ mL/min/1.73m}^2$ 或 serum creatinine $\geq 1.5\text{mg/dL}$) 或肝硬化之痛風病人。
(103/3/1)

105/8/1)

2.11.2. 含 allopurinol 成分製劑(105/2/1)

1. 限使用於痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症之治療。
2. 本藥品可能發生嚴重藥物不良反應，故不得使用於非核准之適應症。且須充分提醒病人相關不良反應症狀及後續作為。

2.12. Ivabradine(如 Coralan) (103/5/1)

- 限符合下列各項條件之慢性心衰竭患者使用：
 - (1)依紐約心臟協會(NYHA)衰竭功能分級為第二級或第三級。
 - (2)心臟收縮性功能不全，且 Ejection Fraction $\leq 35\%$ 。
 - (3)竇性心率且每分鐘心跳速率 ≥ 75 。
 - (4)對使用 β -阻斷劑為禁忌症或不耐受時。
- 每日使用二次，每次用量限不超過一粒。

2.13. Tolvaptan (如 Samsca)(105/9/1) :

- 限用於住院病人罹患心臟衰竭及抗利尿激素分泌不當症候群(SIADH)引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於125mEq/L)，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48 小時以上症狀仍

2.12. Ivabradine(如 Coralan) (103/5/1)

- 限符合下列各項條件之慢性心衰竭患者使用：
 - (1)依紐約心臟協會(NYHA)衰竭功能分級為第二級或第三級。
 - (2)心臟收縮性功能不全，且 Ejection Fraction $\leq 35\%$ 。
 - (3)竇性心率且每分鐘心跳速率 ≥ 75 。
 - (4)對使用 β -阻斷劑為禁忌症或不耐受時。
- 每日使用二次，每次用量限不超過一粒。

無法改善之成年患者，
鈉濃度達 125mEq/L(含)
以上應即停藥。

2. 每位病人每年限給付 3
次療程，同次住院限給
付 1 次療程。每次療程
最多給付 4 日，每日最
多給付 1 粒。

3. 須於使用後監測肝功
能，肝功能指數大於正
常上限 3 倍者應停用。

第 4 節 血液治療藥物

Hematological drugs

4. 1. 造血功能治療藥物

Hematopoietic agents

4. 1. 1. 紅血球生成素(簡稱
EPO) hu-erythropoietin
(如 Eprex、Recormon)、
darbepoetin alfa (如
Aranesp)、methoxy
polyethylene glycol-
epoetin beta (如
Mircera solution for
injection in pre-
filled syringe) :
(93/5/1、95/11/1、
96/10/1、98/1/1、
98/9/1、104/12/1、
105/9/1)

1. 使用前和治療後每三至
六個月應作體內鐵質貯
存評估，如 Hb 在 8
gm/dL 以下，且
ferritin 小於 100
mg/dL(非透析病人)、或
200 mg/dL(透析病人)，
有可能是鐵質缺乏。
(104/12/1)。

2. 使用期間應排除維他命

第 4 節 血液治療藥物

Hematological drugs

4. 1. 造血功能治療藥物

Hematopoietic agents

4. 1. 1. 紅血球生成素(簡稱
EPO)hu-erythropoietin
(如 Eprex、Recormon)、
darbepoetin alfa (如
Aranesp)、methoxy
polyethylene glycol-
epoetin beta (如
Mircera solution for
injection in pre-
filled syringe) :
(93/5/1、95/11/1、
96/10/1、98/1/1、
98/9/1、104/12/1)

1. 使用前和治療後每三至
六個月應作體內鐵質貯
存評估，如 Hb 在 8
gm/dL 以下，且
ferritin 小於 100
mg/dL(非透析病人)、或
200 mg/dL(透析病人)，
有可能是鐵質缺乏。
(104/12/1)。

2. 使用期間應排除維他命

| | | |
|---|---|--|
| <p>B12 或葉酸缺乏，腸胃道出血，全身性感染或發炎疾病等情況，始得繼續。(104/12/1)。</p> <p>3. 限腎臟病並符合下列條件使用：(104/12/1)</p> <p>(1) 末期腎臟病接受透析病人，其 Hb <9gm/dL，或第五期慢性腎臟病病人 (eGFR < 15 mL/min/1.73 m²)，其 Hb < 9gm/dL。</p> <p>I. 使用時，應從小劑量開始，Hb 目標為 10 gm/dL，符合下列情形之病人，應即暫停使用本類藥品：</p> <p>i. Hb 超過 11gm/dL。</p> <p>ii. 接受治療第 6 週到第 8 週內 Hb 之上升值未達 1 gm/dL。</p> <p>II. 如 Hb 值維持在目標值一段時間 (一至二個月)，宜逐次減量，以求得最低維持劑量。</p> <p>(2) 每名病人所用劑量，一個月不超過 20,000U (如 Eprex、Recormon) 或 100mcg (如 Aranesp、Mircera solution for injection in pre-filled syringe) 為原則，如需超量使用，應附病人臨床資料(如年齡、前月 Hb</p> | <p>B12 或葉酸缺乏，腸胃道出血，全身性感染或發炎疾病等情況，始得繼續。(104/12/1)。</p> <p>3. 限腎臟病並符合下列條件使用：(104/12/1)</p> <p>(1) 末期腎臟病接受透析病人，其 Hb <9gm/dL，或第五期慢性腎臟病病人 (eGFR < 15 mL/min/1.73 m²)，其 Hb < 9gm/dL。</p> <p>I. 使用時，應從小劑量開始，Hb 目標為 10 gm/dL，符合下列情形之病人，應即暫停使用本類藥品：</p> <p>i. Hb 超過 11gm/dL。</p> <p>ii. 接受治療第 6 週到第 8 週內 Hb 之上升值未達 1 gm/dL。</p> <p>II. 如 Hb 值維持在目標值一段時間 (一至二個月)，宜逐次減量，以求得最低維持劑量。</p> <p>(2) 每名病人所用劑量，一個月不超過 20,000U (如 Eprex、Recormon) 或 100mcg (如 Aranesp、Mircera solution for injection in pre-filled syringe) 為原則，如需超量使用，應附病人臨床資料(如年齡、前月 Hb</p> | |
|---|---|--|

值、前月所用劑量、所定目標值…等等)及使用理由。(93/5/1、98/9/1)。

- (3)使用本類藥品之血液透析、腹膜透析(CAPD)及未透析患者因病情需要使用本類藥品時，應依下列頻率定期檢查 Hb 值，其檢查費用包含於透析費用內，不另給付(未接受透析病人除外)：
(105/9/1)

I. 血液透析及腹膜透析患者：每月應檢查乙次。(105/9/1)

II. 未透析患者：至少每3個月應檢查乙次。初次使用者，治療後6至8週應檢查乙次。
(105/9/1)

- (4)使用本類藥品期間如需輸血，請附輸血時 Hb 值及原因。
4. 限癌症病人合併化學治療有關的貧血。不含使用 Mircera solution for injection in pre-filled syringe：
(95/11/1、96/10/1、98/1/1、98/9/1、104/12/1)
- (1)限患有固態腫瘤接受化學藥物治療而引起之症狀性貧血，且 Hb < 8 gm/dL 之病人使用。對於癌症患者預期有合理且足夠的存

值、前月所用劑量、所定目標值…等等)及使用理由。(93/5/1、98/9/1)。

- (3)使用本類藥品之洗腎患者，每週應檢查 Hb 值乙次，CAPD 及未透析患者，如因病情需要使用本類藥品時，每月應檢查 Hb 值乙次。檢查費用包含於透析費用內，不另給付(未接受透析病人除外)。

- (4)使用本類藥品期間如需輸血，請附輸血時 Hb 值及原因。

4. 限癌症病人合併化學治療有關的貧血。不含使用 Mircera solution for injection in pre-filled syringe：
(95/11/1、96/10/1、98/1/1、98/9/1、104/12/1)
- (1)限患有固態腫瘤接受化學藥物治療而引起之症狀性貧血，且 Hb < 8 gm/dL 之病人使用。對於癌症患者預期有合理且足夠的存

| | | |
|---|---|--|
| <p>活時間者（含治癒性治療及預期輔助性化學治療等），不應使用 EPO 治療貧血。 （98/1/1、104/12/1）</p> <p>(2)Epoetin beta（如 Recormon）與 epoetin alfa（如 Eprex）初劑量為 150U/Kg 每週 3 次，最高劑量 300U/Kg 每週 3 次，或 epoetin beta（如 Recormon）初劑量 30,000 單位，epoetin alfa（如 Eprex）初劑量 40,000 單位，每週 1 次，最高劑量 60,000 單位，每週 1 次；Darbepoetin alfa（如 Aranesp）初劑量 2.25mcg/kg，每週 1 次，最高劑量 4.5mcg/kg，每週 1 次。（96/10/1）。</p> <p>(3)每次療程最長 24 週，如化學治療療程完全結束後 4 週也應停止 EPO 使用。 （104/12/1）</p> <p>(4)符合下列情形之病人，應即停止使用本類藥品：</p> <p>I. Hb 超過 10 gm/dL（Hb > 10gm/dL）。</p> <p>II. 於接受治療第 6 週到第 8 週內 Hb 之上升值未達 1 gm/dL。</p> <p>III. 化學治療結束後 4</p> | <p>活時間者（含治癒性治療及預期輔助性化學治療等），不應使用 EPO 治療貧血。 （98/1/1、104/12/1）</p> <p>(2)Epoetin beta（如 Recormon）與 epoetin alfa（如 Eprex）初劑量為 150U/Kg 每週 3 次，最高劑量 300U/Kg 每週 3 次，或 epoetin beta（如 Recormon）初劑量 30,000 單位，epoetin alfa（如 Eprex）初劑量 40,000 單位，每週 1 次，最高劑量 60,000 單位，每週 1 次；Darbepoetin alfa（如 Aranesp）初劑量 2.25mcg/kg，每週 1 次，最高劑量 4.5mcg/kg，每週 1 次。（96/10/1）。</p> <p>(3)每次療程最長 24 週，如化學治療療程完全結束後 4 週也應停止 EPO 使用。 （104/12/1）</p> <p>(4)符合下列情形之病人，應即停止使用本類藥品：</p> <p>I. Hb 超過 10 gm/dL（Hb > 10gm/dL）。</p> <p>II. 於接受治療第 6 週到第 8 週內 Hb 之上升值未達 1 gm/dL。</p> <p>III. 化學治療結束後 4</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>週(104/12/1)。</p> <p>4.1.2. 白血球生長激素(G-CSF)(101/6/1)：</p> <p>4.1.2.1. 短效型注射劑（如 filgrastim、lenograstim）： (85/10/1、93/4/1、96/1/1、101/6/1)</p> <p>1. 限</p> <p>(1)用於造血幹細胞移植患者。</p> <p>(2)血液惡性疾病接受靜注化學治療後。</p> <p>(3)先天性或循環性中性白血球低下症者(當白血球數量少於1000/cumm，或中性白血球(ANC)少於500/cumm)。</p> <p>(4)其他惡性疾病患者在接受化學治療後，曾經發生白血球少於1000/cumm，或中性白血球(ANC)少於500/cumm者，即可使用。(96/1/1)</p> <p>(5)重度再生不良性貧血病人嚴重感染時使用，惟不得作為此類病人之預防性使用(86/9/1)。</p> <p>(6)化學治療，併中性白血球缺乏之發燒，若中性白血球小於100/cumm、癌症不受控制、肺炎、低血壓、多器官衰竭或侵犯性黴菌感染等危機程度高之感染。</p> <p>(7)對於骨髓造血功能不</p> | <p>週(104/12/1)。</p> <p>4.1.2. 白血球生長激素(G-CSF)(101/6/1)：</p> <p>4.1.2.1. 短效型注射劑（如 filgrastim、lenograstim）： (85/10/1、93/4/1、96/1/1、101/6/1)</p> <p>1. 限</p> <p>(1)用於造血幹細胞移植患者。</p> <p>(2)血液惡性疾病接受靜注化學治療後。</p> <p>(3)先天性或循環性中性白血球低下症者(當白血球數量少於1000/cumm，或中性白血球(ANC)少於500/cumm)。</p> <p>(4)其他惡性疾病患者在接受化學治療後，曾經發生白血球少於1000/cumm，或中性白血球(ANC)少於500/cumm者，即可使用。(96/1/1)</p> <p>(5)重度再生不良性貧血病人嚴重感染時使用，惟不得作為此類病人之預防性使用(86/9/1)。</p> <p>(6)化學治療，併中性白血球缺乏之發燒，若中性白血球小於100/cumm、癌症不受控制、肺炎、低血壓、多器官衰竭或侵犯性黴菌感染等危機程度高之感染。</p> <p>(7)對於骨髓造血功能不</p> | |
|--|--|--|

良症候群 (MDS) 的病人，若因嚴重性的中性白血球過低

(ANC<500/cumm) 而併發感染時，可間歇性使用 G-CSF，但不得作為長期且常規性使用。

(8)週邊血液幹細胞的趨動—不論在自體或異體幹細胞的收集，應於收集前之 4~5 日開始皮下注射 G-CSF，其劑量為 10 μ g /KG/day。

2. 患者如白血球超過 4000/cumm，或中性白血球超過 2000/cumm 時，應即停藥。惟當預估其骨髓功能不易恢復時，雖其血球已達上述標準，仍可給予半量之治療，若仍可維持血球數，則可給予四分之一劑量，若仍可維持血球數，則停用。任何時候，若白血球或中性白血球數過度增高，即應停藥。

4.1.2.2. 長效型注射劑(如 pegfilgrastim)：
(101/6/1)

限非骨髓性癌症合併有骨髓侵犯之患者，在骨髓抑制性抗癌藥物治療後，且曾經發生白血球少於 1000/cumm，或中性白血球 (ANC) 少於 500/cumm 者使用。

4.2. 血液代用製劑及血液成

良症候群 (MDS) 的病人，若因嚴重性的中性白血球過低

(ANC<500/cumm) 而併發感染時，可間歇性使用 G-CSF，但不得作為長期且常規性使用。

(8)週邊血液幹細胞的趨動—不論在自體或異體幹細胞的收集，應於收集前之 4~5 日開始皮下注射 G-CSF，其劑量為 10 μ g /KG/day。

2. 患者如白血球超過 4000/cumm，或中性白血球超過 2000/cumm 時，應即停藥。惟當預估其骨髓功能不易恢復時，雖其血球已達上述標準，仍可給予半量之治療，若仍可維持血球數，則可給予四分之一劑量，若仍可維持血球數，則停用。任何時候，若白血球或中性白血球數過度增高，即應停藥。

4.1.2.2. 長效型注射劑(如 pegfilgrastim)：
(101/6/1)

限非骨髓性癌症合併有骨髓侵犯之患者，在骨髓抑制性抗癌藥物治療後，且曾經發生白血球少於 1000/cumm，或中性白血球 (ANC) 少於 500/cumm 者使用。

4.2. 血液代用製劑及血液成

| | | |
|--|--|--|
| <p>分製劑 blood substituents and blood components</p> <p>4.2.1. Human Albumin : (100/8/1)</p> <p>1. 本保險對象因病使用 Human Albumin 以符合下列適應症為限 (96/6/1、104/11/1) :</p> <p>(1) 休克病人擴充有效循環血液量</p> <p>I 休克病人至少已給生理鹽水或林格爾液等類溶液 1000 mL 後尚不能維持穩定血流動態，血比容 (hematocrit) > 30%，或血色素 (hemoglobin) > 10 gm/dL 需要繼續靜脈輸液時，宜優先使用合成膠類溶液，如 dextran、hydroxyethylstarch、polyvinylpyrrolidone 等。若無上述合適製劑，可給白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm (86/1/1)。</p> <p>II 70 歲以上老人及二歲以下幼兒或併有心衰竭的休克病人，無法忍受太多靜脈輸液時，可一開始即使用白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm。</p> | <p>分製劑 blood substituents and blood components</p> <p>4.2.1. Human Albumin : (100/8/1)</p> <p>1. 本保險對象因病使用 Human Albumin 以符合下列適應症為限 (96/6/1、104/11/1) :</p> <p>(1) 休克病人擴充有效循環血液量</p> <p>I 休克病人至少已給生理鹽水或林格爾液等類溶液 1000 mL 後尚不能維持穩定血流動態，血比容 (hematocrit) > 30%，或血色素 (hemoglobin) > 10 gm/dL 需要繼續靜脈輸液時，宜優先使用合成膠類溶液，如 dextran、hydroxyethylstarch、polyvinylpyrrolidone 等。若無上述合適製劑，可給白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm (86/1/1)。</p> <p>II 70 歲以上老人及二歲以下幼兒或併有心衰竭的休克病人，無法忍受太多靜脈輸液時，可一開始即使用白蛋白溶液，每一病人用量限 50 gm。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(2)病危、有腹水或水腫 併有血清白蛋白濃度 偏低病人</p> <p>I 血清白蛋白濃度低於 2.5 gm/dL</p> <p>i. 肝硬化症（有相當 之腹水或併發水 腫）每日最多用量 限 25 gm。</p> <p>ii. 腎病症候群（嚴重 蛋白尿致血清白蛋 白下降），每日最 多用量限 25 gm。</p> <p>iii 嚴重燒燙傷。</p> <p>iv 肝移植。</p> <p>v. 蛋白質流失性腸症 (protein-losing enteropathy) (104/11/1) 依下列規範使用： (i)經內視鏡或手 術或病理報告 證實為蛋白質 流失性腸症； 或糞便 alpha- 1- antitrypsin 升高。 (ii)滿 18 歲以內 兒童。</p> <p>II 血清白蛋白濃度低於 3.0 gm/dL (96/6/1)</p> <p>i 嚴重肺水腫。</p> <p>ii 大量肝切除 (>40 %)</p> <p>III 開心手術用於維持體 外循環液，用量限 37.5 gm。</p> <p>2. 注意事項</p> | <p>(2)病危、有腹水或水腫 併有血清白蛋白濃度 偏低病人</p> <p>I 血清白蛋白濃度低於 2.5 gm/dL</p> <p>i. 肝硬化症（有相當 之腹水或併發水 腫）每日最多用量 限 25 gm。</p> <p>ii. 腎病症候群（嚴重 蛋白尿致血清白蛋 白下降），每日最 多用量限 25 gm。</p> <p>iii 嚴重燒燙傷。</p> <p>iv 肝移植。</p> <p>v. 蛋白質流失性腸症 (protein-losing enteropathy) (104/11/1) 依下列規範使用： (i)經內視鏡或手 術或病理報告 證實為蛋白質 流失性腸症； 或糞便 alpha- 1- antitrypsin 升高。 (ii)滿 18 歲以內 兒童。</p> <p>II 血清白蛋白濃度低於 3.0 gm/dL (96/6/1)</p> <p>i 嚴重肺水腫。</p> <p>ii 大量肝切除 (>40 %)</p> <p>III 開心手術用於維持體 外循環液，用量限 37.5 gm。</p> <p>2. 注意事項</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>(1)血清白蛋白濃度檢驗日期最近3天以內，如係多次注射，限上次注射後，最近3天內之結果。</p> <p>(2)醫院於病例發生時，應填寫「全民健康保險病人使用 Human Albumin 申報表」(請詳附表四)，並附原始治療醫囑單於當月份申報醫療費用時送局辦理。</p> <p>(3)醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(100/8/1)</p> <p>4.2.2. 繞徑治療藥物(活化的第七因子 rVIIa, 如 NovoSeven 和活化的凝血酶原複合物濃縮劑 APCC, 如 Feiba): (88/6/1、93/7/1、94/2/1、98/8/1、103/4/1、<u>105/2/1</u>、<u>105/8/1</u>)</p> <p>1. 門診之血友病人得攜回二~三劑量繞徑治療藥物備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之二—全民健康保險血友病患者使用「繞徑治療藥物」在家治療紀錄)。醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(103/4/1)</p> <p>2. 缺乏第七凝血因子之病患：</p> | <p>(1)血清白蛋白濃度檢驗日期最近3天以內，如係多次注射，限上次注射後，最近3天內之結果。</p> <p>(2)醫院於病例發生時，應填寫「全民健康保險病人使用 Human Albumin 申報表」(請詳附表四)，並附原始治療醫囑單於當月份申報醫療費用時送局辦理。</p> <p>(3)醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(100/8/1)</p> <p>4.2.2. 繞徑治療藥物(活化的第七因子 rVIIa, 如 NovoSeven 和活化的凝血酶原複合物濃縮劑 APCC, 如 Feiba): (88/6/1、93/7/1、94/2/1、98/8/1、103/4/1)</p> <p>1. 門診之血友病人得攜回二~三劑量繞徑治療藥物備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之二—全民健康保險血友病患者使用「繞徑治療藥物」在家治療紀錄)。醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(103/4/1)</p> <p>2. 缺乏第七凝血因子之病患： 可以使用 rVIIa</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>可以使用 rVIIa 10~20 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV, q 2~3 hr, 1~3 劑至止血為止。</p> <p>3. 發生第八因子抗體之 A 型血友病患者：</p> <p>(1) 低反應者 (low responder) - 指第八 (或第九) 因子抗體力價平常 ≤ 5 BU/mL 以下, 再注射第八 (或第九) 因子後不會有記憶性反應。使用平常治療沒有抗體病人出血時兩倍劑量的第八因子, 可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑。如無效可以改用下述(2)之方法。</p> <p>(2) 高反應者 (high responder) - 指第八 (或第九) 因子抗體力價平常 > 5 BU/mL 以上, 即使降到 < 5 BU/mL 以下, 如再注射第八 (或第九) 因子都會有記憶性反應。</p> <p>I. 出血時抗體 ≤ 5 BU/mL：</p> <p>i. 輕度出血時：使用 rVIIa 70~90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV, q 2 hr, 1~3 劑或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量或 APCC 50~100 U/kg IV, q6-12h, 1 ~ 4 劑量。 (98/8/1)。 無效時改用下述 ii</p> | <p>10~20 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV, q 2~3 hr, 1~3 劑至止血為止。</p> <p>3. 發生第八因子抗體之 A 型血友病患者：</p> <p>(1) 低反應者 (low responder) - 指第八 (或第九) 因子抗體力價平常 ≤ 5 BU/mL 以下, 再注射第八 (或第九) 因子後不會有記憶性反應。使用平常治療沒有抗體病人出血時兩倍劑量的第八因子, 可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑。如無效可以改用下述(2)之方法。</p> <p>(2) 高反應者 (high responder) - 指第八 (或第九) 因子抗體力價平常 > 5 BU/mL 以上, 即使降到 < 5 BU/mL 以下, 如再注射第八 (或第九) 因子都會有記憶性反應。</p> <p>I. 出血時抗體 ≤ 5 BU/mL：</p> <p>i. 輕度出血時：使用 rVIIa 70~90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV, q 2 hr, 1~3 劑或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量或 APCC 50~100 U/kg IV, q6-12h, 1 ~ 4 劑量。 (98/8/1)。 無效時改用下述 ii</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>之方法。</p> <p>ii. 嚴重出血時：使用第八因子 100 U/kg IV bolus，然後第八因子 5~10 U/kg/hr IV inf. 或第八因子 100 U/kg IV q8-12 hr，至 5 天，可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑。無效時可使用下述 II 之方法。</p> <p>II. 出血時抗體>5 BU/mL：</p> <p>i. rVIIa70~90 μg/kg IV，q 2 hr，3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 μg/kg IV 單次注射劑量，可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑或 APCC 50~100 U/kg IV，q6-12h，3~4 劑量或至止血為止。(98/8/1)。如都無效則改用下述 ii。</p> <p>ii. 可改用體外吸收抗體的方式（如 protein A）或 Plasmaphoresis，去除大部分抗體後，再大量使用第八因子。</p> <p>(3)手術時：</p> <p>I 術前開始，術中及術後兩天 rVIIa 70~90 μg/kg IV，q2 ~3 hr。</p> | <p>之方法。</p> <p>ii. 嚴重出血時：使用第八因子 100 U/kg IV bolus，然後第八因子 5~10 U/kg/hr IV inf. 或第八因子 100 U/kg IV q8-12 hr，至 5 天，可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑。無效時可使用下述 II 之方法。</p> <p>II. 出血時抗體>5 BU/mL：</p> <p>i. rVIIa70~90 μg/kg IV，q 2 hr，3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 μg/kg IV 單次注射劑量，可以加上適當的抗纖維蛋白溶解劑或 APCC 50~100 U/kg IV，q6-12h，3~4 劑量或至止血為止。(98/8/1)。如都無效則改用下述 ii。</p> <p>ii. 可改用體外吸收抗體的方式（如 protein A）或 Plasmaphoresis，去除大部分抗體後，再大量使用第八因子。</p> <p>(3)手術時：</p> <p>I 術前開始，術中及術後兩天 rVIIa 70~90 μg/kg IV，q2 ~3 hr。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>II 術後第三天至傷口癒合，rVIIa 70~90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV，q 3 ~ 6 hr。</p> <p>III 或術前，術中及術後至傷口癒合 APCC 50~100 U/kg IV，q6-12hr，需留心病人有無過高凝血現象發生。</p> <p>4. 發生第九因子抗體之 B 型血友病患者。</p> <p>(1) 對第九因子沒有過敏反應者：</p> <p>I 低反應者 (\leq 5BU/mL)：使用平常劑量兩倍的第九因子。</p> <p>II 高反應者，出血時抗體在 \leq 5BU/mL：使用第九因子 200U/kg IV q12-24hr, 2-3 天或至止血為止。 I.、II. 無效時可使用下述 III.。</p> <p>III 高反應者出血時抗體 $>$ 5BU/mL：使用 rVIIa 70-90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IVq2h, 3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量。或 APCC 50-100U/kg IV q6-12hr, 4 劑量或至止血為止，需留心記憶性反應。 (98/8/1)</p> <p>(2) 對第九因子有過敏反</p> | <p>II 術後第三天至傷口癒合，rVIIa 70~90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV，q 3 ~ 6 hr。</p> <p>III 或術前，術中及術後至傷口癒合 APCC 50~100 U/kg IV，q6-12hr，需留心病人有無過高凝血現象發生。</p> <p>4. 發生第九因子抗體之 B 型血友病患者。</p> <p>(1) 對第九因子沒有過敏反應者：</p> <p>I 低反應者 (\leq 5BU/mL)：使用平常劑量兩倍的第九因子。</p> <p>II 高反應者，出血時抗體在 \leq 5BU/mL：使用第九因子 200U/kg IV q12-24hr, 2-3 天或至止血為止。 I.、II. 無效時可使用下述 III.。</p> <p>III 高反應者出血時抗體 $>$ 5BU/mL：使用 rVIIa 70-90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IVq2h, 3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量。或 APCC 50-100U/kg IV q6-12hr, 4 劑量或至止血為止，需留心記憶性反應。 (98/8/1)</p> <p>(2) 對第九因子有過敏反</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>應者：</p> <p>I 不能使用第九因子或 APCC。</p> <p>II 只能使用 rVIIa 70-90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV q2h，3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量。 (98/8/1)</p> <p>5. 凡使用 rVIIa、APCC 之申請給付案件，均需由醫療機構詳細填具事後申報表（附表五），俾利本保險以電腦勾稽方式事後逐案審查。</p> <p>6. A 型或 B 型且有高反應抗體存在之血友病人：(103/4/1)</p> <p>(1) 在六個月內同一關節發生四次以上出血且關節傷害輕微而認定為標的關節時，可給予 1-3 個月繞徑治療藥物。</p> <p>(2) 接受重大手術後，可視術後傷口出血及復原狀況給予 1-2 週繞徑治療藥物，接受骨關節手術後，每次復健之前得視狀況使用。</p> <p>(3) 發生顱內出血或後腹腔出血接受治療穩定後，可視臨床狀況給 1-3 個月的繞徑治療藥物治療。</p> <p>(4) 血友病合併抗體患者，如不符合上述 (1) 至 (3) 項短期預防</p> | <p>應者：</p> <p>I 不能使用第九因子或 APCC。</p> <p>II 只能使用 rVIIa 70-90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV q2h，3 劑量或至止血為止或 rVIIa 270 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV 單次注射劑量。 (98/8/1)</p> <p>5. 凡使用 rVIIa、APCC 之申請給付案件，均需由醫療機構詳細填具事後申報表（附表五），俾利本保險以電腦勾稽方式事後逐案審查。</p> <p>6. A 型或 B 型且有高反應抗體存在之血友病人：(103/4/1)</p> <p>(1) 在六個月內同一關節發生四次以上出血且關節傷害輕微而認定為標的關節時，可給予 1-3 個月繞徑治療藥物。</p> <p>(2) 接受重大手術後，可視術後傷口出血及復原狀況給予 1-2 週繞徑治療藥物，接受骨關節手術後，每次復健之前得視狀況使用。</p> <p>(3) 發生顱內出血或後腹腔出血接受治療穩定後，可視臨床狀況給 1-3 個月的繞徑治療藥物治療。</p> <p>(4) 血友病合併抗體患者，如不符合上述 (1) 至 (3) 項短期預防</p> | |
|--|--|--|

之規定，不可使用繞
徑治療藥物進行預防
性治療。

7. 後天型血友病患者急性
出血治療（申報費用時
須附詳實評估記錄）：
(105/2/1、105/8/1)

(1) 嚴重出血時：

I. 可使用 rVIIa 70~90

$\mu\text{g}/\text{kg}$ IV, q2-3

hr, 或 APCC 50~100

U/kg IV, q6-12

hr(最多一天

200U/kg), 至止血為

止。無效時可改用高

劑量第八因子 100

U/kg q8-12 hr 或

desmopressin(0.3 μ

g/kg)治療。

(105/8/1)

II. 當出血症狀使用繞徑

藥物療效不佳時, 可

改用另一種繞徑藥物

治療, 如果仍無法止

血時, 可併用體外吸

收抗體的方式(如

protein A) 或

Plasmapheresis, 去

除大部分抗體後, 再

使用第八因子。

(105/8/1)

(2) 需侵襲性處理或緊急
手術時：

I. 於術前、術中至傷口

癒合期間, 依患者實

際出血及傷口癒合情

況, 使用 rVIIa

70~90 $\mu\text{g}/\text{kg}$ IV,

q2-8 hr。

II. 於術前、術中至傷口

之規定，不可使用繞
徑治療藥物進行預防
性治療。

癒合期間，依患者實際出血及傷口癒合情況，使用 APCC 50~100 U/kg IV，q6-12 hr。

備註：APCC，如 Feiba，應依藥品仿單記載，每次使用劑量勿超過 100U/kg，每日劑量勿超過 200U/kg。(94/2/1)

4.2.3. 第八、第九凝血因子血液製劑 (103/4/1)：用於 A 型或 B 型無抗體存在之血友病人：

1. 門診之血友病人得攜回二~三劑量(至多攜回一個月)第八、第九凝血因子備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之一—全民健康保險血友病患者使用第八、第九凝血因子在家治療紀錄)。醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(103/4/1)

2. 需要時治療(on demand therapy)：適用一般型血友病病人，建議劑量如附表十八之三—全民健康保險一般型血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量。

3. 預防性治療(primary prophylaxis)：限嚴重型(VIII:C 小於 1%)血友病病人。

備註：APCC，如 Feiba，應依藥品仿單記載，每次使用劑量勿超過 100U/kg，每日劑量勿超過 200U/kg。(94/2/1)

4.2.3. 第八、第九凝血因子血液製劑 (103/4/1)：用於 A 型或 B 型無抗體存在之血友病人：

1. 門診之血友病人得攜回二~三劑量(至多攜回一個月)第八、第九凝血因子備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八之一—全民健康保險血友病患者使用第八、第九凝血因子在家治療紀錄)。醫療機構、醫師開立使用血液製劑時，應依血液製劑條例之規定辦理。(103/4/1)

2. 需要時治療(on demand therapy)：適用一般型血友病病人，建議劑量如附表十八之三—全民健康保險一般型血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量。

3. 預防性治療(primary prophylaxis)：限嚴重型(VIII:C 小於 1%)血友病病人。

| | | |
|---|---|--|
| <p>(1)嚴重 A 型血友病病人：每週注射 1-3 次，每一次劑量為 15-25 IU/kg。</p> <p>(2)嚴重 B 型血友病病人：每週注射 1-2 次，每一次劑量為 30-50 IU/kg。</p> <p>(3)接受預防性治療期間，其預防效果可以臨床觀察為之，如病人仍然出現突破性出血時，得檢測給藥前最低濃度(trough level)，其濃度低於 1IU/dL，得再調整劑量。</p> <p>(4)如病患治療時產生凝血因子低反應性抗體，則暫時終止預防性治療，直到確定抗體消失始得重新治療；病人如產生凝血因子高反應性抗體時，則需停止預防性治療，在接受免疫耐受性療法確定成功且抗體消失後，則可重新使用「預防性」治療。</p> <p>4.2.4. 類血友病治療藥品，VWF/FVIII 濃縮製劑(如 Haemate P, Alphanate 等)、Desmopressin(DDAVP) 等：(103/4/1)</p> <p>1. 各分型類血友病治療規定：</p> <p>(1)第一型類血友病 (Type 1 von-</p> | <p>(1)嚴重 A 型血友病病人：每週注射 1-3 次，每一次劑量為 15-25 IU/kg。</p> <p>(2)嚴重 B 型血友病病人：每週注射 1-2 次，每一次劑量為 30-50 IU/kg。</p> <p>(3)接受預防性治療期間，其預防效果可以臨床觀察為之，如病人仍然出現突破性出血時，得檢測給藥前最低濃度(trough level)，其濃度低於 1IU/dL，得再調整劑量。</p> <p>(4)如病患治療時產生凝血因子低反應性抗體，則暫時終止預防性治療，直到確定抗體消失始得重新治療；病人如產生凝血因子高反應性抗體時，則需停止預防性治療，在接受免疫耐受性療法確定成功且抗體消失後，則可重新使用「預防性」治療。</p> <p>4.2.4. 類血友病治療藥品，VWF/FVIII 濃縮製劑(如 Haemate P, Alphanate 等)、Desmopressin(DDAVP) 等：(103/4/1)</p> <p>1. 各分型類血友病治療規定：</p> <p>(1)第一型類血友病 (Type 1 von-</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Willebrand Disease) :</p> <p>I. 以 DDAVP 治療為原則，如患者 VWF:RC₀ <10 IU/dL，則不建議使用 DDAVP。</p> <p>II. 輕度出血或小手術處置：使用 DDAVP，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天，若 DDAVP 治療無效或有禁忌症時可使用 VWF/FVIII 濃縮製劑。</p> <p>III. 嚴重出血治療或重大手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 起初濃度都上升到至少 100 IU/dL 以上，接下來劑量於 7-10 日內維持 VWF:RC₀ 及 VIII:C 最低濃度(trough level)都在 50IU/dL 以上。</p> <p>IV. 如重複給予 DDAVP 使得藥物效果降低，或已知對 DDAVP 治療無效，應使用 VWF/FVIII 濃縮製劑。</p> <p>(2) 第二型類血友病 (Type 2 von-Willebrand</p> | <p>Willebrand Disease) :</p> <p>I. 以 DDAVP 治療為原則，如患者 VWF:RC₀ <10 IU/dL，則不建議使用 DDAVP。</p> <p>II. 輕度出血或小手術處置：使用 DDAVP，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天，若 DDAVP 治療無效或有禁忌症時可使用 VWF/FVIII 濃縮製劑。</p> <p>III. 嚴重出血治療或重大手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 起初濃度都上升到至少 100 IU/dL 以上，接下來劑量於 7-10 日內維持 VWF:RC₀ 及 VIII:C 最低濃度(trough level)都在 50IU/dL 以上。</p> <p>IV. 如重複給予 DDAVP 使得藥物效果降低，或已知對 DDAVP 治療無效，應使用 VWF/FVIII 濃縮製劑。</p> <p>(2) 第二型類血友病 (Type 2 von-Willebrand</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Disease) :</p> <p>I. Type 2A 及 2M VWD</p> <p>i. 輕度出血治療或小手術處置：如病人對於 DDAVP 治療有效，應以 DDAVP 治療為原則。如使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>ii. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規定處置。</p> <p>II. Type 2B VWD</p> <p>i. DDAVP 不適合使用於 Type 2B VWD。</p> <p>ii. 輕度出血或小手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>iii. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規</p> | <p>Disease) :</p> <p>I. Type 2A 及 2M VWD</p> <p>i. 輕度出血治療或小手術處置：如病人對於 DDAVP 治療有效，應以 DDAVP 治療為原則。如使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>ii. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規定處置。</p> <p>II. Type 2B VWD</p> <p>i. DDAVP 不適合使用於 Type 2B VWD。</p> <p>ii. 輕度出血或小手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RC₀ 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>iii. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規</p> | |
|--|--|--|

定處置，並且應注意血小板濃度，必要時應給予血小板輸注。

III. Type 2N VWD

- i. 使用 DDAVP 治療可能提升 VIII:C，但 VIII:C 半衰期會減短。
- ii. 輕度出血或小手術處置：使用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VIII:C 上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。
- iii. 嚴重出血治療或重大手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VIII:C 起初濃度上升到至少 100 IU/dL 以上，接下來劑量於 7-10 日內維持 VIII:C 最低濃度在 50 IU/dL 以上。

(3) 第三型類血友病 (Type 3 von-Willebrand Disease)：

I. 原則應使用 VWF/FVIII 濃縮

定處置，並且應注意血小板濃度，必要時應給予血小板輸注。

III. Type 2N VWD

- i. 使用 DDAVP 治療可能提升 VIII:C，但 VIII:C 半衰期會減短。
- ii. 輕度出血或小手術處置：使用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VIII:C 上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。
- iii. 嚴重出血治療或重大手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VIII:C 起初濃度上升到至少 100 IU/dL 以上，接下來劑量於 7-10 日內維持 VIII:C 最低濃度在 50 IU/dL 以上。

(3) 第三型類血友病 (Type 3 von-Willebrand Disease)：

I. 原則應使用 VWF/FVIII 濃縮

| | | |
|---|---|--|
| <p>製劑，DDAVP 則不應使用。</p> <p>II. 輕度出血或小手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RCo 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>III. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規定處置，惟 Alphanate 不適用於 Type 3 VWD 病人進行重度手術。</p> <p>2. VWD 患者輔助治療及懷孕患者處置：</p> <p>(1) 血小板輸注可以考慮使用於已使用足量 VWF/FVIII 濃縮製劑達成治療目標濃度但仍有出血之患者，尤其是腸胃道出血時。</p> <p>(2) 冷凍沉澱品 (Cryoprecipitate) 可以考慮使用於已充分使用其他各種藥物治療但仍無法控制的頑固性出血。</p> <p>(3) 抗纖維蛋白溶解製劑 (如 tranexamic acid) 可以單獨使用於黏膜輕微出血 (如月經量過多、口腔出血、流鼻血)，如果治療無效，應合併使</p> | <p>製劑，DDAVP 則不應使用。</p> <p>II. 輕度出血或小手術處置：使用 VWF/FVIII 濃縮製劑，治療目標為 VWF:RCo 及 VIII:C 都上升到 30-50 IU/dL 以上，維持 1-5 天。</p> <p>III. 嚴重出血治療或重大手術處置：依 Type 1 VWD 之 III 規定處置，惟 Alphanate 不適用於 Type 3 VWD 病人進行重度手術。</p> <p>2. VWD 患者輔助治療及懷孕患者處置：</p> <p>(1) 血小板輸注可以考慮使用於已使用足量 VWF/FVIII 濃縮製劑達成治療目標濃度但仍有出血之患者，尤其是腸胃道出血時。</p> <p>(2) 冷凍沉澱品 (Cryoprecipitate) 可以考慮使用於已充分使用其他各種藥物治療但仍無法控制的頑固性出血。</p> <p>(3) 抗纖維蛋白溶解製劑 (如 tranexamic acid) 可以單獨使用於黏膜輕微出血 (如月經量過多、口腔出血、流鼻血)，如果治療無效，應合併使</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑治療。</p> <p>(4) 拔牙時大多數病患可使用單次 DDAVP 加上 tranexamic acid 治療，不適合使用 DDAVP 患者則用單次 VWF/FVIII 濃縮製劑加上 tranexamic acid 治療。</p> <p>(5) 月經量過多患者可單獨使用雌性激素/黃體素製劑或 tranexamic acid 治療，如果無效時則需合併使用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑治療。</p> <p>(6) VWD 患者懷孕生產治療建議：</p> <p>I. DDAVP 避免使用於子癲前症或體液增加(fluid retention)患者。</p> <p>II. Type 1 VWD：分娩時大多數不需要預防性治療。</p> <p>III. Type 2 VWD：剖腹生產或自然生產預期要進行 episiotomy 時，要給予藥物預防性治療。</p> <p>IV. Type 3 VWD：各種生產方式都需要給予藥物預防性治療。</p> <p>V. 對於 Type 1 及</p> | <p>用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑治療。</p> <p>(4) 拔牙時大多數病患可使用單次 DDAVP 加上 tranexamic acid 治療，不適合使用 DDAVP 患者則用單次 VWF/FVIII 濃縮製劑加上 tranexamic acid 治療。</p> <p>(5) 月經量過多患者可單獨使用雌性激素/黃體素製劑或 tranexamic acid 治療，如果無效時則需合併使用 DDAVP 或 VWF/FVIII 濃縮製劑治療。</p> <p>(6) VWD 患者懷孕生產治療建議：</p> <p>I. DDAVP 避免使用於子癲前症或體液增加(fluid retention)患者。</p> <p>II. Type 1 VWD：分娩時大多數不需要預防性治療。</p> <p>III. Type 2 VWD：剖腹生產或自然生產預期要進行 episiotomy 時，要給予藥物預防性治療。</p> <p>IV. Type 3 VWD：各種生產方式都需要給予藥物預防性治療。</p> <p>V. 對於 Type 1 及</p> | |
|--|--|--|

Type 2 VWD 的懷孕婦女，應該要在懷孕第三期與生產前檢查 VWF:RCo 與 VIII:C。如果 VWF:RCo <50IU/dL，產程期間則應該給予藥物預防治療。Type 2B 懷孕婦女應特別注意血小板有無減少。

VI. 生產後至少應該維持 VWF:RCo > 50IU/dL 3-5 天。

4.2.5. 第二、七、九、十凝血因子複合製劑(如 Beriplex)：
(105/7/1)

限用於下列情況以矯正凝血因子缺乏，且須同時針對出血原因進行處置：

1. 在缺乏單一的凝血因子製劑可使用的情况，因先天性單一或多重缺乏第二、第七、第九或第十凝血因子，有出血或接受侵犯性處理及手術時的預防出血性治療。
2. 在缺乏單一的凝血因子製劑可使用的情况，因單一或多重缺乏第二、第七、第九或第十凝血因子造成的新生兒嚴重出血。
3. 因嚴重的肝臟實質傷害(如猛爆性肝炎、肝硬化末期、肝中毒、肝創傷等)或極度肝萎縮引

Type 2 VWD 的懷孕婦女，應該要在懷孕第三期與生產前檢查 VWF:RCo 與 VIII:C。如果 VWF:RCo <50IU/dL，產程期間則應該給予藥物預防治療。Type 2B 懷孕婦女應特別注意血小板有無減少。

VI. 生產後至少應該維持 VWF:RCo > 50IU/dL 3-5 天。

起的食道胃靜脈瘤出血。

4. 因服用 coumarin 類抗凝血劑造成併發症引起的嚴重出血。

5. 缺乏維生素 K 併發的嚴重出血或需緊急手術時。

4. 3. 其他

4. 3. 1. Deferasirox (如 Exjade) : (96/7/1、104/12/1) :

限用於治療因輸血而導致慢性鐵質沉著症(輸血性血鐵質沉積)的成年人及 2 歲以上兒童患者且符合下列條件之一者：

1. 重型海洋性貧血或骨髓造血功能不良症候群、再生不良性貧血患者。
2. 需長期輸血治療且已併有鐵質沉積之患者，則在患者血清內鐵蛋白 (Ferritin) > 2000ug/L 時使用。
3. 中型(非輸血依賴)海洋性貧血患者：
(104/12/1)

(1)使用條件：病患已開始長期接受輸血治療(即一年輸血兩次以上或四個單位以上者)，且血清內鐵蛋白 (Ferritin) > 800 μ g/L(至少二次檢查確認，檢查之間隔需經過至少 3 個月，並排除感染及發炎等狀況)或肝臟鐵

4. 3. 其他

4. 3. 1. Deferasirox (如 Exjade) : (96/7/1、104/12/1) :

限用於治療因輸血而導致慢性鐵質沉著症(輸血性血鐵質沉積)的成年人及 2 歲以上兒童患者且符合下列條件之一者：

1. 重型海洋性貧血或骨髓造血功能不良症候群、再生不良性貧血患者。
2. 需長期輸血治療且已併有鐵質沉積之患者，則在患者血清內鐵蛋白 (Ferritin) > 2000ug/L 時使用。
3. 中型(非輸血依賴)海洋性貧血患者：
(104/12/1)

(1)使用條件：病患已開始長期接受輸血治療(即一年輸血兩次以上或四個單位以上者)，且血清內鐵蛋白 (Ferritin) > 800 μ g/L(至少二次檢查確認，檢查之間隔需經過至少 3 個月，並排除感染及發炎等狀況)或肝臟鐵

| | | |
|--|--|--|
| <p>質 (Liver iron content) > 7mg/g dry weight 者。</p> <p>(2)當肝臟鐵質 < 3mg/g dry weight，或血清內鐵蛋白 (Ferritin) < 300 μg/L 時即停藥。</p> <p>4.3.2 Eltrombopag (如 Revolade)、romiplostim (如 Nplate) (100/8/1、101/9/1、102/8/1、102/9/1、105/8/1)</p> <p>1. 限用於成年慢性自發性 (免疫性)血小板缺乏紫斑症 (ITP) 且對於其他治療 (例如：類固醇、免疫球蛋白等) 失敗患者，需接受計畫性手術或侵入性檢查且具出血危險者，血小板 < <u>80,000/uL</u>，且符合下列條件之一者使用：<u>(105/8/1)</u></p> <p>(1)脾臟切除患者。</p> <p>(2)對於下列不適合進行脾臟切除條件之患者，並經事前審查同意使用。</p> <p>A. 經麻醉科醫師評估無法耐受全身性麻醉。</p> <p>B. 難以控制之凝血機能障礙。</p> <p>C. 心、肺等主要臟器功能不全。</p> <p>D. 有其他重大共病，經臨床醫師判斷不適合進行脾臟切</p> | <p>質 (Liver iron content) > 7mg/g dry weight 者。</p> <p>(2)當肝臟鐵質 < 3mg/g dry weight，或血清內鐵蛋白 (Ferritin) < 300 μg/L 時即停藥。</p> <p>4.3.2 Eltrombopag (如 Revolade)、romiplostim (如 Nplate) (100/8/1、101/9/1、102/8/1、102/9/1)</p> <p>1. 限用於成年慢性自發性 (免疫性)血小板缺乏紫斑症 (ITP) 且對於其他治療 (例如：類固醇、免疫球蛋白等) 失敗患者，需接受計畫性手術或侵入性檢查且具出血危險者，血小板 < 20,000/uL，且符合下列條件之一者使用：</p> <p>(1)脾臟切除患者。</p> <p>(2)對於下列不適合進行脾臟切除條件之患者，並經事前審查同意使用。</p> <p>A. 經麻醉科醫師評估無法耐受全身性麻醉。</p> <p>B. 難以控制之凝血機能障礙。</p> <p>C. 心、肺等主要臟器功能不全。</p> <p>D. 有其他重大共病，經臨床醫師判斷不適合進行脾臟切除。</p> <p>2. 限用 8 週，治療期間，</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>除。</p> <p>2. 限用 8 週，治療期間，不得同時併用免疫球蛋白或 eltrombopag 或 romiplostim。</p> <p>第 5 節 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism</p> <p>5.1. 糖尿病用藥 Drugs used in diabetes</p> <p>1. 藥品種類(105/5/1)</p> <p>(1) 胰島素：各廠牌短、中、長效、速效或預混型胰島素。</p> <p>(2) Biguanides：如 metformin。</p> <p>(3) Sulfonylureas(SU)：如 chlorpropamide、glipizide、glimepiride 等。</p> <p>(4) Meglitinide：如 repaglinide、nateglinide 等。</p> <p>(5) α-glucosidase inhibitor：如 acarbose、miglitol 等。</p> <p>(6) Thiazolidinediones (TZD)：如 rosiglitazone、pioglitazone 等。</p> <p>(7) DPP-4 抑制劑：如 sitagliptin、vildagliptin、saxagliptin、linagliptin 等。</p> <p>(8) GLP-1 受體促效劑：如 exenatide、</p> | <p>不得同時併用免疫球蛋白或 eltrombopag 或 romiplostim。</p> <p>第 5 節 激素及影響內分泌機轉藥物 Hormones & drugs affecting hormonal mechanism</p> <p>5.1. 糖尿病用藥 Drugs used in diabetes</p> | |
|---|---|--|

liraglutide 等。

(9)SGLT-2 抑制劑：如 empagliflozin、dapagliflozin 等。

(10)各降血糖成分之口服複方製劑。

2. 使用條件：(105/5/1)

(1)原則上第二型糖尿病治療應優先使用 metformin，或考慮早期開始使用胰島素。除有過敏、禁忌症、不能耐受或仍無法理想控制血糖的情形下，可使用其他類口服降血糖藥物。

(2)TZD 製劑、DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑、以及含該 3 類成分之複方製劑，限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病病人，且 SGLT-2 抑制劑與 DPP-4 抑制劑及其複方製劑宜二種擇一種使用。

(3)第二型糖尿病病人倘於使用三種口服降血糖藥物治療仍無法理想控制血糖者，宜考慮給予胰島素治療。

(4)特約醫療院所應加強衛教第二型糖尿病病人，鼓勵健康生活型態的飲食和運動，如控制肥胖、限制熱量攝取等措施。

(5)第二型糖尿病病人使

用之口服降血糖藥物成分，以最多四種（含四種）為限。

備註：本規定生效前已使用超過四種口服降血糖藥物成分之病人，得繼續使用原藥物至醫師更新其處方內容。

5.1.1. Acarbose (如 Glucobay); miglitol (如 Diaban) (86/1/1、87/4/1、89/6/1、91/7/1、98/12/1)

限用於非胰島素依賴型糖尿病之治療。

5.1.2. Guar gum (如 Guarina; Guarem) 限糖尿病治療使用。

5.1.3. GLP-1 受體促效劑 (105/8/1)

5.1.3.1 Exenatide(如 Byetta)、dulaglutide(如 Trulicity) (100/5/1、105/5/1)

1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者。

2. 本藥品不得與 insulin、DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑等藥物併用。

5.1.3.2 Liraglutide(如 Victoza) (101/10/1、105/8/1)

1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物

5.1.1. Acarbose (如 Glucobay); miglitol (如 Diaban) (86/1/1、87/4/1、89/6/1、91/7/1、98/12/1)

限用於非胰島素依賴型糖尿病之治療。

5.1.2. Guar gum (如 Guarina; Guarem) 限糖尿病治療使用。

5.1.3. Exenatide (如 Byetta); liraglutide (如 Victoza) (100/5/1、101/10/1)

1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者。

2. 本藥品不得與 insulin、DPP-4 抑制劑 (如 sitagliptin 成分) 等藥物併用。

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者。</u></p> <p><u>2. 當患者已接受口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。</u></p> <p><u>3. 本藥品不得與 DPP-4 抑制劑、SGLT-2 抑制劑併用。</u></p> <p>5.1.4. vildagliptin(100/8/1) 若與 sulphonylurea 合併使用時，vildagliptin 每日建議劑量為 50mg。</p> <p><u>5.1.5. SGLT-2 抑制劑：</u> <u>Dapagliflozin (如 Forxiga)、empagliflozin (如 Jardiance) (105/5/1)</u> <u>每日限處方 1 粒。</u></p> <p>5.2. 雄性激素類製劑與同化作用類固醇及其拮抗劑 Androgens and anabolic steroids and antagonists</p> <p>5.2.1. Danazol 限下列病例使用 (86/1/1) 1. 子宮內膜異位。 2. 纖維性囊腫乳房性疾患。</p> <p>5.2.2. 含 testosterone 5-alpha reductase inhibitor 製劑 (101/3/1)</p> <p>5.2.2.1 Finasteride (如 Proscar) ; dutasteride</p> | <p>5.1.4. vildagliptin(100/8/1) 若與 sulphonylurea 合併使用時，vildagliptin 每日建議劑量為 50mg。</p> <p>5.2. 雄性激素類製劑與同化作用類固醇及其拮抗劑 Androgens and anabolic steroids and antagonists</p> <p>5.2.1. Danazol 限下列病例使用 (86/1/1) 1. 子宮內膜異位。 2. 纖維性囊腫乳房性疾患。</p> <p>5.2.2. 含 testosterone 5-alpha reductase inhibitor 製劑 (101/3/1)</p> <p>5.2.2.1 Finasteride (如 Proscar) ; dutasteride</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(如 Avodart) (86/1/1、87/4/1、93/10/1、101/3/1、102/12/1)：</p> <p>1. 限良性前列腺肥大且有阻塞症狀，經直腸超音波前列腺掃描 (TRUS of prostate) 或經腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)前列腺大於 30mL 或最大尿流速 (Qmax) 小於 15 mL/sec 之病人，前列腺特異抗原 (PSA) 高於正常參考值之病人，需經病理診斷無前列腺癌，無法接受切片檢查者，應於病歷詳載原因方可使用。 (102/12/1)</p> <p>2. 服藥後第一年，每半年需作直腸超音波前列腺掃描或腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)或尿流速儀(uroflow-metry) 檢查，需證明前列腺有縮小或尿流速有增加，方得繼續使用。 (102/12/1)</p> <p>5.2.2.2. Dutasteride + tamsulosin (如 Duodart) (101/3/1、102/12/1)：</p> <p>1. 限良性前列腺肥大且有阻塞症狀，經直腸超音波前列腺掃描 (TRUS of prostate) 或經腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)前列腺大於 30mL 或</p> | <p>(如 Avodart) (86/1/1、87/4/1、93/10/1、101/3/1、102/12/1)：</p> <p>1. 限良性前列腺肥大且有阻塞症狀，經直腸超音波前列腺掃描 (TRUS of prostate) 或經腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)前列腺大於 30mL 或最大尿流速 (Qmax) 小於 15 mL/sec 之病人，前列腺特異抗原 (PSA) 高於正常參考值之病人，需經病理診斷無前列腺癌，無法接受切片檢查者，應於病歷詳載原因方可使用。 (102/12/1)</p> <p>2. 服藥後第一年，每半年需作直腸超音波前列腺掃描或腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)或尿流速儀(uroflow-metry) 檢查，需證明前列腺有縮小或尿流速有增加，方得繼續使用。 (102/12/1)</p> <p>5.2.2.2. Dutasteride + tamsulosin (如 Duodart) (101/3/1、102/12/1)：</p> <p>1. 限良性前列腺肥大且有阻塞症狀，經直腸超音波前列腺掃描 (TRUS of prostate) 或經腹部超音波測量(僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者)前列腺大於 30mL 或</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>最大尿流速 (Qmax) 小於 15 mL/sec 之病人，前列腺特異抗原 (PSA) 高於正常參考值之病人，需經病理診斷無前列腺癌，無法接受切片檢查者，應於病歷詳載原因，且已使用其他攝護肥大症之藥品但症狀沒有改善或無法耐受之病人方可使用。</p> <p>(102/12/1)</p> <p>2. 服藥後第一年，每半年需作直腸超音波前列腺掃描或腹部超音波測量 (僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者) 或尿流速 (uroflow-metry) 檢查，需證明前列腺有縮小或尿流速有增加，方得繼續使用。</p> <p>(102/12/1)</p> <p>5.3. 動情激素、黃體激素及治療不孕症藥物 Estrogens, progestins & drugs used for infertility</p> <p>5.3.1. Estradiol 之經皮吸收製劑：</p> <p>5.3.1.1. Estraderm TTS； Oestro V.T (93/5/1) 限不能口服本品患者使用，申報費用時應具體說明不能口服之理由。</p> <p>5.3.1.2. Estradiol 3.8mg/12.5cm²/patch (如 Climara 50 Transdermal Patch) 之給付規定：(90/4/1) 限每週一片。</p> | <p>最大尿流速 (Qmax) 小於 15 mL/sec 之病人，前列腺特異抗原 (PSA) 高於正常參考值之病人，需經病理診斷無前列腺癌，無法接受切片檢查者，應於病歷詳載原因，且已使用其他攝護肥大症之藥品但症狀沒有改善或無法耐受之病人方可使用。</p> <p>(102/12/1)</p> <p>2. 服藥後第一年，每半年需作直腸超音波前列腺掃描或腹部超音波測量 (僅限無法實施直腸超音波前列腺掃描者) 或尿流速 (uroflow-metry) 檢查，需證明前列腺有縮小或尿流速有增加，方得繼續使用。</p> <p>(102/12/1)</p> <p>5.3. 動情激素、黃體激素及治療不孕症藥物 Estrogens, progestins & drugs used for infertility</p> <p>5.3.1. Estradiol 之經皮吸收製劑：</p> <p>5.3.1.1. Estraderm TTS； Oestro V.T (93/5/1) 限不能口服本品患者使用，申報費用時應具體說明不能口服之理由。</p> <p>5.3.1.2. Estradiol 3.8mg/12.5cm²/patch (如 Climara 50 Transdermal Patch) 之給付規定：(90/4/1) 限每週一片。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>5.3.2. FSH (pure FSH)用於誘發排卵時，限 hypothalamus failure (下視丘功能衰竭)患者，事前專案報准後使用 (85/1/1)。</p> <p>5.3.3. HMG 用於誘發排卵時，限 hypothalamus failure (下視丘功能衰竭)患者，事前專案報准後使用(85/1/1)。</p> <p>5.3.4. Utrogestan Cap：限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 黃體期缺陷之補充。 2. 孕婦需使用 progesterone 之病例。 <p>5.3.5. Levonorgestrel intrauterine system (如 Mirena)：(104/2/1)</p> <p>限使用於長期月經經血過多導致嚴重貧血 (Hemoglobin\leq10g/dL) 之婦女，且每次使用後之五年內，不得再次使用。</p> <p>5.4. 作用於腦下腺前葉與下視丘的藥物 Drugs related to anterior pituitary & hypothalamic function</p> <p>5.4.1.1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限生長激素缺乏症、透納氏症候群及 SHOX 缺乏症(限使用 Humatrope) 患者使用。(104/6/1) 2. 限由醫學中心或區域醫院具小兒內分泌或小兒遺傳、新陳代謝專科醫師診斷。(104/6/1) | <p>5.3.2. FSH (pure FSH)用於誘發排卵時，限 hypothalamus failure (下視丘功能衰竭)患者，事前專案報准後使用 (85/1/1)。</p> <p>5.3.3. HMG 用於誘發排卵時，限 hypothalamus failure (下視丘功能衰竭)患者，事前專案報准後使用(85/1/1)。</p> <p>5.3.4. Utrogestan Cap：限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 黃體期缺陷之補充。 2. 孕婦需使用 progesterone 之病例。 <p>5.3.5. Levonorgestrel intrauterine system (如 Mirena)：(104/2/1)</p> <p>限使用於長期月經經血過多導致嚴重貧血 (Hemoglobin\leq10g/dL) 之婦女，且每次使用後之五年內，不得再次使用。</p> <p>5.4. 作用於腦下腺前葉與下視丘的藥物 Drugs related to anterior pituitary & hypothalamic function</p> <p>5.4.1.1. 生長激素 (Somatropin)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限生長激素缺乏症、透納氏症候群及 SHOX 缺乏症(限使用 Humatrope) 患者使用。(104/6/1) 2. 限由醫學中心或區域醫院具小兒內分泌或小兒遺傳、新陳代謝專科醫師診斷。(104/6/1) | |
|---|---|--|

3. 生長激素缺乏症使用生長激素治療，依下列規範使用：(100/12/1)

(1) 診斷：施行 insulin, clonidine, L-Dopa, glucagon, arginine 等檢查有兩項以上之檢查生長激素值均低於 7ng/mL (insulin test 須附檢查時之血糖值)。包括病理性 (pathological) 及特發性 (idiopathic) 及新生兒生長激素缺乏症。

(2) 開始治療條件：

I. 病理性生長激素缺乏症者須兼具下列二項條件：

i. 包括下視丘—腦垂體病變(如：腫瘤或腦垂體柄因被浸潤而膨大)及下視丘—腦垂體發育異常(如：無腦垂體柄、腦垂體後葉異位)者。

ii. 生長速率一年小於四公分。須具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次至少六個月以上之紀錄。))

II. 特發性生長激素缺乏症須兼具下列二項條件：

i. 身高低於第三百分位且生長速率一年小於四公分。須具

3. 生長激素缺乏症使用生長激素治療，依下列規範使用：(100/12/1)

(1) 診斷：施行 insulin, clonidine, L-Dopa, glucagon, arginine 等檢查有兩項以上之檢查生長激素值均低於 7ng/mL (insulin test 須附檢查時之血糖值)。包括病理性 (pathological) 及特發性 (idiopathic) 及新生兒生長激素缺乏症。

(2) 開始治療條件：

I. 病理性生長激素缺乏症者須兼具下列二項條件：

i. 包括下視丘—腦垂體病變(如：腫瘤或腦垂體柄因被浸潤而膨大)及下視丘—腦垂體發育異常(如：無腦垂體柄、腦垂體後葉異位)者。

ii. 生長速率一年小於四公分。須具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次至少六個月以上之紀錄。))

II. 特發性生長激素缺乏症須兼具下列二項條件：

i. 身高低於第三百分位且生長速率一年小於四公分。須具

| | | |
|--|--|--|
| <p>有資格申請生長激素治療的醫療機構 身高檢查，每隔三個月一次至少六個月以上之紀錄。</p> <p>ii. 骨齡比實際年齡遲緩至少二個標準差（應檢附骨齡 X 光檢查影像）。</p> <p>III. 新生兒生長激素缺乏症，一再發生低血糖，有影響腦部發育之顧慮者。</p> <p>(3) 治療劑量：起始劑量 0.18 mg/kg/week，爾後視需要可調整至 0.18~0.23mg/kg/week。</p> <p>(4) 治療監測：身高和體重至少每三個月測量一次，骨齡每六至十二個月測定一次。</p> <p>(5) 繼續治療條件(每年評估一次)：</p> <p>I. 治療後第一年，生長速率比治療前增加至少 3 公分/年。</p> <p>II. 骨齡：男生骨齡 16 歲，女生骨齡 14 歲為治療之最後期限。</p> <p>(6) 個案申請時需檢附相關資料包括實驗室檢查報告影本、療程中門診追蹤身高體重記錄影本、骨齡 X 光片影像及藥品劑量等資料之治療計畫)，經事前審查核准後使用。</p> <p>4. 透納氏症候群病人使用</p> | <p>有資格申請生長激素治療的醫療機構 身高檢查，每隔三個月一次至少六個月以上之紀錄。</p> <p>ii. 骨齡比實際年齡遲緩至少二個標準差（應檢附骨齡 X 光檢查影像）。</p> <p>III. 新生兒生長激素缺乏症，一再發生低血糖，有影響腦部發育之顧慮者。</p> <p>(3) 治療劑量：起始劑量 0.18 mg/kg/week，爾後視需要可調整至 0.18~0.23mg/kg/week。</p> <p>(4) 治療監測：身高和體重至少每三個月測量一次，骨齡每六至十二個月測定一次。</p> <p>(5) 繼續治療條件(每年評估一次)：</p> <p>I. 治療後第一年，生長速率比治療前增加至少 3 公分/年。</p> <p>II. 骨齡：男生骨齡 16 歲，女生骨齡 14 歲為治療之最後期限。</p> <p>(6) 個案申請時需檢附相關資料包括實驗室檢查報告影本、療程中門診追蹤身高體重記錄影本、骨齡 X 光片影像及藥品劑量等資料之治療計畫)，經事前審查核准後使用。</p> <p>4. 透納氏症候群病人使用</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>生長激素治療的原則：</p> <p>(1) 診斷：X 染色體部分或全部缺乏的女童。 (請檢附檢查報告) (96/11/1)</p> <p>(2) 病人無嚴重心臟血管、腎臟衰竭等危及生命或重度脊椎彎曲等影響治療效果的狀況。</p> <p>(3) 開始治療條件：</p> <p>I 年齡至少六歲。</p> <p>II 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。(96/11/1)</p> <p>III 骨齡\leq14 歲 (請檢附骨齡 X 光片)</p> <p>(4) 治療劑量：不超過 1 IU/kg/wk 或 0.35 mg/kg/wk。(96/11/1)</p> <p>(5) 繼續治療條件 (每年評估一次)：</p> <p>I 骨齡\leq14 歲。</p> <p>II 第一年生長速率比治療前增加至少 2 公分/年。</p> <p>III 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。</p> <p>5. 用於治療 SHOX 缺乏症患者使用生長激素治療的原則：(104/6/1)</p> <p>(1) 診斷：SHOX 基因突變或缺乏(請檢附</p> | <p>生長激素治療的原則：</p> <p>(1) 診斷：X 染色體部分或全部缺乏的女童。 (請檢附檢查報告) (96/11/1)</p> <p>(2) 病人無嚴重心臟血管、腎臟衰竭等危及生命或重度脊椎彎曲等影響治療效果的狀況。</p> <p>(3) 開始治療條件：</p> <p>I 年齡至少六歲。</p> <p>II 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。(96/11/1)</p> <p>III 骨齡\leq14 歲 (請檢附骨齡 X 光片)</p> <p>(4) 治療劑量：不超過 1 IU/kg/wk 或 0.35 mg/kg/wk。(96/11/1)</p> <p>(5) 繼續治療條件 (每年評估一次)：</p> <p>I 骨齡\leq14 歲。</p> <p>II 第一年生長速率比治療前增加至少 2 公分/年。</p> <p>III 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。</p> <p>5. 用於治療 SHOX 缺乏症患者使用生長激素治療的原則：(104/6/1)</p> <p>(1) 診斷：SHOX 基因突變或缺乏(請檢附</p> | |
|--|--|--|

檢查報告，若為點突變者，需加附文獻資料證實此突變確為致病突變)。

(2)開始治療條件：

- I. 年齡至少六歲。
- II. 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。

III. 骨齡：男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲(請檢附骨齡 X 光片)

(3)治療劑量：不超過 0.35 mg/kg/wk。

(4)繼續治療條件(每年評估一次)：

- I. 骨齡：男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲(請檢附骨齡 X 光片)
- II. 第一年生長速率比治療前增加至少 2 公分/年。
- III. 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。

(5)需事前審查核准後使用。

5.4.1.2. 生長激素

(Genotropin) 用於治療普瑞德威利氏症候群

(Prader-Willi Syndrome) 患者時：
(93/5/1)

檢查報告，若為點突變者，需加附文獻資料證實此突變確為致病突變)。

(2)開始治療條件：

- I. 年齡至少六歲。
- II. 身高低於第三百分位以下且生長速率一年小於四公分，需具有資格申請生長激素治療的醫療機構身高檢查，每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。

III. 骨齡：男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲(請檢附骨齡 X 光片)

(3)治療劑量：不超過 0.35 mg/kg/wk。

(4)繼續治療條件(每年評估一次)：

- I. 骨齡：男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲(請檢附骨齡 X 光片)
- II. 第一年生長速率比治療前增加至少 2 公分/年。
- III. 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。

(5)需事前審查核准後使用。

5.4.1.2. 生長激素

(Genotropin) 用於治療普瑞德威利氏症候群

(Prader-Willi Syndrome) 患者時：
(93/5/1)

1. 限用於經由醫學中心或區域醫院小兒或內分泌專科醫師具小兒遺傳或小兒內分泌專長醫師診斷確認，且患者之骨齡男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲之病患。
2. 治療期間發生下列情形應停止治療：發生糖尿病、或其他嚴重副作用時。
3. 建議治療劑量：給予每天 0.1 IU/kg（約等於 0.035mg/kg）之生長激素治療。
4. 治療時注意事項：
 - (1) 應於開始治療之前及每三至六個月定期監測血糖及血脂檢查 (Lipid profile) 等臨床生化指標、重高指數變化、活動力與肌肉張力、Sleeping Study。治療一年後測量身體組成 Body Composition (DXA)、骨齡 X 光片。
 - (2) 普瑞德威利氏症候群患者容易發生睡眠窒息，這種現象或許治療後可減輕。最近發現年幼之患者可能因為一般之上呼吸道感染而引發猝死，也曾經發生在生長激素治療中的病人身上。目前並不清楚生長激素治療是否會改變猝死的發生，故不論是否接受治療，都需要提

1. 限用於經由醫學中心或區域醫院小兒或內分泌專科醫師具小兒遺傳或小兒內分泌專長醫師診斷確認，且患者之骨齡男性 ≤ 16 歲、女性 ≤ 14 歲之病患。
2. 治療期間發生下列情形應停止治療：發生糖尿病、或其他嚴重副作用時。
3. 建議治療劑量：給予每天 0.1 IU/kg（約等於 0.035mg/kg）之生長激素治療。
4. 治療時注意事項：
 - (1) 應於開始治療之前及每三至六個月定期監測血糖及血脂檢查 (Lipid profile) 等臨床生化指標、重高指數變化、活動力與肌肉張力、Sleeping Study。治療一年後測量身體組成 Body Composition (DXA)、骨齡 X 光片。
 - (2) 普瑞德威利氏症候群患者容易發生睡眠窒息，這種現象或許治療後可減輕。最近發現年幼之患者可能因為一般之上呼吸道感染而引發猝死，也曾經發生在生長激素治療中的病人身上。目前並不清楚生長激素治療是否會改變猝死的發生，故不論是否接受治療，都需要提

| | | |
|--|--|--|
| <p>醒普瑞德威利氏症候群年幼患者之家長，在患者有呼吸道問題時需要特別的注意。</p> <p>5.4.2. Bromocriptine： 如用於產後正常性泌乳之抑制，不予給付。</p> <p>5.4.3. Octreotide inj (如 Sandostatin inj) 限： (87/11/1、102/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端肥大症患者。 2. 預防胰臟手術後的併發症，最長使用七天。 3. 使用於胃、食道靜脈曲張出血，最長以三天為原則。 4. 治療患有功能性症狀之胃、腸、胰內分泌腫瘤的患者。(102/1/1) <p>5.4.4. Octreotide 長效型注射劑 (如 Sandostatin LAR Microspheres for Injection)：(89/7/1、102/1/1、104/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端肥大症患者。 2. 治療患有功能性症狀之胃、腸、胰內分泌腫瘤的患者。(102/1/1) 3. 治療患有晚期間腸 (midgut) 或已排除原位非間腸處而原位不明之分化良好(well-differentiated)的神經內分泌瘤患者。 | <p>醒普瑞德威利氏症候群年幼患者之家長，在患者有呼吸道問題時需要特別的注意。</p> <p>5.4.2. Bromocriptine： 如用於產後正常性泌乳之抑制，不予給付。</p> <p>5.4.3. Octreotide inj (如 Sandostatin inj) 限： (87/11/1、102/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端肥大症患者。 2. 預防胰臟手術後的併發症，最長使用七天。 3. 使用於胃、食道靜脈曲張出血，最長以三天為原則。 4. 治療患有功能性症狀之胃、腸、胰內分泌腫瘤的患者。(102/1/1) <p>5.4.4. Octreotide 長效型注射劑 (如 Sandostatin LAR Microspheres for Injection)：(89/7/1、102/1/1、104/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端肥大症患者。 2. 治療患有功能性症狀之胃、腸、胰內分泌腫瘤的患者。(102/1/1) 3. 治療患有晚期間腸 (midgut) 或已排除原位非間腸處而原位不明之分化良好(well-differentiated)的神經內分泌瘤患者。 | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(104/4/1)</p> <p>4. 需經事前審查核准後使用，每次申請以一年為限，期滿須經再次申請核准後才得以續用。</p> <p>(104/4/1)</p> <p>5. 用於治療上述第 1、2 項患者時，每次注射以 20 mg 為原則，每次注射需間隔四週；用於治療上述第 3 項患者時，每次注射以 30 mg 為原則，每次注射需間隔四週。若因病情需要超過使用量，應於病歷詳細紀錄以備查核。(104/4/1)</p> <p>5.4.5. Somatostatin： (87/11/1、89/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預防胰臟手術後的併發症，最長使用五天。 2. 使用於胃、食道靜脈曲張出血最長以三天為原則。 3. 嚴重性急性消化性潰瘍出血，急性之糜爛或出血性胃炎之急性嚴重出血，經內視鏡處理同時經氫離子幫浦阻斷劑或乙型組織胺受體阻斷劑注射治療仍不能止血，且不適合外科手術者，得使用本品作為輔助治療三天。 <p>5.4.6. Lanreotide inj (如 Somatuline)： (88/6/1、89/5/1、93/12/1、98/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用於對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端 | <p>(104/4/1)</p> <p>4. 需經事前審查核准後使用，每次申請以一年為限，期滿須經再次申請核准後才得以續用。</p> <p>(104/4/1)</p> <p>5. 用於治療上述第 1、2 項患者時，每次注射以 20 mg 為原則，每次注射需間隔四週；用於治療上述第 3 項患者時，每次注射以 30 mg 為原則，每次注射需間隔四週。若因病情需要超過使用量，應於病歷詳細紀錄以備查核。(104/4/1)</p> <p>5.4.5. Somatostatin： (87/11/1、89/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預防胰臟手術後的併發症，最長使用五天。 2. 使用於胃、食道靜脈曲張出血最長以三天為原則。 3. 嚴重性急性消化性潰瘍出血，急性之糜爛或出血性胃炎之急性嚴重出血，經內視鏡處理同時經氫離子幫浦阻斷劑或乙型組織胺受體阻斷劑注射治療仍不能止血，且不適合外科手術者，得使用本品作為輔助治療三天。 <p>5.4.6. Lanreotide inj (如 Somatuline)： (88/6/1、89/5/1、93/12/1、98/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限使用於對手術、放射線療法或 dopamine 作用劑療法控制無效的肢端 | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>肥大症病患。</p> <p>2. 類癌瘤患者，限無法外科手術者。孕婦、小兒不得使用。(93/12/1)</p> <p>5.4.7. Cabergoline (如 Dostinex Tab.) : (91/6/1)</p> <p>1. 限用於高乳促素血症引起之狀況。</p> <p>2. 如用於產後正常性泌乳之抑制，不予給付。</p> <p>5.4.8. Pasireotide : (如 Signifor) (103/7/1)</p> <p>1. 限用於治療無法接受腦下垂體手術或已接受此手術未能治療的庫欣氏病 (Cushing's disease) 患者。</p> <p>2. 限內分泌及神經外科專科醫師使用。</p> <p>3. 須經事前審查核准後使用，每一年須重新申請。</p> <p>5.5. 其他 Miscellaneous</p> <p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin ; Goserelin ; Leuprorelin ; Triptorelin ; Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1)</p> <p>1. 本類藥品限用於前列腺癌、中樞性早熟、子宮內膜異位症及停經前(或更年期前)之嚴重乳癌病例。(85/1/1) (98/5/1)</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早</p> | <p>肥大症病患。</p> <p>2. 類癌瘤患者，限無法外科手術者。孕婦、小兒不得使用。(93/12/1)</p> <p>5.4.7. Cabergoline (如 Dostinex Tab.) : (91/6/1)</p> <p>1. 限用於高乳促素血症引起之狀況。</p> <p>2. 如用於產後正常性泌乳之抑制，不予給付。</p> <p>5.4.8. Pasireotide : (如 Signifor) (103/7/1)</p> <p>1. 限用於治療無法接受腦下垂體手術或已接受此手術未能治療的庫欣氏病 (Cushing's disease) 患者。</p> <p>2. 限內分泌及神經外科專科醫師使用。</p> <p>3. 須經事前審查核准後使用，每一年須重新申請。</p> <p>5.5. 其他 Miscellaneous</p> <p>5.5.1. Gn-RH analogue (如 Buserelin ; Goserelin ; Leuprorelin ; Triptorelin ; Nafarelin(acetate)等製劑) (92/1/1、93/4/1、95/4/1、98/5/1、99/2/1、99/10/1、100/2/1)</p> <p>1. 本類藥品限用於前列腺癌、中樞性早熟、子宮內膜異位症及停經前(或更年期前)之嚴重乳癌病例。(85/1/1) (98/5/1)</p> <p>2. 本類製劑用於中樞性早</p> | |
|---|---|--|

熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審核核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1)：

(1)中樞性早熟

I. 診斷：中樞性早熟

(central precocious puberty, CPP)

LHRH 測驗呈 LH 反應最高值 ≥ 10 mIU/mL 且合併第二性徵。

包括特發性

(Idiopathic CPP, ICPP) 和病理性 (Pathologic CPP, PCPP)

II. 治療條件：

i. 年齡：開始發育的年齡，女孩 ≤ 7 歲，男孩 ≤ 8 歲。

ii. 骨齡加速：較年齡至少超前二年。

iii. 預估成人身高需兼具下列 3 條件：(95/4/1)

a. 女 ≤ 153 公分，男 ≤ 165 公分

b. 比標的身高

(target

height, TH) 至少相同或較矮；TH=

【父親身高+母親身高+11(男)-11(女)】 $\div 2$ 。

c. 在追蹤六至十二個月期間，骨齡增加與年齡增加比率 ≥ 2.0 ，且預估身高 (PAH) 減少至

熟、乳癌及子宮內膜異位症病例需經事前審核核准後依下列規範使用(98/5/1、99/10/1)：

(1)中樞性早熟

I. 診斷：中樞性早熟

(central precocious puberty, CPP)

LHRH 測驗呈 LH 反應最高值 ≥ 10 mIU/mL 且合併第二性徵。

包括特發性

(Idiopathic CPP, ICPP) 和病理性 (Pathologic CPP, PCPP)

II. 治療條件：

i. 年齡：開始發育的年齡，女孩 ≤ 7 歲，男孩 ≤ 8 歲。

ii. 骨齡加速：較年齡至少超前二年。

iii. 預估成人身高需兼具下列 3 條件：(95/4/1)

a. 女 ≤ 153 公分，男 ≤ 165 公分

b. 比標的身高

(target

height, TH) 至少相同或較矮；TH=

【父親身高+母親身高+11(男)-11(女)】 $\div 2$ 。

c. 在追蹤六至十二個月期間，骨齡增加與年齡增加比率 ≥ 2.0 ，且預估身高 (PAH) 減少至

| | | |
|---|---|--|
| <p>少五公分。</p> <p>iv. PCPP 中合併中樞神經疾病者，不受 ii、iii 之限制。</p> <p>III. 治療劑量及使用法： GnRH analogue 最高 3.75 mg，每三至四週注射一次（途徑依藥廠規定）</p> <p>IV. 治療監測： 身高和體重至少每三個月測量一次，骨齡至少每六至十二個月測定一次。</p> <p>V. 繼續治療條件： i. 生長速率 ≥ 2 公分／年， ii. 骨齡：女小於十四歲，男小於十五歲。</p> <p>VI. 使用醫師：限小兒內分泌或新陳代謝專科醫師。</p> <p>VII. 限區域醫院以上層級之醫院使用。</p> <p>(2) 停經前（或更年期前）之嚴重乳癌，須完全符合以下二點： (86/9/1、99/2/1)</p> <p>I. 荷爾蒙接受體陽性。 II. 無法忍受其他荷爾蒙製劑（tamoxifen、megestrol 等），且為停經前婦女有轉移性乳癌者。</p> <p>(3) 停經前（或更年期前）之早期乳癌，且須完</p> | <p>少五公分。</p> <p>iv. PCPP 中合併中樞神經疾病者，不受 ii、iii 之限制。</p> <p>III. 治療劑量及使用法： GnRH analogue 最高 3.75 mg，每三至四週注射一次（途徑依藥廠規定）</p> <p>IV. 治療監測： 身高和體重至少每三個月測量一次，骨齡至少每六至十二個月測定一次。</p> <p>V. 繼續治療條件： i. 生長速率 ≥ 2 公分／年， ii. 骨齡：女小於十四歲，男小於十五歲。</p> <p>VI. 使用醫師：限小兒內分泌或新陳代謝專科醫師。</p> <p>VII. 限區域醫院以上層級之醫院使用。</p> <p>(2) 停經前（或更年期前）之嚴重乳癌，須完全符合以下二點： (86/9/1、99/2/1)</p> <p>I. 荷爾蒙接受體陽性。 II. 無法忍受其他荷爾蒙製劑（tamoxifen、megestrol 等），且為停經前婦女有轉移性乳癌者。</p> <p>(3) 停經前（或更年期前）之早期乳癌，且須完</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>全符合以下六點： (100/2/1)</p> <p>I. 與 tamoxifen 合併使用，作為手術後取代化學治療之輔助療法。</p> <p>II. 荷爾蒙接受體為強陽性：ER/PR 為 2+ 或 3+。</p> <p>III. Her-2 Fish 檢測為陰性或 IHC 為 1+。</p> <p>IV. 淋巴結轉移數目須 ≤ 3 個。</p> <p>V. 使用期限： goserelin 使用 3 年，tamoxifen 使用 5 年。</p> <p>VI. 須事前審查，並於申請時說明無法接受化學治療之原因。</p> <p>(4)本品使用於子宮內膜異位症之規定： (87/10/1、98/5/1)</p> <p>I. 經客觀診斷之第二期(含)以上子宮內膜異位症 (AFS 修訂之評分標準 (以下簡稱 rAFS)，需附手術紀錄及病理報告證明)；且符合下列各項條件之一者，需經事前審核核准後使用 GnRH analogue。</p> <p>i. 肝機能不全 (ALT 或 AST 大於正常值三倍)、腎功能不全 (creatinine > 2 mg %)、鬱血性心</p> | <p>全符合以下六點： (100/2/1)</p> <p>I. 與 tamoxifen 合併使用，作為手術後取代化學治療之輔助療法。</p> <p>II. 荷爾蒙接受體為強陽性：ER/PR 為 2+ 或 3+。</p> <p>III. Her-2 Fish 檢測為陰性或 IHC 為 1+。</p> <p>IV. 淋巴結轉移數目須 ≤ 3 個。</p> <p>V. 使用期限： goserelin 使用 3 年，tamoxifen 使用 5 年。</p> <p>VI. 須事前審查，並於申請時說明無法接受化學治療之原因。</p> <p>(4)本品使用於子宮內膜異位症之規定： (87/10/1、98/5/1)</p> <p>I. 經客觀診斷之第二期(含)以上子宮內膜異位症 (AFS 修訂之評分標準 (以下簡稱 rAFS)，需附手術紀錄及病理報告證明)；且符合下列各項條件之一者，需經事前審核核准後使用 GnRH analogue。</p> <p>i. 肝機能不全 (ALT 或 AST 大於正常值三倍)、腎功能不全 (creatinine > 2 mg %)、鬱血性心</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>臟病，不適用各種荷爾蒙藥物治療者。</p> <p>ii. 曾使用各種荷爾蒙藥物治療，引起藥物過敏或不可逆之藥物不良反應者。</p> <p>II. 前項藥物治療以連續六個月為上限。</p> <p>5.5.1.1. Degarelix (如 Firmagon) : (103/9/1) 限用於成年男性晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌患者。</p> <p>5.5.2. 抑鈣激素製劑 (Salmon calcitonin injection) 用於惡性疾病之高血鈣症或變形性骨炎 (Paget's disease) (85/10/1、93/8/1、100/1/1、103/2/1)。</p> <p>5.5.3. Bisphosphonate</p> <p>5.5.3.1. Clodronate ; pamidronate : (85/1/1、87/4/1、93/2/1、96/1/1、100/1/1) 限符合下列條件之一患者使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg %) 或游離鈣大於 5.6 mg /dL 者。 2. 惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移之病患，在使用嗎啡、可待因等止痛劑後仍不易控制者。 3. Multiple Myeloma, Breast Cancer, | <p>臟病，不適用各種荷爾蒙藥物治療者。</p> <p>ii. 曾使用各種荷爾蒙藥物治療，引起藥物過敏或不可逆之藥物不良反應者。</p> <p>II. 前項藥物治療以連續六個月為上限。</p> <p>5.5.1.1. Degarelix (如 Firmagon) : (103/9/1) 限用於成年男性晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌患者。</p> <p>5.5.2. 抑鈣激素製劑 (Salmon calcitonin injection) 用於惡性疾病之高血鈣症或變形性骨炎 (Paget's disease) (85/10/1、93/8/1、100/1/1、103/2/1)。</p> <p>5.5.3. Bisphosphonate</p> <p>5.5.3.1. Clodronate ; pamidronate : (85/1/1、87/4/1、93/2/1、96/1/1、100/1/1) 限符合下列條件之一患者使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg %) 或游離鈣大於 5.6 mg /dL 者。 2. 惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移之病患，在使用嗎啡、可待因等止痛劑後仍不易控制者。 3. Multiple Myeloma, Breast Cancer, | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Prostate Cancer 併有 蝕骨性骨轉移之病患 (96/1/1)。</p> <p>5.5.3.2. Zoledronic acid : (93/6/1、93/12/1、 96/1/1、98/6/1)</p> <p>5.5.3.2.1. Zoledronic acid 4mg/vial (如 Zometa Powder For Solution For Infusion 4mg)(98/6/1、100/1/1) 限符合下列條件之一患 者使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於治療惡性腫瘤之高 血鈣併發症 (HCM)，且 限用於血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg/dL) 或游離鈣 大於 5.6 mg/dL (93/6/1)。 2. Multiple Myeloma， Breast Cancer， Prostate Cancer 併有 蝕骨性骨轉移之病患 (96/1/1)。 <p>5.5.3.2.2. Zoledronic acid 5mg (如 Aclasta 5mg/100mL Solution for infusion)(98/6/1、 100/1/1) 用於變形性骨炎 (Paget's disease)</p> <p>5.5.3.3. Etidronate (如 Etibon) : (87/10/1、 100/1/1) 限用於 Paget's disease 之症狀治療及 異位性骨化症之治療。</p> <p>5.5.3.4. Ibandronic acid: (96/8/1、97/8/1、</p> | <p>Prostate Cancer 併有 蝕骨性骨轉移之病患 (96/1/1)。</p> <p>5.5.3.2. Zoledronic acid : (93/6/1、93/12/1、 96/1/1、98/6/1)</p> <p>5.5.3.2.1. Zoledronic acid 4mg/vial (如 Zometa Powder For Solution For Infusion 4mg)(98/6/1、100/1/1) 限符合下列條件之一患 者使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於治療惡性腫瘤之高 血鈣併發症 (HCM)，且 限用於血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg/dL) 或游離鈣 大於 5.6 mg/dL (93/6/1)。 2. Multiple Myeloma， Breast Cancer， Prostate Cancer 併有 蝕骨性骨轉移之病患 (96/1/1)。 <p>5.5.3.2.2. Zoledronic acid 5mg (如 Aclasta 5mg/100mL Solution for infusion)(98/6/1、 100/1/1) 用於變形性骨炎 (Paget's disease)</p> <p>5.5.3.3. Etidronate (如 Etibon) : (87/10/1、 100/1/1) 限用於 Paget's disease 之症狀治療及 異位性骨化症之治療。</p> <p>5.5.3.4. Ibandronic acid: (96/8/1、97/8/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>100/1/1)</p> <p>5.5.3.4.1. Ibandronic acid 2mg/2mL ; 6mg/6mL (如 Bondronat concentrate for solution for infusion) (96/8/1、100/1/1)</p> <p>限符合下列條件之一患者使用：</p> <p>(1)限用於治療惡性腫瘤之高血鈣併發症，且限用於血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg/dL)或游離鈣大於 5.6 mg/dL 之病例。</p> <p>(2)限 Breast Cancer 併有蝕骨性骨轉移之病患。</p> <p>5.5.4. Denosumab (如 Xgeva) (102/1/1、104/12/1)</p> <p>限用於：</p> <p>乳癌、前列腺癌及肺癌併有蝕骨性骨轉移之病患。</p> <p>5.5.6. Rasburicase (如 Fasturtec 注射劑) (93/5/1)</p> <p>1. 限用於血液腫瘤 (急性白血病和 high grade 淋巴瘤) 患者之下列情形：</p> <p>(1)治療前或療程開始後，血清尿酸值高於 10mg/dL；兒童高於 8mg/dL 者。</p> <p>(2)有心臟或腎臟衰竭，無法忍受大量靜脈輸液者。</p> | <p>100/1/1)</p> <p>5.5.3.4.1. Ibandronic acid 2mg/2mL ; 6mg/6mL (如 Bondronat concentrate for solution for infusion) (96/8/1、100/1/1)</p> <p>限符合下列條件之一患者使用：</p> <p>(1)限用於治療惡性腫瘤之高血鈣併發症，且限用於血清鈣濃度超過 2.75 mmol/L (11.0mg/dL)或游離鈣大於 5.6 mg/dL 之病例。</p> <p>(2)限 Breast Cancer 併有蝕骨性骨轉移之病患。</p> <p>5.5.4. Denosumab (如 Xgeva) (102/1/1、104/12/1)</p> <p>限用於：</p> <p>乳癌、前列腺癌及肺癌併有蝕骨性骨轉移之病患。</p> <p>5.5.6. Rasburicase (如 Fasturtec 注射劑) (93/5/1)</p> <p>1. 限用於血液腫瘤 (急性白血病和 high grade 淋巴瘤) 患者之下列情形：</p> <p>(1)治療前或療程開始後，血清尿酸值高於 10mg/dL；兒童高於 8mg/dL 者。</p> <p>(2)有心臟或腎臟衰竭，無法忍受大量靜脈輸液者。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(3)對 allopurinol 過敏者。</p> <p>2. 使用以每日一至二劑並以三日為限。</p> <p>5.5.7. Mecasermin (如 Increlex 注射劑) (98/5/1)</p> <p>1. 限由醫學中心或區域醫院小兒內分泌或新陳代謝專科醫師實施。</p> <p>2. Primary IGF-I deficiency</p> <p>(1) 診斷：GH-IGF axis 有明確的基因突變 (即 homozygotes 或 compound heterozygotes) (請檢附檢驗報告)。</p> <p>(2) 開始治療條件：</p> <p>I. 年齡至少二歲。</p> <p>II. 身高低於同性別同年齡正常孩童之-3SD。</p> <p>III. 生長速率一年小於4公分，需具醫療機構之身高檢查每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。</p> <p>IV. 骨齡比實際年齡遲緩至少二個標準差。</p> <p>V. 血清生長激素濃度之基礎值或施行生長激素刺激試驗的最高值超過 10 ng/mL。</p> <p>VI. 血清 IGF-I 基礎值低於 50 μg/L。</p> <p>VII. 血清 IGFBP-3 基礎</p> | <p>(3)對 allopurinol 過敏者。</p> <p>2. 使用以每日一至二劑並以三日為限。</p> <p>5.5.7. Mecasermin (如 Increlex 注射劑) (98/5/1)</p> <p>1. 限由醫學中心或區域醫院小兒內分泌或新陳代謝專科醫師實施。</p> <p>2. Primary IGF-I deficiency</p> <p>(1) 診斷：GH-IGF axis 有明確的基因突變 (即 homozygotes 或 compound heterozygotes) (請檢附檢驗報告)。</p> <p>(2) 開始治療條件：</p> <p>I. 年齡至少二歲。</p> <p>II. 身高低於同性別同年齡正常孩童之-3SD。</p> <p>III. 生長速率一年小於4公分，需具醫療機構之身高檢查每隔三個月一次，至少六個月以上之紀錄。</p> <p>IV. 骨齡比實際年齡遲緩至少二個標準差。</p> <p>V. 血清生長激素濃度之基礎值或施行生長激素刺激試驗的最高值超過 10 ng/mL。</p> <p>VI. 血清 IGF-I 基礎值低於 50 μg/L。</p> <p>VII. 血清 IGFBP-3 基礎</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>值低於 1.0mg/L。</p> <p>VIII. IGF generation test (給予生長激素 33 μg/kg/day 皮下注射四天) 後血清 IGF-I 值增加不超過 20 μg/L。血清 IGF-BP3 值增加不超過 0.4 mg/L。</p> <p>3. Isolated growth hormone deficiency type IA (GHD-IA)</p> <p>(1) 診斷：GH1 gene 有明確的脫失突變 (deletion) (請檢附檢驗報告)</p> <p>(2) 開始治療條件：</p> <p>I. 年齡至少二歲。</p> <p>II. 身高低於同性別同年齡正常孩童之 -2SD。</p> <p>III. 生長速率一年小於 4 公分，需具醫療機構之身高檢查每隔三個月一次，至少六個月以上之記錄。</p> <p>IV. 骨齡比實際年齡遲緩至少 2 個標準差。(請檢附骨齡 X 光片)</p> <p>V. 施行 insulin、clonidine、L-Dopa、glucagon、arginine 等檢查，有兩項以上之檢查皆偵測不到生長激素值。</p> <p>VI. 施予生長激素治療第一年比生長激素</p> | <p>值低於 1.0mg/L。</p> <p>VIII. IGF generation test (給予生長激素 33 μg/kg/day 皮下注射四天) 後血清 IGF-I 值增加不超過 20 μg/L。血清 IGF-BP3 值增加不超過 0.4 mg/L。</p> <p>3. Isolated growth hormone deficiency type IA (GHD-IA)</p> <p>(1) 診斷：GH1 gene 有明確的脫失突變 (deletion) (請檢附檢驗報告)</p> <p>(2) 開始治療條件：</p> <p>I. 年齡至少二歲。</p> <p>II. 身高低於同性別同年齡正常孩童之 -2SD。</p> <p>III. 生長速率一年小於 4 公分，需具醫療機構之身高檢查每隔三個月一次，至少六個月以上之記錄。</p> <p>IV. 骨齡比實際年齡遲緩至少 2 個標準差。(請檢附骨齡 X 光片)</p> <p>V. 施行 insulin、clonidine、L-Dopa、glucagon、arginine 等檢查，有兩項以上之檢查皆偵測不到生長激素值。</p> <p>VI. 施予生長激素治療第一年比生長激素</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>治療前多 3 公分以上，但後來以適當生長激素劑量治療，年生長速率仍小於 3 公分。</p> <p>4. 治療劑量：不超過 120 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 皮下注射每天兩次。</p> <p>5. 治療監測：病人至少每 3 個月測量身高體重一次，每 6 至 12 個月評估骨齡一次。</p> <p>6. 繼續治療條件：</p> <p>(1) 男童骨齡 < 16 歲，女童骨齡 < 14 歲，且骨端尚未癒合患者。</p> <p>(2) 第一年生長速率比治療前增加至少 3 公分。</p> <p>(3) 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。</p> <p>5.6. 骨質疏鬆症治療藥物 (100/1/1)</p> <p>5.6.1 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1)</p> <p>1. 藥品種類</p> <p>(1) Bisphosphonates (雙磷酸鹽類)：alendronate (如 Fosamax)、zoledronate 5mg (如 Aclasta 5mg/100mL solution for infusion)、risedronate (如 Reosteolite)、</p> | <p>治療前多 3 公分以上，但後來以適當生長激素劑量治療，年生長速率仍小於 3 公分。</p> <p>4. 治療劑量：不超過 120 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 皮下注射每天兩次。</p> <p>5. 治療監測：病人至少每 3 個月測量身高體重一次，每 6 至 12 個月評估骨齡一次。</p> <p>6. 繼續治療條件：</p> <p>(1) 男童骨齡 < 16 歲，女童骨齡 < 14 歲，且骨端尚未癒合患者。</p> <p>(2) 第一年生長速率比治療前增加至少 3 公分。</p> <p>(3) 第二年開始，生長速率至少 4 公分/年。</p> <p>5.6. 骨質疏鬆症治療藥物 (100/1/1)</p> <p>5.6.1 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1)</p> <p>1. 藥品種類</p> <p>(1) Bisphosphonates (雙磷酸鹽類)：alendronate (如 Fosamax)、zoledronate 5mg (如 Aclasta 5mg/100mL solution for infusion)、risedronate (如 Reosteolite)、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>ibandronate 3mg/3mL (如 Bonviva 3mg/3mL solution for injection)</p> <p>(2) Selective estrogen receptor modulators (SERM, 選擇性雌激素 接受體調節劑) : raloxifene (如 Evista)、 bazedoxifene (如 Viviant) (102/2/1)</p> <p>(3) Human monoclonal antibody for RANKL (RANKL 單株抗 體) : denosumab (如 Prolia) (101/3/1)</p> <p>2. 使用規定</p> <p>(1) 限用於停經後婦女 (alendronate、 zoledronate、 denosumab 及 risedronate 亦可使 用於男性) 因骨質疏 鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score \leq - 2.5SD) 引起脊椎或髖 部骨折, 或因骨質疏 少症 (osteopenia) (經 DXA 檢測 BMD 之 - 2.5SD < T score < - 1.0SD) 引起脊椎或髖 部 2 處或 2 次 (含) 以 上之骨折。 (101/5/1、102/8/1、 103/10/1、104/8/1)</p> <p>(2) 治療時, 一次限用一 項藥物, 不得併用其 他骨質疏鬆症治療藥 物。</p> | <p>ibandronate 3mg/3mL (如 Bonviva 3mg/3mL solution for injection)</p> <p>(2) Selective estrogen receptor modulators (SERM, 選擇性雌激素 接受體調節劑) : raloxifene (如 Evista)、 bazedoxifene (如 Viviant) (102/2/1)</p> <p>(3) Human monoclonal antibody for RANKL (RANKL 單株抗 體) : denosumab (如 Prolia) (101/3/1)</p> <p>2. 使用規定</p> <p>(1) 限用於停經後婦女 (alendronate、 zoledronate、 denosumab 及 risedronate 亦可使 用於男性) 因骨質疏 鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score \leq - 2.5SD) 引起脊椎或髖 部骨折, 或因骨質疏 少症 (osteopenia) (經 DXA 檢測 BMD 之 - 2.5SD < T score < - 1.0SD) 引起脊椎或髖 部 2 處或 2 次 (含) 以 上之骨折。 (101/5/1、102/8/1、 103/10/1、104/8/1)</p> <p>(2) 治療時, 一次限用一 項藥物, 不得併用其 他骨質疏鬆症治療藥 物。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p> <p>5.6.2 Parathyroid hormones and analogues (副甲狀腺素及類似劑)：teriparatide 注射劑(101/7/1)</p> <p>限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 停經後骨質疏鬆婦女。 2. 原發性或次發於性腺功能低下症造成骨質疏鬆之男性。 3. 需符合下列條件： <ol style="list-style-type: none"> (1)引起脊椎或腕部多於 2 (含)處骨折，經評估 (須於病歷載明) 無法耐受副作用或在持續配合使用抗骨質吸收劑至少連續 12 個月的情況下仍發生至少 1 處新的骨折之病患。 (2)骨質疏鬆之程度，須經 DXA 檢測 BMD 之 T score 小於或等於-3.0SD。 4. 使用不得超過 18 支並於二年內使用完畢，使用期間內不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。 備註 DXA: Dual energy X-ray absorptiometry BMD: Bone mineral density <p>第 8 節 免疫製劑 Immunologic agents</p> <p>8.1. 疫苗及免疫球蛋白</p> | <p>(3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p> <p>5.6.2 Parathyroid hormones and analogues (副甲狀腺素及類似劑)：teriparatide 注射劑(101/7/1)</p> <p>限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 停經後骨質疏鬆婦女。 2. 原發性或次發於性腺功能低下症造成骨質疏鬆之男性。 3. 需符合下列條件： <ol style="list-style-type: none"> (1)引起脊椎或腕部多於 2 (含)處骨折，經評估 (須於病歷載明) 無法耐受副作用或在持續配合使用抗骨質吸收劑至少連續 12 個月的情況下仍發生至少 1 處新的骨折之病患。 (2)骨質疏鬆之程度，須經 DXA 檢測 BMD 之 T score 小於或等於-3.0SD。 4. 使用不得超過 18 支並於二年內使用完畢，使用期間內不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。 備註 DXA: Dual energy X-ray absorptiometry BMD: Bone mineral density <p>第 8 節 免疫製劑 Immunologic agents</p> <p>8.1. 疫苗及免疫球蛋白</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Vaccines and Immunoglobulins</p> <p>8.1.1. Hepatitis B immune globulin :</p> <p>應以 HBsAg (-), Anti-HBc (-) 之醫院工作人員為主，且傳染者需為 HBsAg (+)。</p> <p>8.1.2. (刪除)</p> <p>8.1.3. 高單位免疫球蛋白 (如 Gamimune-N; Venoglobulin 等) :</p> <p>限符合下列適應症病患檢附病歷摘要 (註明診斷，相關檢查報告及數據，體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效...等)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先天或後天性免疫球蛋白低下症併發嚴重感染時 (需附六個月內免疫球蛋白檢查報告) 2. 免疫血小板缺乏性紫斑症 (ITP) 經傳統治療效果不佳，其血小板 < 20,000/cumm 且符合下列情況之一者： <ul style="list-style-type: none"> (1) 有嚴重出血危及生命者。 (2) 需接受緊急手術治療者。(103/4/1) 3. 緊急狀況下，免疫血小板缺乏性紫斑症 (ITP) 病例合併血小板嚴重低下 (<20,000/cumm)，雖未經傳統治療，但合併有嚴重出血，而又必須接受緊急手術治療者。(103/4/1) 4. 先天性免疫不全症之預 | <p>Vaccines and Immunoglobulins</p> <p>8.1.1. Hepatitis B immune globulin :</p> <p>應以 HBsAg (-), Anti-HBc (-) 之醫院工作人員為主，且傳染者需為 HBsAg (+)。</p> <p>8.1.2. (刪除)</p> <p>8.1.3. 高單位免疫球蛋白 (如 Gamimune-N; Venoglobulin 等) :</p> <p>限符合下列適應症病患檢附病歷摘要 (註明診斷，相關檢查報告及數據，體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效...等)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先天或後天性免疫球蛋白低下症併發嚴重感染時 (需附六個月內免疫球蛋白檢查報告) 2. 免疫血小板缺乏性紫斑症 (ITP) 經傳統治療效果不佳，其血小板 < 20,000/cumm 且符合下列情況之一者： <ul style="list-style-type: none"> (1) 有嚴重出血危及生命者。 (2) 需接受緊急手術治療者。(103/4/1) 3. 緊急狀況下，免疫血小板缺乏性紫斑症 (ITP) 病例合併血小板嚴重低下 (<20,000/cumm)，雖未經傳統治療，但合併有嚴重出血，而又必須接受緊急手術治療者。(103/4/1) 4. 先天性免疫不全症之預 | |
|--|--|--|

防性使用，但需有醫學中心之診斷證明。

5. 川崎病合乎美國疾病管制中心所訂之診斷標準，限由區域醫院(含)以上教學醫院實施，並填寫「全民健康保險使用 Intravenous Immune Globulin (IVIG) 治療川崎病」申請表(詳附表六)併當月份醫療費用申報。
6. 因感染誘發過度免疫機轉反應，而致維生重要器官衰竭，有危及生命之慮者，限由區域醫院(含)以上有加護病房乙等級以上之教學醫院實施。(93/2/1)
7. 腸病毒感染嚴重患者，且符合衛生福利部疾病管制署修訂之「腸病毒感染嚴重患者靜脈注射免疫球蛋白之適應症」。(97/5/9、102/7/23、105/8/1)

註：川崎病診斷標準：

1. 發燒五天或五天以上且合併下列五項臨床症狀中至少四項。
 - (1) 兩眼眼球結膜充血。
 - (2) 嘴唇及口腔的變化：嘴唇紅、乾裂或草莓舌或咽喉泛紅。
 - (3) 肢端病變：手(足)水腫或指(趾)尖脫皮。
 - (4) 多形性皮炎。
 - (5) 頸部淋巴腺腫。
2. 排除其他可能引起類似

防性使用，但需有醫學中心之診斷證明。

5. 川崎病合乎美國疾病管制中心所訂之診斷標準，限由區域醫院(含)以上教學醫院實施，並填寫「全民健康保險使用 Intravenous Immune Globulin (IVIG) 治療川崎病」申請表(詳附表六)併當月份醫療費用申報。
6. 因感染誘發過度免疫機轉反應，而致維生重要器官衰竭，有危及生命之慮者，限由區域醫院(含)以上有加護病房乙等級以上之教學醫院實施。(93/2/1)
7. 腸病毒感染嚴重患者，且符合衛生福利部疾病管制署於97年1月修訂之「腸病毒感染嚴重患者靜脈注射免疫球蛋白之適應症」。(97/5/9、102/7/23)

註 1：川崎病診斷標準：

1. 發燒五天或五天以上且合併下列五項臨床症狀中至少四項。
 - (1) 兩眼眼球結膜充血。
 - (2) 嘴唇及口腔的變化：嘴唇紅、乾裂或草莓舌或咽喉泛紅。
 - (3) 肢端病變：手(足)水腫或指(趾)尖脫皮。
 - (4) 多形性皮炎。
 - (5) 頸部淋巴腺腫。
2. 排除其他可能引起類似

臨床疾病。

3. 或只符合三項臨床症狀，但心臟超音波檢查已發現有冠狀動脈病變。

臨床疾病。

3. 或只符合三項臨床症狀，但心臟超音波檢查已發現有冠狀動脈病變。

註 2：腸病毒感染嚴重患者靜脈注射免疫球蛋白之適應症：

1. 靜脈注射免疫球蛋白對於腸病毒感染併發重症病人的治療效果，目前仍有待確認。
2. 不鼓勵使用於 5 歲以上患者。
3. 適應症：出現手足口病或疱疹性咽峽炎臨床症狀，或雖無以上症狀，但與其他確定病例有流行病學上相關（*1）的腸病毒感染個案，並且符合下列條件之一：
 - （1）肌抽躍合併無明顯誘發因素之心率過速（心跳每分鐘超過 150 次）。（*2）
 - （2）急性肢體麻痺。
 - （3）急性腦炎，尤其是供伴隨局部特異性腦幹神經症狀：失調（ataxia）、對側偏癱（cross hemiplegia）、特定腦神經損害（specific cranial Ns lesion）或腦幹自主神經機能障礙（brainstem dysautonomia）。（*3）
 - （4）肺功能衰竭，如急性

| | | |
|--|--|--|
| <p>8.1.4. Immunoglobulin (如：ATG-Fresenius、 Thymoglobuline inj、 Lymphoglobuline inj) (90/11/1、96/2/1、</p> | <p><u>肺水腫、肺出血、成人型呼吸窘迫症。</u> <u>(5)心臟功能衰竭。</u> <u>(6)敗血症候群 (Sepsis syndrome)。(*4)</u> <u>*1：指個案發病前與確定病例有親密接觸可能性者，包括家庭或學校中的腸病毒感染</u> <u>的確定病例。</u> <u>*2：只有肌抽躍症狀者不符合使用條件。</u> <u>*3：只有腦膜炎而無腦炎或類小兒麻痺症候群者，及非腸病毒引起的腦炎患者不符合使用條件。</u> <u>*4：併發多發性器官衰竭之患者因使用效果不佳，故不建議使用。</u> <u>4. 建議劑量為 1 gm/kg 靜脈滴注 12 小時，共一次。</u> <u>5. 醫師使用靜脈注射免疫球蛋白治療患者後，請儘速填寫通報單通報各縣市衛生局，送交衛生福利部疾病管制署審查。(97/5/9、102/7/23)</u></p> <p>8.1.4. Immunoglobulin (如：ATG-Fresenius、 Thymoglobuline inj、 Lymphoglobuline inj) (90/11/1、96/2/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>97/8/1、99/2/1)：</p> <p>1. 限符合下列適應症病患檢附病歷摘要（註明診斷、相關檢查報告及數據、體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效··等）</p> <p>(1)嚴重再生不良性貧血經傳統方法治療無效且不適合作骨髓移植之病例。</p> <p>(2)器官移植病患併發嚴重之急性排斥反應。</p> <p>(3)急性 graft versus host disease。</p> <p>(4)心臟移植病人使用呼吸器，並可能併發腎功能不全者。</p> <p>(5)ATG-Fresenius 及 Thymoglobuline inj. 可用於預防腎臟移植引起之急性排斥。</p> <p>(99/2/1)</p> <p>2. 作為非親屬或 HLA 不吻合異體骨髓移植的血液腫瘤及再生不良性貧血病人移植前之條件療法。使用量以不超過 45mg/kg/day 為原則。</p> <p>(97/8/1)</p> <p>3. 同類藥品擇一使用，不得同時處方。</p> <p>8.1.5. 人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白(如 Rabipur)：(103/1/1、103/5/1)</p> <p>1. 本類藥品使用於遭疑似狂犬病動物咬傷暴露後之接種，其使用對象及使用方式應依衛生福利部疾病管制署最新版</p> | <p>97/8/1、99/2/1)：</p> <p>1. 限符合下列適應症病患檢附病歷摘要（註明診斷、相關檢查報告及數據、體重、年齡、性別、病史、曾否使用同一藥品及其療效··等）</p> <p>(1)嚴重再生不良性貧血經傳統方法治療無效且不適合作骨髓移植之病例。</p> <p>(2)器官移植病患併發嚴重之急性排斥反應。</p> <p>(3)急性 graft versus host disease。</p> <p>(4)心臟移植病人使用呼吸器，並可能併發腎功能不全者。</p> <p>(5)ATG-Fresenius 及 Thymoglobuline inj. 可用於預防腎臟移植引起之急性排斥。</p> <p>(99/2/1)</p> <p>2. 作為非親屬或 HLA 不吻合異體骨髓移植的血液腫瘤及再生不良性貧血病人移植前之條件療法。使用量以不超過 45mg/kg/day 為原則。</p> <p>(97/8/1)</p> <p>3. 同類藥品擇一使用，不得同時處方。</p> <p>8.1.5. 人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白(如 Rabipur)：(103/1/1、103/5/1)</p> <p>1. 本類藥品使用於遭疑似狂犬病動物咬傷暴露後之接種，其使用對象及使用方式應依衛生福利部疾病管制署最新版</p> | |
|--|--|--|

「疑似狂犬病動物抓咬傷臨床處置指引」之接種建議辦理(請參閱疾病管制署狂犬病專區網頁 <http://www.cdc.gov.tw>)。

2. 限於疾病管制署公布之人用狂犬病疫苗接種服務醫院(衛生所)施打。(103/5/1)

8.2. 免疫調節劑

Immunomodulators

8.2.1. Cyclosporin (如 Sandimmun) :

(86/1/1、86/9/1、

89/7/1、101/10/1) 限

1. 器官移植抗排斥藥物。
2. 嚴重乾癬引起之全身性紅皮症(需檢附照片)。
3. 自體免疫性葡萄膜炎及貝西氏病病例使用，請檢附病歷摘要及診斷證明。
4. 替代性療法無效或不適用之嚴重乾癬(需檢附三個月以上之病歷與用藥紀錄)。
5. 標準療法無效或不適用之嚴重類風濕性關節炎(需檢附三個月以上之病歷與用藥紀錄)。
6. 以類固醇治療無效或對類固醇有依賴性的原發性腎病症候群【經活體檢視 (biopsy) 主要為微小病變疾病或局部環節腎絲球硬化症】，經細胞穩定劑 (cytostatics) 治療無效且腎功能指數在正常

「疑似狂犬病動物抓咬傷臨床處置指引」之接種建議辦理(請參閱疾病管制署狂犬病專區網頁 <http://www.cdc.gov.tw>)。

2. 限於疾病管制署公布之人用狂犬病疫苗接種服務醫院(衛生所)施打。(103/5/1)

8.2. 免疫調節劑

Immunomodulators

8.2.1. Cyclosporin (如 Sandimmun) :

(86/1/1、86/9/1、

89/7/1、101/10/1) 限

1. 器官移植抗排斥藥物。
2. 嚴重乾癬引起之全身性紅皮症(需檢附照片)。
3. 自體免疫性葡萄膜炎及貝西氏病病例使用，請檢附病歷摘要及診斷證明。
4. 替代性療法無效或不適用之嚴重乾癬(需檢附三個月以上之病歷與用藥紀錄)。
5. 標準療法無效或不適用之嚴重類風濕性關節炎(需檢附三個月以上之病歷與用藥紀錄)。
6. 以類固醇治療無效或對類固醇有依賴性的原發性腎病症候群【經活體檢視 (biopsy) 主要為微小病變疾病或局部環節腎絲球硬化症】，經細胞穩定劑 (cytostatics) 治療無效且腎功能指數在正常

| | | |
|---|---|--|
| <p>值 50%以上之病人。</p> <p>7. 若經病人使用 cyclosporin 後四個月內，其每日尿蛋白量無法降低至少 40%時，即認定為 cyclosporin 治療無效，應予以停用 cyclosporin。</p> <p>8. 使用於後天型嚴重再生不良性貧血。惟限使用「Sandimmun Neoral Soft Gelatin Capsules 25mg」及「Sandimmun Neoral Oral Solution 100mg/mL」。</p> <p>(101/10/1)</p> <p>8.2.2. Tacrolimus</p> <p>8.2.2.1. Tacrolimus 持續性口服製劑：(98/8/1)</p> <p>1. 成人肝、腎移植之第一線用藥。</p> <p>2. 成人肝、腎移植 cyclosporin 無效之第二線用藥。</p> <p>8.2.2.2. Tacrolimus 注射劑及其他非持續性口服製劑：(88/8/1、93/12/1、102/7/1)</p> <p>1. 肝臟及腎臟移植之第一線用藥或肝腎移植 cyclosporin 無效之第二線用藥。</p> <p>2. 心臟移植之第一線、第二線用藥。</p> <p>8.2.3. 多發性硬化症治療藥品 (91/4/1、92/3/1、92/12/1、93/3/1、94/10/1、96/7/1、97/8/1、99/10/1、100/5/1、100/10/1、</p> | <p>值 50%以上之病人。</p> <p>7. 若經病人使用 cyclosporin 後四個月內，其每日尿蛋白量無法降低至少 40%時，即認定為 cyclosporin 治療無效，應予以停用 cyclosporin。</p> <p>8. 使用於後天型嚴重再生不良性貧血。惟限使用「Sandimmun Neoral Soft Gelatin Capsules 25mg」及「Sandimmun Neoral Oral Solution 100mg/mL」。</p> <p>(101/10/1)</p> <p>8.2.2. Tacrolimus</p> <p>8.2.2.1. Tacrolimus 持續性口服製劑：(98/8/1)</p> <p>1. 成人肝、腎移植之第一線用藥。</p> <p>2. 成人肝、腎移植 cyclosporin 無效之第二線用藥。</p> <p>8.2.2.2. Tacrolimus 注射劑及其他非持續性口服製劑：(88/8/1、93/12/1、102/7/1)</p> <p>1. 肝臟及腎臟移植之第一線用藥或肝腎移植 cyclosporin 無效之第二線用藥。</p> <p>2. 心臟移植之第一線、第二線用藥。</p> <p>8.2.3. 多發性硬化症治療藥品 (91/4/1、92/3/1、92/12/1、93/3/1、94/10/1、96/7/1、97/8/1、99/10/1、100/5/1、100/10/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>101/9/1、102/10/1)</p> <p>8.2.3.1. Interferon beta-1a (如 Rebif Micrograms) : (91/4/1、97/8/1、100/10/1)</p> <p>1. 限用於復發型多發性硬化症。</p> <p>2. 初次使用時，需經事前審查。(100/10/1)</p> <p>3. 不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO)，包括：(100/10/1)</p> <p>(1) 有視神經及脊髓發作。</p> <p>(2) 出現下列 2 種以上症狀：</p> <p>i 脊髓侵犯大於 3 節。</p> <p>ii NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。</p> <p>iii 腦部磁振造影不符合多發性硬化症診斷標準。</p> <p>8.2.3.2. Interferon beta-1b (如 Betaferon 8MIU) : (92/3/1、92/12/1、93/3/1、97/8/1、99/10/1、100/10/1)</p> <p>限用於：</p> <p>1. 降低反覆發作型多發性硬化症的發作頻率及嚴重度，初次使用時，需經事前審查。(100/10/1)</p> <p>2. 降低續發型多發性硬化症的發作頻率及嚴重度，初次使用時，需經</p> | <p>101/9/1、102/10/1)</p> <p>8.2.3.1. Interferon beta-1a (如 Rebif Micrograms) : (91/4/1、97/8/1、100/10/1)</p> <p>1. 限用於復發型多發性硬化症。</p> <p>2. 初次使用時，需經事前審查。(100/10/1)</p> <p>3. 不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO)，包括：(100/10/1)</p> <p>(1) 有視神經及脊髓發作。</p> <p>(2) 出現下列 2 種以上症狀：</p> <p>i 脊髓侵犯大於 3 節。</p> <p>ii NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。</p> <p>iii 腦部磁振造影不符合多發性硬化症診斷標準。</p> <p>8.2.3.2. Interferon beta-1b (如 Betaferon 8MIU) : (92/3/1、92/12/1、93/3/1、97/8/1、99/10/1、100/10/1)</p> <p>限用於：</p> <p>1. 降低反覆發作型多發性硬化症的發作頻率及嚴重度，初次使用時，需經事前審查。(100/10/1)</p> <p>2. 降低續發型多發性硬化症的發作頻率及嚴重度，初次使用時，需經</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>事前審查。 (100/10/1)。</p> <p>3. 發生單一臨床症狀 (Clinically Isolated Syndrome) 疑似多發性硬化症的病患。使用時需符合下列規定： (99/10/1)</p> <p>(1) 需經事前審查核准後使用。</p> <p>(2) 限神經科醫師申請使用，申請時必須附病歷及具 2 個以上 MS-like 病灶點之 MRI 影像，以確認符合 Clinical Isolated Syndrome (CIS)。</p> <p>4. 不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO)，包括： (100/10/1)</p> <p>(1) 有視神經及脊髓發作。</p> <p>(2) 出現下列 2 種以上症狀：</p> <p>i 脊髓侵犯大於 3 節。</p> <p>ii NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。</p> <p>iii 腦部磁振造影不符合多發性硬化症診斷標準。</p> <p>8. 2. 3. 3. Glatiramer acetate (如 Copaxone injection)：(94/10/1、97/8/1)</p> <p>限用於復發型多發性硬化症，Copaxone 用於減少復發型多發性硬化症</p> | <p>事前審查。 (100/10/1)。</p> <p>3. 發生單一臨床症狀 (Clinically Isolated Syndrome) 疑似多發性硬化症的病患。使用時需符合下列規定： (99/10/1)</p> <p>(1) 需經事前審查核准後使用。</p> <p>(2) 限神經科醫師申請使用，申請時必須附病歷及具 2 個以上 MS-like 病灶點之 MRI 影像，以確認符合 Clinical Isolated Syndrome (CIS)。</p> <p>4. 不適用於視神經脊髓炎 (neuromyelitis optica, NMO)，包括： (100/10/1)</p> <p>(1) 有視神經及脊髓發作。</p> <p>(2) 出現下列 2 種以上症狀：</p> <p>i 脊髓侵犯大於 3 節。</p> <p>ii NMO-IgG or Aquaporin-4 抗體陽性。</p> <p>iii 腦部磁振造影不符合多發性硬化症診斷標準。</p> <p>8. 2. 3. 3. Glatiramer acetate (如 Copaxone injection)：(94/10/1、97/8/1)</p> <p>限用於復發型多發性硬化症，Copaxone 用於減少復發型多發性硬化症</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>病人的復發頻率。</p> <p>8.2.3.4. Natalizumab (如 Tysabri) (100/5/1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於 interferon-beta 或 glatiramer 治療無效之復發型多發性硬化症病人。 2. 前述治療無效定義，係指患者臨床上每年有 2 次 (含) 以上的失能發作，且併下列條件之一： <ol style="list-style-type: none"> (1) 磁振攝影 (MRI) 影像的 T2 增強訊號病灶明顯增加。 (2) 至少出現 1 個釤增強病灶 (gadolinium-enhancing lesions)。 3. 病患若為眼神經脊髓炎 (neuromyelitis optica) 或曾經有脊髓發作超過三節或三節 (≥ 3 vertebral bodies) 以上者，不得使用。 4. 僅限於「多發性硬化症擴展殘疾狀況評分表」(Expanded Disability Status Scale; EDSS) 小於 5.5 者使用。 5. 須經事前審查核准後使用，每年須重新申請，排除眼神經脊髓炎 (neuromyelitis optica) 病患。處方醫師應事先告知病患，使用本案藥品無法完全排除發生「進行性多灶性白質腦病」(Progressive multifocal | <p>病人的復發頻率。</p> <p>8.2.3.4. Natalizumab (如 Tysabri) (100/5/1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於 interferon-beta 或 glatiramer 治療無效之復發型多發性硬化症病人。 2. 前述治療無效定義，係指患者臨床上每年有 2 次 (含) 以上的失能發作，且併下列條件之一： <ol style="list-style-type: none"> (1) 磁振攝影 (MRI) 影像的 T2 增強訊號病灶明顯增加。 (2) 至少出現 1 個釤增強病灶 (gadolinium-enhancing lesions)。 3. 病患若為眼神經脊髓炎 (neuromyelitis optica) 或曾經有脊髓發作超過三節或三節 (≥ 3 vertebral bodies) 以上者，不得使用。 4. 僅限於「多發性硬化症擴展殘疾狀況評分表」(Expanded Disability Status Scale; EDSS) 小於 5.5 者使用。 5. 須經事前審查核准後使用，每年須重新申請，排除眼神經脊髓炎 (neuromyelitis optica) 病患。處方醫師應事先告知病患，使用本案藥品無法完全排除發生「進行性多灶性白質腦病」(Progressive multifocal | |
|--|--|--|

leukoencephalopathy ;
PML)之副作用，PML 致
死率高，且臨床上不易
處理。

8.2.3.5.Fingolimod

0.5mg(如 Gilenya) :
(101/9/1、102/10/1)

1. 限用於雖已接受乙型干
擾素或 glatiramer 治
療，相較於前一年度復
發率仍不變或反而上升
之高度活躍型復發緩解
之多發性硬化症病人
(highly active
relapsing - remitting
multiple sclerosis 即
前一年有一次以上復發
或是前兩年有兩次以上
復發)，但排除使用於：

(1)EDSS (Expanded
Disability Status
Scale)大於 5.5 之患
者。

(2)視神經脊髓炎
(neuromyelitis
optica, NMO)，包括：
I 有視神經及脊髓發
作。

II 出現下列 2 種以上
症狀：

- i. 脊髓侵犯大於 3
節；
- ii. NMO-IgG or
Aquaporin-4 抗
體陽性；
- iii. 腦部磁振造影
不符合多發性硬
化症診斷標準。

2. 須經事前審查核准後使
用，每年需重新申請，

leukoencephalopathy ;
PML)之副作用，PML 致
死率高，且臨床上不易
處理。

8.2.3.5.Fingolimod

0.5mg(如 Gilenya) :
(101/9/1、102/10/1)

1. 限用於雖已接受乙型干
擾素或 glatiramer 治
療，相較於前一年度復
發率仍不變或反而上升
之高度活躍型復發緩解
之多發性硬化症病人
(highly active
relapsing - remitting
multiple sclerosis 即
前一年有一次以上復發
或是前兩年有兩次以上
復發)，但排除使用於：

(1)EDSS (Expanded
Disability Status
Scale)大於 5.5 之患
者。

(2)視神經脊髓炎
(neuromyelitis
optica, NMO)，包括：
I 有視神經及脊髓發
作。

II 出現下列 2 種以上
症狀：

- i. 脊髓侵犯大於 3
節；
- ii. NMO-IgG or
Aquaporin-4 抗
體陽性；
- iii. 腦部磁振造影
不符合多發性硬
化症診斷標準。

2. 須經事前審查核准後使
用，每年需重新申請，

| | | |
|---|--|--|
| <p>併應提出整個用藥期間的復發情形。 (102/10/1)</p> <p>3. 使用兩年後，年度復發率(average annual relapse)無法減少[*]時應停止本藥品之治療。 (102/10/1)</p> <p>4. 個案在停藥觀察期間復發且為高度活躍型復發緩解之多發性硬化症病人(highly active relapsing - remitting multiple sclerosis)可再申請並經事前審查核准後使用。(102/10/1)</p> <p>※年度復發率無法減少之定義： 採計使用 fingolimod 藥物後一年至兩年復發次數之數據（以最近一年或兩年之復發次數除以 1 或 2 來計算），較諸更先前一年或兩年之年復發率皆無再減少時。 (102/10/1)</p> <p>8. 2. 4. Etanercept(如 Enbrel); adalimumab (如 Humira) ;golimumab (如 Simponi) ; abatacept (如 Orencia) ; tocilizumab (如 Actemra) ; tofacitinib (如 Xeljanz) : (92/3/1、93/8/1、93/9/1、98/3/1、99/2/1、100/12/1、101/1/1、101/6/1、101/10/1、102/1/1、</p> | <p>併應提出整個用藥期間的復發情形。 (102/10/1)</p> <p>3. 使用兩年後，年度復發率(average annual relapse)無法減少[*]時應停止本藥品之治療。 (102/10/1)</p> <p>4. 個案在停藥觀察期間復發且為高度活躍型復發緩解之多發性硬化症病人(highly active relapsing - remitting multiple sclerosis)可再申請並經事前審查核准後使用。(102/10/1)</p> <p>※年度復發率無法減少之定義： 採計使用 fingolimod 藥物後一年至兩年復發次數之數據（以最近一年或兩年之復發次數除以 1 或 2 來計算），較諸更先前一年或兩年之年復發率皆無再減少時。 (102/10/1)</p> <p>8. 2. 4. Etanercept(如 Enbrel);adalimumab (如 Humira) ;golimumab (如 Simponi) ; abatacept (如 Orencia) ; tocilizumab (如 Actemra) ; tofacitinib (如 Xeljanz) : (92/3/1、93/8/1、93/9/1、98/3/1、99/2/1、100/12/1、101/1/1、101/6/1、101/10/1、102/1/1、102/2/1、102/4/1、</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>102/2/1、102/4/1、 102/10/1、103/9/1、 103/12/1、<u>105/9/1、</u> <u>105/10/1</u>)</p> <p>使用本類藥品之醫事機構應注意監測病患用藥後之不良反應及可能發生的重大安全事件(如肺結核及病毒性肝炎)。(103/9/1)</p> <p>8.2.4.1. Etanercept(如 Enbrel)； adalimumab(如 Humira)； tocilizumab (如 Actemra) (94/3/1、 101/12/1、 102/1/1、 102/10/1、 <u>105/10/1</u>)：兒童 治療部分</p> <p>1. Etanercept 限使用於 4 歲至 17 歲的兒童具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。 adalimumab 限使用於 <u>2</u> 歲至 17 歲具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者 (101/12/1、<u>105/10/1</u>)。 tocilizumab 限使用於 2 歲(含)以上的活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。(102/10/1)</p> <p>2. 限具有風濕病專科醫師證書之內科、小兒科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師處方。</p> | <p>102/10/1、103/9/1、 103/12/1)</p> <p>使用本類藥品之醫事機構應注意監測病患用藥後之不良反應及可能發生的重大安全事件(如肺結核及病毒性肝炎)。(103/9/1)</p> <p>8.2.4.1. Etanercept(如 Enbrel)； adalimumab(如 Humira)； tocilizumab (如 Actemra) (94/3/1、 101/12/1、 102/1/1、 102/10/1)：兒童 治療部分</p> <p>1. Etanercept 限使用於 4 歲至 17 歲的兒童具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。 adalimumab 限使用於 <u>13</u> 歲至 17 歲具有活動性多關節幼年型慢性關節炎患者 (101/12/1)。 tocilizumab 限使用於 2 歲(含)以上的活動性多關節幼年型慢性關節炎患者。(102/10/1)</p> <p>2. 限具有風濕病專科醫師證書之內科、小兒科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師處方。</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>3. 需事前審查核准後使用。</p> <p>(1) 申報時需檢附 methrotexate 或 corticosteroids 藥物使用的劑量、治療時間、副作用、及關節腫脹治療前後的相關照片或關節 X 光檢查報告等資料。</p> <p>(2) 使用 etanercept、adalimumab 或 tocilizumab 之後，每六個月需再申請一次；需描述使用藥物後的療效、副作用或併發症。 (101/12/1、102/10/1)</p> <p>4. 病患需同時符合下述 (1)(2)(3) 三項條件者方可使用</p> <p>(1) 病人的關節炎必須符合下列任何一種亞型的病變： I 全身性 (systemic) II 多發性關節炎 (polyarticular) (類風濕性因子陽性或陰性者皆可) III 擴散型嚴重少數關節炎 (extended oligoarticular)</p> <p>(2) 標準療法失敗者 (符合下列任一項) I 病患必須曾經接受 methotrexate 的充分治療。 充分治療的定義：</p> | <p>3. 需事前審查核准後使用。</p> <p>(1) 申報時需檢附 methrotexate 或 corticosteroids 藥物使用的劑量、治療時間、副作用、及關節腫脹治療前後的相關照片或關節 X 光檢查報告等資料。</p> <p>(2) 使用 etanercept、adalimumab 或 tocilizumab 之後，每六個月需再申請一次；需描述使用藥物後的療效、副作用或併發症。 (101/12/1、102/10/1)</p> <p>4. 病患需同時符合下述 (1)(2)(3) 三項條件者方可使用</p> <p>(1) 病人的關節炎必須符合下列任何一種亞型的病變： I 全身性 (systemic) II 多發性關節炎 (polyarticular) (類風濕性因子陽性或陰性者皆可) III 擴散型嚴重少數關節炎 (extended oligoarticular)</p> <p>(2) 標準療法失敗者 (符合下列任一項) I 病患必須曾經接受 methotrexate 的充分治療。 充分治療的定義：</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>10 毫克/身體表面積平方米/週的口 服或注射 methotrexate 治 療，藥物治療時間 必須達 3 個月以 上。(若因藥物毒 性無法忍受，以致 於無法達到上項要 求時，劑量可以酌 情降低。)</p> <p>II 若單獨使用類固醇 來治療全身性類風 濕性關節炎症狀， prednisolone 的 劑量必須高於每天 每公斤 0.25 毫克 以上並且發生無法 接受的副作用。</p> <p>(3)最近 3 個月關節炎的 活動性必須符合活動 性多關節炎標準者。 活動性多關節炎標準 定義:關節病情必須同 時符合下列兩個要 項:</p> <p>I 腫脹的關節總數大 於等於 5 個。</p> <p>II 關節活動受到限制 而且具有疼痛或壓 痛的關節總數\geq3 個。 (必須附上關節腫 脹之相關照片或關 節 X 光檢查報告作 為輔証)。</p> <p>5. 需排除 etanercept、 adalimumab 及 tocilizumab 使用的情 形(102/10/1)</p> | <p>10 毫克/身體表面 積平方米/週的口 服或注射 methotrexate 治 療，藥物治療時間 必須達 3 個月以 上。(若因藥物毒 性無法忍受，以致 於無法達到上項要 求時，劑量可以酌 情降低。)</p> <p>II 若單獨使用類固醇 來治療全身性類風 濕性關節炎症狀， prednisolone 的 劑量必須高於每天 每公斤 0.25 毫克 以上並且發生無法 接受的副作用。</p> <p>(3)最近 3 個月關節炎的 活動性必須符合活動 性多關節炎標準者。 活動性多關節炎標準 定義:關節病情必須同 時符合下列兩個要 項:</p> <p>I 腫脹的關節總數大 於等於 5 個。</p> <p>II 關節活動受到限制 而且具有疼痛或壓 痛的關節總數\geq3 個。 (必須附上關節腫 脹之相關照片或關 節 X 光檢查報告作 為輔証)。</p> <p>5. 需排除 etanercept、 adalimumab 及 tocilizumab 使用的情 形(102/10/1)</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2)罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3)未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1)</p> <p>(4)身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症 (sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>6. 需停止 etanercept、adalimumab 及 tocilizumab 治療的情形(102/10/1)</p> <p>如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <p>I 惡性腫瘤。</p> <p>II 該藥物引起的嚴重毒性。</p> <p>III 懷孕（暫時停藥即可）。</p> <p>IV 嚴重的間發性感染症 (intercurrent infection)(暫時停藥即可)。</p> | <p>應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2)罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3)未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1)</p> <p>(4)身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症 (sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>6. 需停止 etanercept、adalimumab 及 tocilizumab 治療的情形(102/10/1)</p> <p>如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <p>I 惡性腫瘤。</p> <p>II 該藥物引起的嚴重毒性。</p> <p>III 懷孕（暫時停藥即可）。</p> <p>IV 嚴重的間發性感染症 (intercurrent infection)(暫時停藥即可)。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>療效不彰：患者的 core set data 經過 6 個月治療後未達療效者。</p> <p>療效定義：</p> <p>I 紅血球沉降速率 (ESR) 或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善 30% 以上效果者。</p> <p>i. 活動性關節炎的總數</p> <p>ii. 關節活動範圍受到限制的關節總數</p> <p>iii. 醫師的整體評估</p> <p>II 上述各種指標惡化程度達 30% 以上者不得超過一項</p> <p>◎附表十六：全民健康保險活動性多關節幼年型慢性關節炎使用 etanercept/adalimumab/tocilizumab 申請表</p> <p>◎附表十六之二：(刪除)</p> <p>8.2.4.2. Etanercept(如 Enbrel)；adalimumab (如 Humira)；golimumab (如 Simponi)；abatacept (如 Orencia)；tocilizumab (如 Actemra)；tofacitinib (如 Xeljanz) (92/3/1、93/8/1、93/9/1、98/3/1、</p> | <p>療效不彰：患者的 core set data 經過 6 個月治療後未達療效者。</p> <p>療效定義：</p> <p>I 紅血球沉降速率 (ESR) 或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善 30% 以上效果者。</p> <p>i. 活動性關節炎的總數</p> <p>ii. 關節活動範圍受到限制的關節總數</p> <p>iii. 醫師的整體評估</p> <p>II 上述各種指標惡化程度達 30% 以上者不得超過一項</p> <p>◎附表十六：全民健康保險活動性多關節幼年型慢性關節炎使用 etanercept/adalimumab/tocilizumab 申請表</p> <p>◎附表十六之二：(刪除)</p> <p>8.2.4.2. Etanercept(如 Enbrel)；adalimumab (如 Humira)；golimumab (如 Simponi)；abatacept (如 Orencia)；tocilizumab (如 Actemra)；tofacitinib (如 Xeljanz) (92/3/1、93/8/1、93/9/1、98/3/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>99/2/1、100/12/1、101/1/1、101/6/1、102/1/1、102/4/1、102/10/1、103/12/1)：</p> <p>成人治療部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限內科專科醫師且具有風濕病專科醫師證書者使用於類風濕關節炎病患。 2. 經事前審查核准後使用。 3. 申報時須檢附使用 DMARD 藥物六個月以上後之 DAS28 積分，各種 DMARD 藥物使用之種類、劑量、治療時間、副作用、及關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告等資料。 (99/2/1) 4. 初次使用 tocilizumab 時，劑量應從 4mg/kg 開始，治療第 12 週，評估 DAS28 積分，未達療效者(療效之定義：DAS28 總積分下降程度 \geq 1.2，或 DAS28 總積分 $<$ 3.2 者)，得調高劑量至 8mg/kg，繼續治療 12 週後，再評估 DAS28 總積分，必須下降程度 \geq 1.2，或 DAS28 總積分 $<$ 3.2，方可續用。 (102/10/1) 5. 使用半年後，每三個月需再申報一次；內含 DAS28 積分，使用藥物後之療效、副作用或併發症。(93/8/1、93/9/1) | <p>99/2/1、100/12/1、101/1/1、101/6/1、102/1/1、102/4/1、102/10/1、103/12/1)：</p> <p>成人治療部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限內科專科醫師且具有風濕病專科醫師證書者使用於類風濕關節炎病患。 2. 經事前審查核准後使用。 3. 申報時須檢附使用 DMARD 藥物六個月以上後之 DAS28 積分，各種 DMARD 藥物使用之種類、劑量、治療時間、副作用、及關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告等資料。 (99/2/1) 4. 初次使用 tocilizumab 時，劑量應從 4mg/kg 開始，治療第 12 週，評估 DAS28 積分，未達療效者(療效之定義：DAS28 總積分下降程度 \geq 1.2，或 DAS28 總積分 $<$ 3.2 者)，得調高劑量至 8mg/kg，繼續治療 12 週後，再評估 DAS28 總積分，必須下降程度 \geq 1.2，或 DAS28 總積分 $<$ 3.2，方可續用。 (102/10/1) 5. 使用半年後，每三個月需再申報一次；內含 DAS28 積分，使用藥物後之療效、副作用或併發症。(93/8/1、93/9/1) | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>6. 病患需同時符合下述 (1)(2)(3)項條件，方可使用；若有第(4)項情形，不得使用；若有第(5)項情形，需停止使用。</p> <p>(1)符合美國風濕病學院 (American College of Rheumatology)類風濕關節炎分類標準的診斷條件。 (102/10/1)</p> <p>(2)連續活動性的類風濕關節炎</p> <p>I. 28 處關節疾病活動度積分 (Disease Activity Score, DAS 28) 必須大於 5.1。</p> <p>II. 此項評分需連續二次，其時間相隔至少一個月以上，並附當時關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告為輔証。</p> <p>註 1：28 處關節部位記分如 (附表十三) 所示，其疾病活動度積分計算方式如下： $\text{DAS28} = 0.56 \times \sqrt{\text{TJC}} + 0.28 \times \sqrt{\text{SJC}} + 0.7 \times \ln\text{ESR} + 0.014 \times \text{GH}$</p> <p>註 2：TJC: 觸痛關節數，SJC: 腫脹關節數，ESR:</p> | <p>6. 病患需同時符合下述 (1)(2)(3)項條件，方可使用；若有第(4)項情形，不得使用；若有第(5)項情形，需停止使用。</p> <p>(1)符合美國風濕病學院 (American College of Rheumatology)類風濕關節炎分類標準的診斷條件。 (102/10/1)</p> <p>(2)連續活動性的類風濕關節炎</p> <p>I. 28 處關節疾病活動度積分 (Disease Activity Score, DAS 28) 必須大於 5.1。</p> <p>II. 此項評分需連續二次，其時間相隔至少一個月以上，並附當時關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告為輔証。</p> <p>註 1：28 處關節部位記分如 (附表十三) 所示，其疾病活動度積分計算方式如下： $\text{DAS28} = 0.56 \times \sqrt{\text{TJC}} + 0.28 \times \sqrt{\text{SJC}} + 0.7 \times \ln\text{ESR} + 0.014 \times \text{GH}$</p> <p>註 2：TJC: 觸痛關節數，SJC: 腫脹關節數，ESR:</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>紅血球沉降速率 (單位為 mm/h)，GH: 在 100 mm 圖像模 擬量表中所呈現 的整體健康狀態 (general health status)</p> <p>(3)標準疾病修飾抗風濕 病藥物 (Disease- Modifying Anti- Rheumatic Drugs, DMARD) 療法失敗： 病患曾經接受至少兩 種 DMARDs (methotrexate 為基 本藥物，另一藥物必 須包括肌肉注射之金 劑、 hydroxychloroquine 、sulfasalazine、d- penicillamine、 azathioprine、 leflunomide、 cyclosporine 中之任 何一種) 之充分治 療，而仍無明顯療 效。(93/8/1)</p> <p>I. 充分治療的定 義：(100/12/1)</p> <p>i. DMARDs 藥物治療 時間須符合下列 條件之一：</p> <p>(i)必須至少 6 個 月以上，而其 中至少 2 個月 必須達到 (附 表十四) 所示 標準目標劑量 (standard</p> | <p>紅血球沉降速率 (單位為 mm/h)，GH: 在 100 mm 圖像模 擬量表中所呈現 的整體健康狀態 (general health status)</p> <p>(3)標準疾病修飾抗風濕 病藥物 (Disease- Modifying Anti- Rheumatic Drugs, DMARD) 療法失敗： 病患曾經接受至少兩 種 DMARDs (methotrexate 為基 本藥物，另一藥物必 須包括肌肉注射之金 劑、 hydroxychloroquine 、sulfasalazine、d- penicillamine、 azathioprine、 leflunomide、 cyclosporine 中之任 何一種) 之充分治 療，而仍無明顯療 效。(93/8/1)</p> <p>I. 充分治療的定 義：(100/12/1)</p> <p>i. DMARDs 藥物治療 時間須符合下列 條件之一：</p> <p>(i)必須至少 6 個 月以上，而其 中至少 2 個月 必須達到 (附 表十四) 所示 標準目標劑量 (standard</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>target dose)。</p> <p>(ii)DMARDs 藥物合併使用 prednisolone 15 mg/day 治療，須至少 3 個月以上，而其中至少 2 個月 DMARDs 藥物必須達到（附表十四）所示標準目標劑量（standard target dose）。</p> <p>(100/12/1)</p> <p>ii. 若病患因 DMARDs 藥物毒性無法忍受，以致無法達到上項要求時，DMARDs 劑量仍需達（附表十四）所示治療劑量（therapeutic doses）連續 2 個月以上。</p> <p>II. 療效的定義： (93/8/1、98/3/1) DAS28 總積分下降程度大於等於 $(\geq)1.2$，或 DAS28 總積分小於 3.2 者。</p> <p>(4)需排除使用的情形 (93/9/1)</p> <p>應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括（以下未列</p> | <p>target dose)。</p> <p>(ii)DMARDs 藥物合併使用 prednisolone 15 mg/day 治療，須至少 3 個月以上，而其中至少 2 個月 DMARDs 藥物必須達到（附表十四）所示標準目標劑量（standard target dose）。</p> <p>(100/12/1)</p> <p>ii. 若病患因 DMARDs 藥物毒性無法忍受，以致無法達到上項要求時，DMARDs 劑量仍需達（附表十四）所示治療劑量（therapeutic doses）連續 2 個月以上。</p> <p>II. 療效的定義： (93/8/1、98/3/1) DAS28 總積分下降程度大於等於 $(\geq)1.2$，或 DAS28 總積分小於 3.2 者。</p> <p>(4)需排除使用的情形 (93/9/1)</p> <p>應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括（以下未列</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>者參照仿單所載)：</p> <p>I. 懷孕或正在授乳的婦女</p> <p>II. 活動性感染症之病患</p> <p>III. 具高度感染機會的病患，包括：</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。</p> <p>(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾有感染性關節炎者</p> <p>iv. 有人工關節感染，若該人工關節未除去前，不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染症</p> <p>vi. 具有留置導尿管者</p> <p>IV. 惡性腫瘤或癌前狀態之病患（但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤）</p> <p>V. 多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>(5) 需停止治療的情形 (93/8/1、93/9/1)</p> | <p>者參照仿單所載)：</p> <p>I. 懷孕或正在授乳的婦女</p> <p>II. 活動性感染症之病患</p> <p>III. 具高度感染機會的病患，包括：</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。</p> <p>(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾有感染性關節炎者</p> <p>iv. 有人工關節感染，若該人工關節未除去前，不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染症</p> <p>vi. 具有留置導尿管者</p> <p>IV. 惡性腫瘤或癌前狀態之病患（但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤）</p> <p>V. 多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>(5) 需停止治療的情形 (93/8/1、93/9/1)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>I 療效不彰</p> <p>II 不良事件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴重毒性</p> <p>iii. 懷孕（暫時停藥即可）</p> <p>iv. 嚴重的間發性感 染症（暫時停藥 即可）</p> <p>7. 轉用其他成分生物製劑 之條件：</p> <p>(1) 使用生物製劑治療後 有療效，但因方便性 欲改用給藥頻率較少 者或無法忍受副作用 者，可轉用相同藥理 機轉之生物製劑。</p> <p>(2) 使用生物製劑治療後 療效不彰，不可轉用相 同藥理機轉之其他成分 生物製劑。</p> <p>8. 減量及暫緩續用之相關 規定：(102/4/1)</p> <p>(1) 減量時機：</p> <p>使用 2 年後符合以下 條件之一者：</p> <p>I. DAS28 總積分 \leq 3.2。</p> <p>II. ESR \leq 25mm/h 且 CRP (C-reactive protein) \leq 1mg/dL。</p> <p>(2) 減量方式：</p> <p>病患使用生物製劑 2 年後，申請續用之事 前審查時，應依據患 者個別狀況提出符合</p> | <p>如果發生下列現象應 停止治療：</p> <p>I 療效不彰</p> <p>II 不良事件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴 重毒性</p> <p>iii. 懷孕（暫時停 藥即可）</p> <p>iv. 嚴重的間發性感 染症（暫時停藥 即可）</p> <p>7. 轉用其他成分生物製劑 之條件：</p> <p>(1) 使用生物製劑治療後 有療效，但因方便性 欲改用給藥頻率較少 者或無法忍受副作用 者，可轉用相同藥理 機轉之生物製劑。</p> <p>(2) 使用生物製劑治療後 療效不彰，不可轉用相 同藥理機轉之其他成分 生物製劑。</p> <p>8. 減量及暫緩續用之相關 規定：(102/4/1)</p> <p>(1) 減量時機：</p> <p>使用 2 年後符合以下 條件之一者：</p> <p>I. DAS28 總積分 \leq 3.2。</p> <p>II. ESR \leq 25mm/h 且 CRP (C-reactive protein) \leq 1mg/dL。</p> <p>(2) 減量方式：</p> <p>病患使用生物製劑 2 年後，申請續用之事 前審查時，應依據患 者個別狀況提出符合</p> | |
|--|---|--|

醫理之治療計畫，並敘明開始減量至1年後暫緩續用之減量方式。減量方式可為減少每次使用劑量或延長給藥間隔。

(3) 減量期間若符合以下所有條件，得申請回復減量前之使用量，下次再評估減量之時機為1年後：

I. 與減量前比較，DAS28 總積分上升程度 > 1.2 。

II. ESR $> 25\text{mm/h}$ 。

III. 與減量前比較，ESR 上升程度 $> 25\%$ 。

(4) 因使用一種生物製劑治療後療效不彰，而轉用另一種不同藥理機轉之生物製劑，以轉用後者之起始日重新計算2年後開始減量之時機。但因方便性考量或無法忍受副作用而轉用相同藥理機轉之生物製劑，轉用前後所使用生物製劑之期間均應計入。

(5) 暫緩續用時機：開始減量1年後暫緩續用。

(6) 至101年12月31日止，已申請使用逾2年者，於下次申報時即須依規定評估是否需減量。

9. 暫緩續用後若疾病再復發，重新申請使用必須

醫理之治療計畫，並敘明開始減量至1年後暫緩續用之減量方式。減量方式可為減少每次使用劑量或延長給藥間隔。

(3) 減量期間若符合以下所有條件，得申請回復減量前之使用量，下次再評估減量之時機為1年後：

I. 與減量前比較，DAS28 總積分上升程度 > 1.2 。

II. ESR $> 25\text{mm/h}$ 。

III. 與減量前比較，ESR 上升程度 $> 25\%$ 。

(4) 因使用一種生物製劑治療後療效不彰，而轉用另一種不同藥理機轉之生物製劑，以轉用後者之起始日重新計算2年後開始減量之時機。但因方便性考量或無法忍受副作用而轉用相同藥理機轉之生物製劑，轉用前後所使用生物製劑之期間均應計入。

(5) 暫緩續用時機：開始減量1年後暫緩續用。

(6) 至101年12月31日止，已申請使用逾2年者，於下次申報時即須依規定評估是否需減量。

9. 暫緩續用後若疾病再復發，重新申請使用必須

| | | |
|---|---|--|
| <p>符合以下條件： (102/1/1)</p> <p>(1)生物製劑暫緩續用後，必須持續接受至少 2 種 DMARDs 藥物之治療 (methotrexate 為基本藥物，另一藥物必須包括肌肉注射之金劑、hydroxychloroquine、sulfasalazine、d-penicillamine、azathioprine、leflunomide、cyclosporine 中之任何一種)，其中 methotrexate 至少 2 個月以上必須達到當初申請生物製劑時所使用之劑量。</p> <p>(2)DAS28 總積分上升程度 > 1.2。(102/4/1)</p> <p>◎附表十三：全民健康保險類風濕關節炎病患 28 處關節疾病活動度 (Disease Activity Score, DAS 28) 評估表</p> <p>◎附表十四：全民健康保險疾病修飾抗風濕病藥物 (DMARDs) 之標準目標劑量暨治療劑量表</p> <p>◎附表十五：全民健康保險類風濕關節炎使用 etanercept/ adalimumab/golimumab/ abatacept/tocilizumab /tofacitinib 申請表</p> <p>8.2.4.3. Adalimumab (如 Humira) ; etanercept (如 Enbrel) ;</p> | <p>符合以下條件： (102/1/1)</p> <p>(1)生物製劑暫緩續用後，必須持續接受至少 2 種 DMARDs 藥物之治療 (methotrexate 為基本藥物，另一藥物必須包括肌肉注射之金劑、hydroxychloroquine、sulfasalazine、d-penicillamine、azathioprine、leflunomide、cyclosporine 中之任何一種)，其中 methotrexate 至少 2 個月以上必須達到當初申請生物製劑時所使用之劑量。</p> <p>(2)DAS28 總積分上升程度 > 1.2。(102/4/1)</p> <p>◎附表十三：全民健康保險類風濕關節炎病患 28 處關節疾病活動度 (Disease Activity Score, DAS 28) 評估表</p> <p>◎附表十四：全民健康保險疾病修飾抗風濕病藥物 (DMARDs) 之標準目標劑量暨治療劑量表</p> <p>◎附表十五：全民健康保險類風濕關節炎使用 etanercept/ adalimumab/golimumab/ abatacept/tocilizumab /tofacitinib 申請表</p> <p>8.2.4.3. Adalimumab (如 Humira) ; etanercept (如 Enbrel) ;</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>golimumab (如 Simponi) (98/8/1、98/11/1、101/1/1、102/1/1)：用於僵直性脊椎炎治療部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者處方。 2. 需經事前審查核准後使用。 3. 需符合下列所有條件： <ol style="list-style-type: none"> (1) 年齡 18 歲以上 (2) HLA B27 陽性 (3) X 光(plain X Ray)檢查需有薦腸關節炎：雙側性二級以上，或單側性三級以上、附有報告影印或 X 光影像光碟。 (4) 臨床症狀及身體檢查，下列三條件至少需符合二項 <ol style="list-style-type: none"> i. 下背痛及晨間僵硬的症狀持續 3 個月以上，這些症狀無法因休息而緩解，但會隨運動改善。 ii. 腰椎活動受到限制，有確切體檢發現者。 iii. 胸部擴展受到限制，有確切體檢發現者。 (5) 所有的病患都必須曾經使用過至少 2 種 (NSAIDs) 進行充分的治療，但療效不彰。充分治療的定義為：使用最高建議劑量或最高耐受劑量的 | <p>golimumab (如 Simponi) (98/8/1、98/11/1、101/1/1、102/1/1)：用於僵直性脊椎炎治療部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者處方。 2. 需經事前審查核准後使用。 3. 需符合下列所有條件： <ol style="list-style-type: none"> (1) 年齡 18 歲以上 (2) HLA B27 陽性 (3) X 光(plain X Ray)檢查需有薦腸關節炎：雙側性二級以上，或單側性三級以上、附有報告影印或 X 光影像光碟。 (4) 臨床症狀及身體檢查，下列三條件至少需符合二項 <ol style="list-style-type: none"> i. 下背痛及晨間僵硬的症狀持續 3 個月以上，這些症狀無法因休息而緩解，但會隨運動改善。 ii. 腰椎活動受到限制，有確切體檢發現者。 iii. 胸部擴展受到限制，有確切體檢發現者。 (5) 所有的病患都必須曾經使用過至少 2 種 (NSAIDs) 進行充分的治療，但療效不彰。充分治療的定義為：使用最高建議劑量或最高耐受劑量的 | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>NSAID 抗發炎藥物，在同一家醫院連續治療三個月以上，且每種 NSAID 至少使用四週以上，除非出現毒性而停藥，需以附表二十一之二為根據記錄 NSAID 之毒性送審。</p> <p>(6) 周邊關節炎患者必須曾經同時使用 NSAIDs 和 sulfasalazine 進行充分的治療，sulfasalazine 需以 2 g/day 之標準治療 4 個月或以上，除非有相關毒性發生而停藥，並有適當病歷記載者。</p> <p>(7) 必須附有(1) 風濕或免疫專科且具有保險人核定復健處方權之醫師所開立之運動衛教證明書和(2)病患自身在家運動狀況聲明書。</p> <p>(8) 活動性疾病持續四週以上。(需連續二次檢查 BASDAI \geq 6、ESR $>$ 28 mm/1 hr 暨 CRP $>$ 1 mg/dL，且二次檢查之間隔需經過至少 4 週以上之充分治療)</p> <p>(9) 病患需填具藥物使用同意書以示瞭解本藥物之適應症、禁忌及副作用。</p> <p>4. 療效評估與繼續使用： (1) 治療 12 週後評估</p> | <p>NSAID 抗發炎藥物，在同一家醫院連續治療三個月以上，且每種 NSAID 至少使用四週以上，除非出現毒性而停藥，需以附表二十一之二為根據記錄 NSAID 之毒性送審。</p> <p>(6) 周邊關節炎患者必須曾經同時使用 NSAIDs 和 sulfasalazine 進行充分的治療，sulfasalazine 需以 2 g/day 之標準治療 4 個月或以上，除非有相關毒性發生而停藥，並有適當病歷記載者。</p> <p>(7) 必須附有(1) 風濕或免疫專科且具有保險人核定復健處方權之醫師所開立之運動衛教證明書和(2)病患自身在家運動狀況聲明書。</p> <p>(8) 活動性疾病持續四週以上。(需連續二次檢查 BASDAI \geq 6、ESR $>$ 28 mm/1 hr 暨 CRP $>$ 1 mg/dL，且二次檢查之間隔需經過至少 4 週以上之充分治療)</p> <p>(9) 病患需填具藥物使用同意書以示瞭解本藥物之適應症、禁忌及副作用。</p> <p>4. 療效評估與繼續使用： (1) 治療 12 週後評估</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>BASDAI：與使用前比較, 出現 50%以上的進步或減少 2 分以上, 方得繼續使用。</p> <p>(2)繼續使用者, 需每 12 週評估一次。</p> <p>5. 需排除使用的情形 應參照藥物仿單, 重要之排除使用狀況包括(以下未列者參照仿單所載):</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女</p> <p>(2)活動性感染症之病患</p> <p>(3)具高度感染機會的病患, 包括:</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者, 申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾有感染性關節炎者</p> <p>iv. 曾有人工關節感染, 若該人工關節未去除前, 不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染症</p> <p>vi. 具有留置導尿管者</p> <p>(4)惡性腫瘤或癌前狀態之病患 (但不包括已</p> | <p>BASDAI：與使用前比較, 出現 50%以上的進步或減少 2 分以上, 方得繼續使用。</p> <p>(2)繼續使用者, 需每 12 週評估一次。</p> <p>5. 需排除使用的情形 應參照藥物仿單, 重要之排除使用狀況包括(以下未列者參照仿單所載):</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女</p> <p>(2)活動性感染症之病患</p> <p>(3)具高度感染機會的病患, 包括:</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者, 申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾有感染性關節炎者</p> <p>iv. 曾有人工關節感染, 若該人工關節未去除前, 不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染症</p> <p>vi. 具有留置導尿管者</p> <p>(4)惡性腫瘤或癌前狀態之病患 (但不包括已</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>經接受過充分治療達10年以上的惡性腫瘤)</p> <p>(5)多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者</p> <p>(2)不良事件，與藥物之使用有關或無關的事件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴重毒性</p> <p>iii. 懷孕(暫時停藥即可)</p> <p>iv. 嚴重的間發性感 染症(依嚴重性判斷可選擇暫時停藥即可)</p> <p>◎附表二十一之一：全民健康保險僵直性脊椎炎使用 adalimumab/etanercept/golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十一之二：NSAID 藥物副作用</p> <p>8.2.4.4. Adalimumab (如 Humira)； etanercept (如 Enbrel)； golimumab (如 Simponi)； <u>ustekinumab (如 Stelara)</u> (98/8/1、98/11/1、99/1/1、102/1/1、102/2/1、<u>105/10/1</u>)：用於活動性乾癬性關節炎—乾癬性周</p> | <p>經接受過充分治療達10年以上的惡性腫瘤)</p> <p>(5)多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者</p> <p>(2)不良事件，與藥物之使用有關或無關的事件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴重毒性</p> <p>iii. 懷孕(暫時停藥即可)</p> <p>iv. 嚴重的間發性感 染症(依嚴重性判斷可選擇暫時停藥即可)</p> <p>◎附表二十一之一：全民健康保險僵直性脊椎炎使用 adalimumab/etanercept/golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十一之二：NSAID 藥物副作用</p> <p>8.2.4.4. Adalimumab (如 Humira)； etanercept (如 Enbrel)； golimumab (如 Simponi) (98/8/1、98/11/1、99/1/1、102/1/1、102/2/1)：用於活動性乾癬性關節炎—乾癬性周邊關節炎治療部分</p> | |
|---|---|--|

邊關節炎治療部分

1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者，或皮膚科專科醫師處方。(99/1/ 1)
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 需符合下列所有條件：
 - (1) 經內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者診斷為乾癬性關節炎之患者。
 - (2) 曾經皮膚科醫師診斷為乾癬患者，或經皮膚切片診斷為乾癬患者。
 - (3) 三個或是三個以上的疼痛關節及三個或三個以上的腫脹關節，且至少間隔一個月或一個月以上之連續兩次評估均符合上述條件。(需附關節腫脹相關 X-光片或照片輔証)。
 - (4) 應先使用非類固醇類消炎止痛劑(NSAID)及疾病修飾治療藥物(DMARDs)，且必須曾使用過至少 2 種疾病修飾治療藥物(DMARDs)進行充分的治療，但療效不彰。(附表二十二之二)
 - i. 疾病修飾治療藥物〔DMARDs 包括下列四種：
Sulfasalazine、
Methotrexate
(MTX)、

1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者，或皮膚科專科醫師處方。(99/1/ 1)
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 需符合下列所有條件：
 - (1) 經內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者診斷為乾癬性關節炎之患者。
 - (2) 曾經皮膚科醫師診斷為乾癬患者，或經皮膚切片診斷為乾癬患者。
 - (3) 三個或是三個以上的疼痛關節及三個或三個以上的腫脹關節，且至少間隔一個月或一個月以上之連續兩次評估均符合上述條件。(需附關節腫脹相關 X-光片或照片輔証)。
 - (4) 應先使用非類固醇類消炎止痛劑(NSAID)及疾病修飾治療藥物(DMARDs)，且必須曾使用過至少 2 種疾病修飾治療藥物(DMARDs)進行充分的治療，但療效不彰。(附表二十二之二)
 - i. 疾病修飾治療藥物〔DMARDs 包括下列四種：
Sulfasalazine、
Methotrexate
(MTX)、

| | | |
|--|--|--|
| <p>Cyclosporine、Leflunomide〕，治療至少六個月，且至少有兩個月都達標準目標劑量（除非有明顯副作用或毒性反應），仍然未達療效者。</p> <p>ii. 疾病修飾治療藥物中 Sulfasalazine、Methotrexate (MTX)、Cyclosporine 為第一線藥物，Leflunomide 為第二線藥物，第一線疾病修飾類藥物治療無效，應先經 Leflunomide 治療 3 個月無效後，方可使用腫瘤壞死因子抑制劑作為第三線治療。</p> <p>iii. 標準治療失敗之定義：經過充分使用以上藥物治療又給予規定劑量，且至少先後使用或併用兩種疾病修飾類藥物(DMARDs)仍無法使病情緩解，即符合下列情況之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 治療療程至少有六個月，且至少有兩個月都達標準目標劑量(除非有明顯副作用或毒 | <p>Cyclosporine、Leflunomide〕，治療至少六個月，且至少有兩個月都達標準目標劑量（除非有明顯副作用或毒性反應），仍然未達療效者。</p> <p>ii. 疾病修飾治療藥物中 Sulfasalazine、Methotrexate (MTX)、Cyclosporine 為第一線藥物，Leflunomide 為第二線藥物，第一線疾病修飾類藥物治療無效，應先經 Leflunomide 治療 3 個月無效後，方可使用腫瘤壞死因子抑制劑作為第三線治療。</p> <p>iii. 標準治療失敗之定義：經過充分使用以上藥物治療又給予規定劑量，且至少先後使用或併用兩種疾病修飾類藥物(DMARDs)仍無法使病情緩解，即符合下列情況之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 治療療程至少有六個月，且至少有兩個月都達標準目標劑量(除非有明顯副作用或毒 | |
|--|--|--|

性反應)仍然未達療效者。

- 治療不到六個月，但是病患無法忍受藥物副作用或是藥物毒性而停藥者，但需說明藥物之何種毒性或副作用。
- 治療大於兩個月，且因無法忍受藥物副作用或是藥物毒性而停止療程，其中至少有兩個月需達有效治療劑量，且需說明藥物之何種毒性或副作用。

(5)Ustekinumab 限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子(如 etanercept、adalimumab 或 golimumab 等)治療，但未達療效，或無法耐受的活動性乾癬性關節炎。申請初次治療者，應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子之用藥結果，包括種類、劑量、治療前後 PsARC 評估及副作用報告等資料，並宜記錄患者 HBsAg 及 Anti-HCV 資料(若 HBsAg 檢驗為陽性，宜加作 HBV DNA)。

性反應)仍然未達療效者。

- 治療不到六個月，但是病患無法忍受藥物副作用或是藥物毒性而停藥者，但需說明藥物之何種毒性或副作用。
- 治療大於兩個月，且因無法忍受藥物副作用或是藥物毒性而停止療程，其中至少有兩個月需達有效治療劑量，且需說明藥物之何種毒性或副作用。

(105/10/1)

4. 療效評估與繼續使用：

(105/10/1)

- (1) 療效定義：治療 12 週(ustekinumab 初次治療則為 24 週)後，評估乾癬關節炎反應標準(PsARC, Psoriatic Arthritis Response Criteria)，其標準為下列四項中至少有二項較原基礎值改善，且其中一項需為疼痛關節或腫脹關節的關節總數，且下述各種指標不得有任一項惡化，方得繼續使用。
(附表二十二之三)

- i. 疼痛關節的關節總數：改善的定義為關節總數減少 30% 或以上，惡化定義為總數增加 30% 或以上。
- ii. 腫脹關節的關節總數：改善的定義為關節總數減少 30% 或以上，惡化定義為總數增加 30% 或以上。
- iii. 醫師的整體評估 (0-5 分)：改善定義為減少 1 分，惡化定義為增加 1 分。
- iv. 病患的整體評估 (0-5 分)：改善定義為減少 1 分，惡化定義為增加 1

4. 療效評估與繼續使用：

(1) 療效定義：治療 12

- 週後，評估乾癬關節炎反應標準(PsARC, Psoriatic Arthritis Response Criteria)，其標準為下列四項中至少有二項較原基礎值改善，且其中一項需為疼痛關節或腫脹關節的關節總數，且下述各種指標不得有任一項惡化，方得繼續使用。
(附表二十二之三)

- i. 疼痛關節的關節總數：改善的定義為關節總數減少 30% 或以上，惡化定義為總數增加 30% 或以上。
- ii. 腫脹關節的關節總數：改善的定義為關節總數減少 30% 或以上，惡化定義為總數增加 30% 或以上。
- iii. 醫師的整體評估 (0-5 分)：改善定義為減少 1 分，惡化定義為增加 1 分。
- iv. 病患的整體評估 (0-5 分)：改善定義為減少 1 分，惡化定義為增加 1

分。

(2)初次申請

ustekinumab 以 3 劑
(初次、4 週後及 16
週時投予每劑 45mg)
為限，且於 24 週時，
需先行評估，至少有
PsARC 療效方可申請
續用，續用以 45mg
q12w 為限。

(105/10/1)

(3)繼續使用者，需每 12
週評估一次，再次提
出申請續用。

5. 需排除使用的情形：
應參照藥物仿單，重要
之排除使用狀況包括
〔以下未列者參照仿單
所載〕：

- (1)懷孕或正在授乳婦女
- (2)活動性感染症之病患
- (3)具高度感染機會之病患

i. 慢性腿部潰瘍之病患

ii. 未經完整治療之
結核病的病患
(包括潛伏結核
感染治療未達四
週者，申請時應
檢附潛伏結核感
染篩檢紀錄及治
療紀錄供審
查)。(102/1/1)

iii. 過去 12 個月內
曾罹患感染性關節
炎者

iv. 曾有人工關節感
染，若該人工關節
未去除前，不可使

分。

(2)繼續使用者，需每 12
週評估一次，再次提
出申請續用。

5. 需排除使用的情形：
應參照藥物仿單，重要
之排除使用狀況包括
〔以下未列者參照仿單
所載〕：

- (1)懷孕或正在授乳婦女
- (2)活動性感染症之病患
- (3)具高度感染機會之病患

i. 慢性腿部潰瘍之病患

ii. 未經完整治療之
結核病的病患
(包括潛伏結核
感染治療未達四
週者，申請時應
檢附潛伏結核感
染篩檢紀錄及治
療紀錄供審
查)。(102/1/1)

iii. 過去 12 個月內
曾罹患感染性關節
炎者

iv. 曾有人工關節感
染，若該人工關節
未去除前，不可使

| | | |
|--|---|--|
| <p>用</p> <p>v. 頑固性或復發性的 胸腔感染疾病</p> <p>vi. 具有留置導尿管 之情形</p> <p>(4) 惡性腫瘤或癌前狀態 之病患〔但不包括已 經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫 瘤〕</p> <p>(5) 多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停 止治療：</p> <p>(1) 療效不彰：療效評估 未達繼續使用標準者</p> <p>(2) 不良事件：與藥物之 使用有關或無關的事 件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴 重毒性</p> <p>iii. 懷孕〔暫時停藥 即可〕</p> <p>iv. 嚴重感染症〔依 嚴重性判斷可選擇 暫時停藥〕</p> <p>◎附表二十二之一：全民 健康保險乾癬性周邊關 節炎使用 Adalimumab/Etanercept /Golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十二之二：乾癬 性週邊關節炎使用 DMARDs 標準目標劑量及 有效治療劑量的定義</p> <p>◎附表二十二之三：乾癬</p> | <p>用</p> <p>v. 頑固性或復發性的 胸腔感染疾病</p> <p>vi. 具有留置導尿管 之情形</p> <p>(4) 惡性腫瘤或癌前狀態 之病患〔但不包括已 經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫 瘤〕</p> <p>(5) 多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停 止治療：</p> <p>(1) 療效不彰：療效評估 未達繼續使用標準者</p> <p>(2) 不良事件：與藥物之 使用有關或無關的事 件，包括：</p> <p>i. 惡性腫瘤</p> <p>ii. 該藥物引起的嚴 重毒性</p> <p>iii. 懷孕〔暫時停藥 即可〕</p> <p>iv. 嚴重的間發性感 染症〔依嚴重性判 斷可選擇暫時停 藥〕</p> <p>◎附表二十二之一：全民 健康保險乾癬性周邊關 節炎使用 Adalimumab/Etanercept /Golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十二之二：乾癬 性週邊關節炎使用 DMARDs 標準目標劑量及 有效治療劑量的定義</p> <p>◎附表二十二之三：乾癬</p> | |
|--|---|--|

性關節炎評估表

◎附表二十二之六：全民
健康保險乾癬性周邊關
節炎使用 Ustekinumab
申請表

8.2.4.5. Adalimumab (如 Humira) ; etanercept (如 Enbrel) ; golimumab (如 Simponi) (98/8/1、98/11/1、99/1/1、102/1/1、102/2/1)：用於活動性乾癬性關節炎—乾癬性脊椎病變治療部分

1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者，或皮膚科專科醫師處方。(99/1/ 1)
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 需符合下列所有條件：
 - (1) 經內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者診斷為乾癬性關節炎之患者。
 - (2) 曾經皮膚科醫師診斷為乾癬患者，或經皮膚切片診斷為乾癬患者。
 - (3) 下列三項條件至少需符合二項：
 - i. 下背痛及晨間僵硬的症狀持續 3 個月以上，這些症狀無法因休息而緩解，但會隨運動改善。
 - ii. 腰椎前屈活動受限。
 - iii. 胸廓擴張受限。
- (4) X光(plain X ray)檢

性關節炎評估表

8.2.4.5. Adalimumab (如 Humira) ; etanercept (如 Enbrel) ; golimumab (如 Simponi) (98/8/1、98/11/1、99/1/1、102/1/1、102/2/1)：用於活動性乾癬性關節炎—乾癬性脊椎病變治療部分

1. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者，或皮膚科專科醫師處方。(99/1/ 1)
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 需符合下列所有條件：
 - (1) 經內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者診斷為乾癬性關節炎之患者。
 - (2) 曾經皮膚科醫師診斷為乾癬患者，或經皮膚切片診斷為乾癬患者。
 - (3) 下列三項條件至少需符合二項：
 - i. 下背痛及晨間僵硬的症狀持續 3 個月以上，這些症狀無法因休息而緩解，但會隨運動改善。
 - ii. 腰椎前屈活動受限。
 - iii. 胸廓擴張受限。
- (4) X光(plain X ray)檢

查需有薦腸關節炎：單側性二級以上、附有報告影印及 X 光影像光碟。

(5) 病患必須曾使用過至少 2 種非類固醇類消炎止痛劑(NSAIDs)進行充分的治療，但療效不彰。充分治療的定義為：使用最高建議劑量或最高耐受劑量的 NSAID 抗發炎藥物，在同一家醫院連續治療三個月以上，且每種 NSAID 至少使用四週以上，除非出現毒性而停藥，需以附表二十二之五為根據，記錄 NSAID 之毒性送審。

(6) 活動性疾病持續四週以上。(需連續二次檢查 BASDAI \geq 6、ESR $>$ 28 mm/1 hr 及 CRP $>$ 1 mg/dL，且二次檢查之間隔需經過至少 4 週以上充分治療)

4. 療效評估與繼續使用：

(1) 初次使用者治療 12 週評估 BASDAI：與使用前比較，出現 50% 以上的進步或減少 2 分以上，方得繼續使用。

(2) 繼續使用者，需每 12 週評估一次，再次提出申請續用。

5. 需排除使用的情形：

應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括

查需有薦腸關節炎：單側性二級以上、附有報告影印及 X 光影像光碟。

(5) 病患必須曾使用過至少 2 種非類固醇類消炎止痛劑(NSAIDs)進行充分的治療，但療效不彰。充分治療的定義為：使用最高建議劑量或最高耐受劑量的 NSAID 抗發炎藥物，在同一家醫院連續治療三個月以上，且每種 NSAID 至少使用四週以上，除非出現毒性而停藥，需以附表二十二之五為根據，記錄 NSAID 之毒性送審。

(6) 活動性疾病持續四週以上。(需連續二次檢查 BASDAI \geq 6、ESR $>$ 28 mm/1 hr 及 CRP $>$ 1 mg/dL，且二次檢查之間隔需經過至少 4 週以上充分治療)

4. 療效評估與繼續使用：

(1) 初次使用者治療 12 週評估 BASDAI：與使用前比較，出現 50% 以上的進步或減少 2 分以上，方得繼續使用。

(2) 繼續使用者，需每 12 週評估一次，再次提出申請續用。

5. 需排除使用的情形：

應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括

| | | |
|--|--|--|
| <p>〔以下未列者參照仿單所載〕：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳婦女</p> <p>(2)活動性感染症之病患</p> <p>(3)具高度感染機會之病患</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾罹患感染性關節炎者</p> <p>iv. 曾有人工關節感染，若該人工關節未去除前，不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染疾病</p> <p>vi. 具有留置導尿管之情形</p> <p>(4)惡性腫瘤或癌前狀態之病患〔但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤〕</p> <p>(5)多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)療效不彰：療效評估</p> | <p>〔以下未列者參照仿單所載〕：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳婦女</p> <p>(2)活動性感染症之病患</p> <p>(3)具高度感染機會之病患</p> <p>i. 慢性腿部潰瘍之病患</p> <p>ii. 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>iii. 過去 12 個月內曾罹患感染性關節炎者</p> <p>iv. 曾有人工關節感染，若該人工關節未去除前，不可使用</p> <p>v. 頑固性或復發性的胸腔感染疾病</p> <p>vi. 具有留置導尿管之情形</p> <p>(4)惡性腫瘤或癌前狀態之病患〔但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤〕</p> <p>(5)多發性硬化症 (multiple sclerosis)</p> <p>6. 需停止治療的情形 如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)療效不彰：療效評估</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>未達繼續使用標準者</p> <p>(2)不良事件：與藥物之使用有關或無關的事件，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 惡性腫瘤 ii. 該藥物引起的嚴重毒性 iii. 懷孕〔暫時停藥即可〕 iv. 嚴重的間發性感 染症〔依嚴重性判 斷可選擇暫時停 藥〕 <p>◎附表二十二之四：全民健康保險乾癬性脊椎病變使用 Adalimumab/Etanercept/Golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十二之五：NSAID 藥物副作用</p> <p>8.2.4.6. Etanercept (如 Enbrel)；adalimumab (如 Humira)；ustekinumab (如 Stelara)、<u>secukinumab (如 Cosentyx)</u> (98/11/1、100/7/1、101/5/1、101/12/1、102/1/1、104/4/1、<u>105/9/1</u>)：用於乾癬治療部分</p> <p>1. 給付條件：限用於經照光治療及其他系統性治療無效，或因醫療因素而無法接受其他系統性治療之全身慢性中、重度之乾癬或頑固之掌蹠性乾癬，且影響功能之患者。</p> <p>(1)所稱”慢性”，指病</p> | <p>未達繼續使用標準者</p> <p>(2)不良事件：與藥物之使用有關或無關的事件，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 惡性腫瘤 ii. 該藥物引起的嚴重毒性 iii. 懷孕〔暫時停藥即可〕 iv. 嚴重的間發性感 染症〔依嚴重性判 斷可選擇暫時停 藥〕 <p>◎附表二十二之四：全民健康保險乾癬性脊椎病變使用 Adalimumab/Etanercept/Golimumab 申請表</p> <p>◎附表二十二之五：NSAID 藥物副作用</p> <p>8.2.4.6. Etanercept (如 Enbrel)；adalimumab (如 Humira)；ustekinumab (如 Stelara) (98/11/1、100/7/1、101/5/1、101/12/1、102/1/1、104/4/1)：用於乾癬治療部分</p> <p>1. 給付條件：限用於經照光治療及其他系統性治療無效，或因醫療因素而無法接受其他系統性治療之全身慢性中、重度之乾癬或頑固之掌蹠性乾癬，且影響功能之患者。</p> <p>(1)所稱”慢性”，指病</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>灶持續至少 6 個月，且 Psoriasis area severity index (PASI) ≥ 10 (不適用 PASI 測定如膿疱性乾癬，則以範圍 $\geq 10\%$ 體表面積)。(附表二十四之二)</p> <p>(2)頑固之掌蹠性乾癬：指非膿疱性掌蹠廣泛性角化，嚴重影響行走或日常作習，申請時需附照片以供審查。照片應包括前、後、左、右至少四張，並視需要加附頭部、掌、蹠照片。</p> <p>(3)慢性紅皮症乾癬：範圍 $\geq 75\%$體表面積，病史超過 1 年，以 cyclosporin 足量 (5mg/kg/d，除非有明顯不良反應) 治療 6 個月以上，停藥未滿 3 個月即復發到 PASI > 10 或體表面積 > 30 (需經皮膚科醫師評估)，可不經照光治療，只需 methotrexate 及 acitretin 治療無效後直接申請。 (101/12/1)</p> <p>(4)所稱治療無效，指治療後嚴重度仍符合上列第(1)及第(2)點情況，或 PASI 或體表面積改善 $< 50\%$。 (101/5/1)</p> <p>i. 治療必須包括足量</p> | <p>灶持續至少 6 個月，且 Psoriasis area severity index (PASI) ≥ 10 (不適用 PASI 測定如膿疱性乾癬，則以範圍 $\geq 10\%$ 體表面積)。(附表二十四之二)</p> <p>(2)頑固之掌蹠性乾癬：指非膿疱性掌蹠廣泛性角化，嚴重影響行走或日常作習，申請時需附照片以供審查。照片應包括前、後、左、右至少四張，並視需要加附頭部、掌、蹠照片。</p> <p>(3)慢性紅皮症乾癬：範圍 $\geq 75\%$體表面積，病史超過 1 年，以 cyclosporin 足量 (5mg/kg/d，除非有明顯不良反應) 治療 6 個月以上，停藥未滿 3 個月即復發到 PASI > 10 或體表面積 > 30 (需經皮膚科醫師評估)，可不經照光治療，只需 methotrexate 及 acitretin 治療無效後直接申請。 (101/12/1)</p> <p>(4)所稱治療無效，指治療後嚴重度仍符合上列第(1)及第(2)點情況，或 PASI 或體表面積改善 $< 50\%$。 (101/5/1)</p> <p>i. 治療必須包括足量</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>之照光治療及包括以下兩種系統性治療之至少兩種，包括</p> <p>methotrexate、 acitretin、 cyclosporin。 (101/12/1)</p> <p>ii. 治療需至少使用 3 個月，但育齡女性，得不經 acitretin 使用。</p> <p>iii. 照光治療應依學理，如光化療法 (PUVA) 及窄頻 UVB(nb-UVB) 必須每週至少 2 次，寬頻 UVB 併用焦油每週至少 3 次，並依學理逐漸增加至有效可忍受劑量。申請時必須附病歷影印及詳細照光劑量紀錄。</p> <p>iv. Methotrexate 合理劑量需達每週 15mg, cyclosporin 為 2.5-5 mg/kg/d, acitretin 為 0.3-1 mg/kg/d。但若因為藥物毒性無法耐受，使用劑量可酌情降低。</p> <p>(5) 所稱無法接受治療：</p> <p>i. Methotrexate：指因肝功能異常或切片第三期 a 異常，經 6 個月後切片仍無改善，或第三期</p> | <p>之照光治療及包括以下兩種系統性治療之至少兩種，包括</p> <p>methotrexate、 acitretin、 cyclosporin。 (101/12/1)</p> <p>ii. 治療需至少使用 3 個月，但育齡女性，得不經 acitretin 使用。</p> <p>iii. 照光治療應依學理，如光化療法 (PUVA) 及窄頻 UVB(nb-UVB) 必須每週至少 2 次，寬頻 UVB 併用焦油每週至少 3 次，並依學理逐漸增加至有效可忍受劑量。申請時必須附病歷影印及詳細照光劑量紀錄。</p> <p>iv. Methotrexate 合理劑量需達每週 15mg, cyclosporin 為 2.5-5 mg/kg/d, acitretin 為 0.3-1 mg/kg/d。但若因為藥物毒性無法耐受，使用劑量可酌情降低。</p> <p>(5) 所稱無法接受治療：</p> <p>i. Methotrexate：指因肝功能異常或切片第三期 a 異常，經 6 個月後切片仍無改善，或第三期</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>b 以上之肝切片異常，病毒性肝炎帶原或腎功能異常而無法使用 methotrexate 治療者。</p> <p>ii. Acitretin：指有明顯肝功能異常、高血脂無法有效控制，或 cyclosporin 有效但停藥後迅速復發，已持續使用超用 1 年，或已產生腎毒性經減量後無法有效控制者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1) 初次申請時，以 6 個月為 1 個療程，持續使用時每 6 個月需再申報一次，且應於期滿前 1 個月提出。 (101/12/1)</p> <p>(2) 紅皮症乾癬病患以 6 個月為限，於 6 個月療程結束後，應回復使用 cyclosporin，除非產生腎功能異常 (Creatinine 基礎值上升 $\geq 30\%$)，或其他無法有效控制之副作用，減藥後乾癬仍無法有效控制。 (101/12/1)</p> <p>(3) Etanercept 初期 3 個月可使用 50mg biw，之後則為 25mg biw，且於 12 週時，需先行評估，至少有 PASI25</p> | <p>b 以上之肝切片異常，病毒性肝炎帶原或腎功能異常而無法使用 methotrexate 治療者。</p> <p>ii. Acitretin：指有明顯肝功能異常、高血脂無法有效控制，或 cyclosporin 有效但停藥後迅速復發，已持續使用超用 1 年，或已產生腎毒性經減量後無法有效控制者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1) 初次申請時，以 6 個月為 1 個療程，持續使用時每 6 個月需再申報一次，且應於期滿前 1 個月提出。 (101/12/1)</p> <p>(2) 紅皮症乾癬病患以 6 個月為限，於 6 個月療程結束後，應回復使用 cyclosporin，除非產生腎功能異常 (Creatinine 基礎值上升 $\geq 30\%$)，或其他無法有效控制之副作用，減藥後乾癬仍無法有效控制。 (101/12/1)</p> <p>(3) Etanercept 初期 3 個月可使用 50mg biw，之後則為 25mg biw，且於 12 週時，需先行評估，至少有 PASI25</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>療效。</p> <p>(4)Adalimumab 初次投予為 80mg，之後則為 40mg qow，且於 12 週時，須先行評估，至少有 PASI25 療效。 (100/7/1)</p> <p>(5)Ustekinumab 初次及 4 週後投予 45mg，之後則為 45mg q12w，且於 16 週時，需先行評估，至少有 PASI25 療效。(101/5/1)</p> <p><u>(6)Secukinumab 起始於第 0, 1, 2, 3, 4 週投予 300 mg，接著於第 4 週開始於每 4 週投予 300 (體重≤60kg，投予 150 mg 的劑量) 且於 12 週時，須先行評估，至少有 PASI25 療效。</u></p> <p><u>(7)原先使用 cyclosporin 控制有效且腎功能異常 (Creatinine 基礎值上升≥30%)者，於 6 個月療程結束後，應回復使用 cyclosporin，除非產生腎功能異常，或其他無法有效控制之副作用，減藥後乾癬仍無法有效控制，否則下次申請應於 1 年後。</u></p> <p><u>(8)初次申請後每六個月須再次申請續用，續用時，與初次治療前之療效達 PASI50 方可</u></p> | <p>療效。</p> <p>(4)Adalimumab 初次投予為 80mg，之後則為 40mg qow，且於 12 週時，須先行評估，至少有 PASI25 療效。 (100/7/1)</p> <p>(5)Ustekinumab 初次及 4 週後投予 45mg，之後則為 45mg q12w，且於 16 週時，需先行評估，至少有 PASI25 療效。(101/5/1)</p> <p><u>(6)原先使用 cyclosporin 控制有效且腎功能異常 (Creatinine 基礎值上升≥30%)者，於 6 個月療程結束後，應回復使用 cyclosporin，除非產生腎功能異常，或其他無法有效控制之副作用，減藥後乾癬仍無法有效控制，否則下次申請應於 1 年後。</u></p> <p><u>(7)初次申請後每六個月須再次申請續用，續用時，與初次治療前之療效達 PASI50 方可</u></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>使用；且 etanercept 再次申請時僅限使用 25mg biw 之劑量。停藥超過 3 個月再申請者，視同新申請案件，否則視為續用案件。(101/12/1、104/4/1)</p> <p>3. 使用 etanercept、adalimumab、ustekinumab、secukinumab 時，考慮其於乾癬療效可能較慢，及立即停藥之可能反彈現象，治療前兩個月得合併使用 cyclosporine 及照光治療，但 etanercept、adalimumab、ustekinumab、secukinumab 療效出現時即應逐漸停用。(101/5/1、105/9/1)</p> <p>4. 需排除使用的情形應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1) 懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2) 罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3) 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>(4) 身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血病</p> | <p>使用；且 etanercept 再次申請時僅限使用 25mg biw 之劑量。停藥超過 3 個月再申請者，視同新申請案件，否則視為續用案件。(101/12/1、104/4/1)</p> <p>3. 使用 etanercept、adalimumab 或 ustekinumab 時 cyclosporine 及照光治療，考慮 etanercept、adalimumab 或 ustekinumab 於乾癬療效可能較慢，及立即停藥之可能反彈現象，治療前兩個月得合併使用，但 etanercept、adalimumab 或 ustekinumab 療效出現時即應逐漸停用。(101/5/1)</p> <p>4. 需排除使用的情形應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1) 懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2) 罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3) 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)</p> <p>(4) 身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血病</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者(immunodeficiency)。</p> <p>5. 需停止治療情形，如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 惡性腫瘤。 ii. 該藥物引起的嚴重性毒性。 iii. 懷孕（暫時停藥即可）。 iv. 嚴重的間發性感染症（intercurrent infection）（暫時停藥即可）。 <p>(2)療效不彰：患者經過6個月治療（初次療程）後未達療效者，療效定義指 PASI 或體表面積改善未達50%。</p> <p>6. 暫緩續用之相關規定：(104/4/1)</p> <p>(1)暫緩續用時機：使用生物製劑治療2年後符合 PASI ≤10 者。</p> <p>(2)因使用一種生物製劑治療後療效不彰，而轉用另一種不同藥理機轉之生物製劑，以轉用後者之起始日重新計算2年後開始減量之時機。但因無法忍受副作用而轉用相</p> | <p>(sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者(immunodeficiency)。</p> <p>5. 需停止治療情形，如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 惡性腫瘤。 ii. 該藥物引起的嚴重性毒性。 iii. 懷孕（暫時停藥即可）。 iv. 嚴重的間發性感染症（intercurrent infection）（暫時停藥即可）。 <p>(2)療效不彰：患者經過6個月治療（初次療程）後未達療效者，療效定義指 PASI 或體表面積改善未達50%。</p> <p>6. 暫緩續用之相關規定：(104/4/1)</p> <p>(1)暫緩續用時機：使用生物製劑治療2年後符合 PASI ≤10 者。</p> <p>(2)因使用一種生物製劑治療後療效不彰，而轉用另一種不同藥理機轉之生物製劑，以轉用後者之起始日重新計算2年後開始減量之時機。但因無法忍受副作用而轉用相</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>同藥理機轉之生物製劑，轉用前後所使用生物製劑之期間均應計入。</p> <p>7. 暫緩續用後若疾病再復發，可重新申請使用，須符合至少有 50%復發（需附上次療程治療前、後，及本次照片）。(104/4/1)</p> <p>◎附表二十四之一：全民健康保險乾癬使用 Etanercept/ Adalimumab / Ustekinumab/ <u>Secukinumab</u> 申請表 (105/9/1)</p> <p>◎附表二十四之二：全民健康保險乾癬（慢性紅皮症乾癬部分）使用 Etanercept/ Adalimumab/ Ustekinumab/ <u>Secukinumab</u> 申請表 (105/9/1)</p> <p>◎附表二十四之三：乾癬面積暨嚴重度指數【Psoriasis Area Severity Index (PASI)】</p> <p>8.2.4.7. Adalimumab（如 Humira）(100/7/1、102/1/1、105/10/1)：用於克隆氏症治療部分</p> <p><u>8.2.4.7.1. Adalimumab（如 Humira）(105/10/1)：</u> <u>成人治療部分</u></p> <p>1. 限具有消化系專科證書者處方。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使</p> | <p>同藥理機轉之生物製劑，轉用前後所使用生物製劑之期間均應計入。</p> <p>7. 暫緩續用後若疾病再復發，可重新申請使用，須符合至少有 50%復發（需附上次療程治療前、後，及本次照片）。(104/4/1)</p> <p>◎附表二十四之一：全民健康保險乾癬使用 Etanercept/ Adalimumab / Ustekinumab 申請表</p> <p>◎附表二十四之二：全民健康保險乾癬（慢性紅皮症乾癬部分）使用 Etanercept/Adalimumab /Ustekinumab 申請表</p> <p>◎附表二十四之三：乾癬面積暨嚴重度指數【Psoriasis Area Severity Index (PASI)】</p> <p>8.2.4.7. Adalimumab（如 Humira）(100/7/1、102/1/1)：用於克隆氏症治療部分</p> <p>1. 限具有消化系專科證書者處方。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>用。</p> <p>3. 須經診斷為成人克隆氏症，領有克隆氏症重大傷病卡，並符合下列條件之一；且申請時應附上影像診斷評估報告。</p> <p>(1) 克隆氏症病情發作，經 5-aminosalicylic acid 藥物 (sulfasalazine, mesalamine, balsalazide)、類固醇、及/或免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療超過六個月，仍然無法控制病情 (CDAI \geq 300) 或產生嚴重藥物副作用時，且病況不適合手術者。</p> <p>(2) 克隆氏症經 5-aminosalicylic acid 藥物如 (sulfasalazine, mesalamine, balsalazide)、類固醇、及免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療超過六個月，或外科手術治療，肛門周圍瘻管或腹壁瘻管仍無法癒合且 CDAI \geq 100 者。</p> <p>(3) 克隆氏症經 5-aminosalicylic acid 藥物如 (sulfasalazine,</p> | <p>用。</p> <p>3. 須經診斷為成人克隆氏症，領有克隆氏症重大傷病卡，並符合下列條件之一；且申請時應附上影像診斷評估報告。</p> <p>(1) 克隆氏症病情發作，經 5-aminosalicylic acid 藥物 (sulfasalazine, mesalamine, balsalazide)、類固醇、及/或免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療超過六個月，仍然無法控制病情 (CDAI \geq 300) 或產生嚴重藥物副作用時，且病況不適合手術者。</p> <p>(2) 克隆氏症經 5-aminosalicylic acid 藥物如 (sulfasalazine, mesalamine, balsalazide)、類固醇、及免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療超過六個月，或外科手術治療，肛門周圍瘻管或腹壁瘻管仍無法癒合且 CDAI \geq 100 者。</p> <p>(3) 克隆氏症經 5-aminosalicylic acid 藥物如 (sulfasalazine,</p> | |
|--|--|--|

mesalamine, balsalazide)、類固醇、及免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療，仍於一年內因克隆氏症之併發症接受二次(含)以上之手術治療且 CDAI \geq 100 者。

4. 療效評估與繼續使用：

(1) 初次申請 adalimumab 以 8 週(使用 4 劑)為限，治療第三劑後，達到有效緩解之誘導或部份有效緩解之誘導者，方得申請繼續使用。

i 有效緩解之誘導：

CDAI \leq 150 或瘻管痊癒。

ii 部份有效緩解之誘導：CDAI 分數下降 \geq 100 或瘻管數量減少。

(2) 繼續使用者，需每 16 週(使用 8 劑)評估一次，評估仍維持前一次療程有效或部份有效緩解時之 CDAI 分數者，方得提出申請續用，每次申請以 16 週(使用 8 劑)為限。

(3) 治療 56 週(使用 28 劑)後須至少再間隔超過六個月後，因病情復發或以其他治療難以控制達上述 3. 之 (1)(2)(3) 之標準才能

mesalamine, balsalazide)、類固醇、及免疫抑制劑 (azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate) 充分治療，仍於一年內因克隆氏症之併發症接受二次(含)以上之手術治療且 CDAI \geq 100 者。

4. 療效評估與繼續使用：

(1) 初次申請 adalimumab 以 8 週(使用 4 劑)為限，治療第三劑後，達到有效緩解之誘導或部份有效緩解之誘導者，方得申請繼續使用。

i 有效緩解之誘導：

CDAI \leq 150 或瘻管痊癒。

ii 部份有效緩解之誘導：CDAI 分數下降 \geq 100 或瘻管數量減少。

(2) 繼續使用者，需每 16 週(使用 8 劑)評估一次，評估仍維持前一次療程有效或部份有效緩解時之 CDAI 分數者，方得提出申請續用，每次申請以 16 週(使用 8 劑)為限。

(3) 治療 40 週(使用 20 劑)後須至少再間隔超過六個月後，因病情復發或以其他治療難以控制達上述 3. 之 (1)(2)(3) 之標準才能

再次提出申請使用。

(105/10/1)

5. 使用劑量：原則上，最初第一劑 160mg，兩週後第二劑 80mg，第四週之第三劑 40mg，作為緩解之誘導；之後每隔兩週給予維持劑量 40mg，可持續至 56 週(使用 28 劑)，作為緩解之維持。

(105/10/1)

6. 須排除使用之情形

應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：

- (1) 懷孕或正在授乳的婦女。
- (2) 罹患活動性感染症 (active infection) 之病患。
- (3) 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)
- (4) 惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)之病患 (但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤)。
- (5) 具高度感染機會之病患：慢性腿部潰瘍、導尿管置留、身上有引流管、人工關節感染，該人工關節尚未摘除者、頑固性或復發性之胸腔感染症病患。

再次提出申請使用。

5. 使用劑量：原則上，最初第一劑 160 mg，兩週後第二劑 80 mg，第四週之第三劑 40 mg，作為緩解之誘導；之後每隔兩週給予維持劑量 40 mg，可持續至 40 週(使用 20 劑)，作為緩解之維持。

6. 須排除使用之情形

應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：

- (1) 懷孕或正在授乳的婦女。
- (2) 罹患活動性感染症 (active infection) 之病患。
- (3) 未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。(102/1/1)
- (4) 惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)之病患 (但不包括已經接受過充分治療達 10 年以上的惡性腫瘤)。
- (5) 具高度感染機會之病患：慢性腿部潰瘍、導尿管置留、身上有引流管、人工關節感染，該人工關節尚未摘除者、頑固性或復發性之胸腔感染症病患。

| | | |
|---|--|--|
| <p>(6)多發性硬化症 (multiple sclerosis)。</p> <p>7. 須停止治療的情形</p> <p>(1)療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者。</p> <p>(2)其他事項：包括</p> <p>i 惡性腫瘤</p> <p>ii 該藥物引起之嚴重毒性（白血球過低、嚴重過敏）</p> <p>iii 懷孕(暫時停藥即可)</p> <p>iv 嚴重間發性感染（暫時停藥即可）。</p> <p>◎附表二十六之一：全民健康保險克隆氏症使用adalimumab申請表</p> <p>◎附表二十六之二：CDAI (Crohn' s disease activity index)</p> <p><u>8. 2. 4. 7. 2. Adalimumab (如Humira)</u> <u>(105/10/1)：兒童治療部分</u></p> <p><u>1. 限具有小兒專科或消化系專科證書之醫師處方使用。</u></p> <p><u>2. 須經事前審查核准後使用。</u></p> <p><u>3. 六歲(含)以上，經診斷為小兒克隆氏症且領有重大傷病證明，並排除第6項之情形及符合下列條件之一；且申請時應附上影像診斷評估報告。</u></p> <p><u>(1)克隆氏症病情發作，經皮質類固醇及免疫</u></p> | <p>(6)多發性硬化症 (multiple sclerosis)。</p> <p>7. 須停止治療的情形</p> <p>(1)療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者。</p> <p>(2)其他事項：包括</p> <p>i 惡性腫瘤</p> <p>ii 該藥物引起之嚴重毒性（白血球過低、嚴重過敏）</p> <p>iii 懷孕(暫時停藥即可)</p> <p>iv 嚴重間發性感染（暫時停藥即可）。</p> <p>◎附表二十六之一：全民健康保險克隆氏症使用adalimumab申請表</p> <p>◎附表二十六之二：CDAI (Crohn' s disease activity index)</p> | |
|---|--|--|

抑制劑
(azathioprine, 6-mercaptopurine, methotrexate)充分治療超過三個月，仍然無法控制病情(PCDAI>30)或產生過敏或其他嚴重副作用者。

(2)小兒克隆氏症病童腹部或肛門瘻管合併生長遲緩者(height velocity Z Score -1 to -2.5)。

(3)小兒克隆氏症病情發作且生長遲緩(height velocity Z Score -1 to -2.5)病童，經營養治療與免疫抑制劑治療失敗者。

4. 療效評估與繼續使用：

(1)初次申請 adalimumab 以 8 週為限，治療第 3 劑後，達到臨床反應(PCDAI 降低 \geq 15)者，方得申請繼續使用。

(2)繼續使用者，需每 16 週評估一次，評估仍維持前一次療程達到臨床反應，方得提出申請續用，每次申請以 16 週(使用 8 劑)為限。

(3)治療 56 週(使用 28 劑)後須至少再間隔超過六個月後，因病情復發或以其他治療難以控制達上述 3. 之

(1)(2)(3)之標準才能再次提出申請使用。

5. 使用劑量：

(1)體重 \geq 40 公斤者，最初第一劑 160mg，兩週後第二劑 80mg，第四週給予第三劑 40mg，之後每隔兩週給予維持劑量 40mg。

(2)體重 $<$ 40 公斤者，最初第一劑 80mg，兩週後第二劑 40mg，第四週給予第三劑 20mg，之後每隔兩週給予維持劑量 20mg。

6. 須排除使用之情形

應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：

(1)罹患活動性感染症 (active infection) 之病患。

(2)未經完整治療之結核病的病患 (包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。

(3)惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 之病患。

(4)具高度感染機會之病患：慢性腿部潰瘍、導尿管置留、身上有引流管、頑固性或復發性之胸腔感染症病患。

(5)多發性硬化症

(multiple sclerosis)。

7. 須停止治療的情形

(1) 療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者。

(2) 其他事項：包括

i 惡性腫瘤

ii 該藥物引起之嚴重毒性（白血球過低、嚴重過敏）

iii 嚴重感染（暫時停藥即可）。

◎附表二十六之三：全民健康保險小兒克隆氏症使用 adalimumab 申請表

◎附表二十六之四：PCDAI (Pediatric Crohn's disease activity index)

8. 2. 4. 8. Abatacept 靜脈注射劑（如 Orencia IV）（101/10/1、102/1/1、104/8/1）：用於幼年型慢性關節炎治療部分

1. 給付條件：

(1) 限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑（如 etanercept）治療，但未達療效或無法耐受之 6 歲至 17 歲有幼年型慢性關節炎之兒童患者。

I. Etanercept 的療效：

i. 紅血球沉降速率（ESR）或 CRP 及下列三項中至少有一項達到較基礎值改

8. 2. 4. 8. Abatacept 靜脈注射劑（如 Orencia IV）（101/10/1、102/1/1、104/8/1）：用於幼年型慢性關節炎治療部分

1. 給付條件：

(1) 限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑（如 etanercept）治療，但未達療效或無法耐受之 6 歲至 17 歲有幼年型慢性關節炎之兒童患者。

I. Etanercept 的療效：

i. 紅血球沉降速率（ESR）或 CRP 及下列三項中至少有一項達到較基礎值改

| | | |
|---|---|--|
| <p>善 30%以上效果者。</p> <p>a. 活動性關節炎的總數。</p> <p>b. 關節活動範圍受到限制的關節總數。</p> <p>c. 醫師的整體評估。</p> <p>ii. 上述各種指標惡化程度達 30%以上者不得超過一項</p> <p>II. 無法耐受的定義：無法忍受 etanercept 治療的副作用。</p> <p>(2)需與 methotrexate 併用（但對 methotrexate 過敏，或 methotrexate 引起嚴重血球低下、肝毒性及其它嚴重副作用者除外）。</p> <p>2. 限具有風濕病專科醫師證書之內科、小兒科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師處方。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)申請初次治療時，應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子拮抗劑之用藥結果，包括種類、劑量、關節腫脹治療前後的相關照片或關節 X 光檢查報告、及副作用報告等資料。</p> <p>(2)使用 abatacept 之後，每 6 個月需再申請一次；需描述使用藥物後</p> | <p>善 30%以上效果者。</p> <p>a. 活動性關節炎的總數。</p> <p>b. 關節活動範圍受到限制的關節總數。</p> <p>c. 醫師的整體評估。</p> <p>ii. 上述各種指標惡化程度達 30%以上者不得超過一項</p> <p>II. 無法耐受的定義：無法忍受 etanercept 治療的副作用。</p> <p>(2)需與 methotrexate 併用（但對 methotrexate 過敏，或 methotrexate 引起嚴重血球低下、肝毒性及其它嚴重副作用者除外）。</p> <p>2. 限具有風濕病專科醫師證書之內科、小兒科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師處方。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)申請初次治療時，應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子拮抗劑之用藥結果，包括種類、劑量、關節腫脹治療前後的相關照片或關節 X 光檢查報告、及副作用報告等資料。</p> <p>(2)使用 abatacept 之後，每 6 個月需再申請一次；需描述使用藥物後</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>的療效、副作用或併發症。</p> <p>4. 需排除 abatacept 使用的情形應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2)罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3)未經完整治療之結核病的患者（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1)</p> <p>(4)身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症(sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>5. 需停止 abatacept 治療的情形如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <p>I. 惡性腫瘤。</p> <p>II. 該藥物引起的嚴重毒性。</p> <p>III. 懷孕（暫時停藥即可）。</p> <p>IV. 嚴重的間發性感染症 (intercurrent infection)(暫時停藥即可)。</p> | <p>的療效、副作用或併發症。</p> <p>4. 需排除 abatacept 使用的情形應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：</p> <p>(1)懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>(2)罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>(3)未經完整治療之結核病的患者（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1)</p> <p>(4)身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症(sepsis)者。</p> <p>(5)惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 的病患。</p> <p>(6)免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>5. 需停止 abatacept 治療的情形如果發生下列現象應停止治療：</p> <p>(1)不良事件，包括：</p> <p>I. 惡性腫瘤。</p> <p>II. 該藥物引起的嚴重毒性。</p> <p>III. 懷孕（暫時停藥即可）。</p> <p>IV. 嚴重的間發性感染症 (intercurrent infection)(暫時停藥即可)。</p> | |
|--|--|--|

(2)療效不彰：患者的 core set data 經過 6 個月治療後未達療效者。

療效定義：

I. 紅血球沉降速率 (ESR) 或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善 30%以上效果者。

i. 活動性關節炎的總數

ii. 關節活動範圍受到限制的關節總數

iii. 醫師的整體評估

II. 上述各種指標惡化程度達 30%以上者不得超過一項。

◎附表三十一：全民健康保險使用 abatacept 申請表(六歲至十七歲兒童)

8.2.4.9. Golimumab(如 Simponi)、Adalimumab(如 Humira)(105/9/1、105/10/1)：用於潰瘍性結腸炎治療部分

1. 須經事前審查核准後使用。

2. 須經診斷為成人潰瘍性結腸炎，並符合下列條件之一：

(1)同時符合下列條件：

I. 領有潰瘍性結腸炎重大傷病卡(直腸型排

(2)療效不彰：患者的 core set data 經過 6 個月治療後未達療效者。

療效定義：

I. 紅血球沉降速率 (ESR) 或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善 30%以上效果者。

i. 活動性關節炎的總數

ii. 關節活動範圍受到限制的關節總數

iii. 醫師的整體評估

II. 上述各種指標惡化程度達 30%以上者不得超過一項。

◎附表三十一：全民健康保險使用 abatacept 申請表(六歲至十七歲兒童)

除)。

II. 經 5-

aminosalicylic acid 藥物(如 sulfasalazine、mesalamine 或 balsalazide)、類固醇、及免疫調節劑(如 azathioprine 或 6-mercaptopurine)充分治療無效(須有病歷完整記載用藥史，連續治療達 6 個月以上)，或對 5-aminosalicylic acid 藥物、免疫調節劑產生嚴重藥物副作用。

III. Mayo score ≥ 9

分且 Mayo Endoscopic subscore ≥ 2 分(需檢附兩個月內之大腸鏡報告，內含可供辨識之彩色照片)。

(2)急性嚴重的潰瘍性結腸炎，同時符合下列四要件:

I. 內視鏡下符合潰瘍性結腸炎。

II. 病理切片排除巨細胞病毒腸炎、阿米巴結腸炎、淋巴瘤。

III. 糞便檢測排除困難梭狀桿菌感

染。

IV. Mayo Score 為 12

分，經類固醇全

劑量靜脈注射

(如

methylpredniso

lone 40-

60mg/day 等)連

續治療 5 天無

效。

3. 療效評估與繼續使用：

(1)初次申請： golimumab

以 6 週(使用 2 劑)、

adalimumab 以 8 週(使

用 4 劑)為限，治療後

達到臨床反應評估者

(Mayo Score \leq 6 分，

且 Mayo Endoscopic

subscore \leq 2 分)，方

得申請繼續使用。

(105/10/1)

(2)繼續使用者：需每 16

週評估一次，若評估

仍維持前一療程或更

低之 Mayo Score 分

數，且 Mayo

Endoscopic subscore

\leq 1 分，可再申請繼

續使用 16 週，維持治

療以申請兩次為限。

4. 劑量給予方式及總療

程：

(1)Golimumab：

I. 最初第一劑

200mg，兩週後

第二劑 100mg，

作為緩解之誘

導；有效患者之

後每隔 4 週給予

維持劑量

50mg(體重大於80公斤病患，每隔4週100mg)，至多持續至38週，作為緩解之維持。

II. 若使用劑量為100mg(含)以上，限使用100mg(1mL)規格量。

(2)Adalimumab：最初第一劑160mg，兩週後第二劑80mg，第四週之第三劑及第六週之第四劑40mg，作為緩解之誘導；之後每隔兩週給予維持劑量40mg，至多持續至40週(使用20劑)，作為緩解之維持。(105/10/1)

5. Golimumab 治療 38 週；adalimumab 治療 40 週(使用 20 劑)後若病情復發，依初次使用標準再次提出申請。(105/10/1)

6. 須排除使用之情形：應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：

(1)懷孕或正在授乳的婦女。

(2)罹患活動性感染症(active infection)之病患。

(3)未經完整治療之結核病患者(包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>及治療紀錄供審查)。</u></p> <p><u>(4)惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)之病患(但不包括已經接受過充分治療達10年以上的惡性腫瘤)。</u></p> <p><u>(5)具高度感染機會之病患：慢性腿部潰瘍、導尿管置留、身上有引流管、人工關節感染，該人工關節尚未摘除者、頑固性或復發性之胸腔感染症病患。</u></p> <p><u>(6)多發性硬化症(multiple sclerosis)。</u></p> <p><u>7.須停止治療的情形：</u></p> <p><u>(1)療效不彰：療效評估未達繼續使用標準者。</u></p> <p><u>(2)其他事項包括：</u></p> <p><u>I. 惡性腫瘤。</u></p> <p><u>II. 該藥物引起之嚴重毒性(白血球過低、嚴重過敏)。</u></p> <p><u>III. 懷孕(暫時停藥即可)。</u></p> <p><u>IV. 嚴重間發性感染(暫時停藥即可)。</u></p> <p>8. 2. 5. Leflunomide (如 Arava、Arheuma)： (92/9/1、93/5/1、97/9/1)</p> <p>1. 限治療成人類風濕性關節炎，且用於 methotrexate 治療無效，或無法忍受</p> | <p>8. 2. 5. Leflunomide (如 Arava、Arheuma)： (92/9/1、93/5/1、97/9/1)</p> <p>1. 限治療成人類風濕性關節炎，且用於 methotrexate 治療無效，或無法忍受</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>methotrexate 副作用時使用。</p> <p>2. 限治療具活動性的成人乾癱性關節炎，且於 DMARDs (疾病修飾抗風濕病藥物) 治療無效後使用。(97/9/1)</p> <p>8.2.6. 短效干擾素、長效干擾素：</p> <p>8.2.6.1. Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A) (92/10/1)；</p> <p>peginterferon alfa-2a (如 Pegasys) (92/11/1-C 肝、94/11/1-B 肝、96/10/1、98/11/1、99/5/1-B 肝、100/6/1-B 肝、102/2/1、<u>105/10/1</u>、106/1/1)：</p> <p>1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療計畫」之下列慢性病毒性 B 型或慢性病毒性 C 型肝炎患者。</p> <p>(1) 用於慢性病毒性 B 型肝炎患者</p> <p>I. HBsAg (+) 超過六個月及 HBeAg (+) 超過三個月，且 ALT 值大於 (或等於) 正常值上限五倍以上 (ALT \geq 5X)，且無肝功能代償不全者。療程為 <u>12</u> 個月。(98/11/1、</p> | <p>methotrexate 副作用時使用。</p> <p>2. 限治療具活動性的成人乾癱性關節炎，且於 DMARDs (疾病修飾抗風濕病藥物) 治療無效後使用。(97/9/1)</p> <p>8.2.6. 短效干擾素、長效干擾素：</p> <p>8.2.6.1. Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A) (92/10/1)；</p> <p>peginterferon alfa-2a (如 Pegasys) (92/11/1-C 肝、94/11/1-B 肝、96/10/1、98/11/1、99/5/1-B 肝、100/6/1-B 肝、102/2/1)：</p> <p>1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療<u>試辦</u>計畫」之下列慢性病毒性 B 型或慢性病毒性 C 型肝炎患者。</p> <p>(1) 用於慢性病毒性 B 型肝炎患者</p> <p>I. HBsAg (+) 超過六個月及 HBeAg (+) 超過三個月，且 ALT 值大於 (或等於) 正常值上限五倍以上 (ALT \geq 5X)，且無肝功能代償不全者。療程為 <u>6</u> 個月。(98/11/1)</p> | |
|---|---|--|

105/10/1)

註：肝代償不全
條件為
prothrombin
time 延長 ≥ 3
秒或
bilirubin
(total) \geq
2.0mg/dL，
prothrombin
time 延長係
以該次檢驗
control 值為
準。

II. HBsAg (+) 超過
六個月及 HBeAg
(+) 超過三個月，
其 ALT 值介於正常
值上限二至五倍之
間 ($2X \leq$
ALT $<5X$)，且血清
HBV DNA $\geq 20,000$
IU/mL 或經由肝組
織切片（血友病患
及類血友病患經照
會消化系專科醫師
同意後，得不作切
片）證實 HBcAg 陽
性並有慢性肝炎變
化，無 D 型或 C 型
肝炎合併感染，且
無肝功能代償不全
者，可接受藥物治
療，療程為 12 個
月。（98/11/1、
105/10/1）

III. HBsAg (+) 超過
六個月及 HBeAg
(-) 超過三個月，
且 ALT 值半年有兩

註：肝代償不全
條件為
prothrombin
time 延長 ≥ 3
秒或
bilirubin
 ≥ 2.0 mg/dL，
prothrombin
time 延長係
以該次檢驗
control 值為
準。

II. HBsAg (+) 超過
六個月及 HBeAg
(+) 超過三個月，
其 ALT 值介於正常
值上限二至五倍之
間 ($2X \leq$ ALT $<5X$)，且
血清 HBV
DNA $\geq 20,000$
IU/mL 或經由肝組
織切片（血友病患
及類血友病患經照
會消化系專科醫師
同意後，得不作切
片）證實 HBcAg 陽
性並有慢性肝炎變
化，無 D 型或 C 型
肝炎合併感染，且
無肝功能代償不全
者，可接受藥物治
療，療程為 6 個
月。（98/11/1）

III. HBsAg (+) 超過
六個月及 HBeAg
(-) 超過三個月，
且 ALT 值半年有兩

次以上（每次間隔三個月）大於或等於正常值上限二倍以上（ALT \geq 2X），且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL 或經由肝組織切片（血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片）證實 HBcAg 陽性，無 D 型或 C 型肝炎合併感染，且無肝功能代償不全之患者。療程為 12 個月。（98/11/1）

IV. 符合上述 I、II、III 條件納入治療計畫且經完成治療後停藥者：經 6 個月 觀察期，復發且符合上述 I、II、III 條件者，無肝代償不全者，可使用 interferon alpha-2a、interferon alpha-2b、peginterferon alfa-2a 再治療（一個療程）；或以 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg、telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 再治療。惟若有肝代償不全者則應儘

次以上（每次間隔三個月）大於或等於正常值上限二倍以上（ALT \geq 2X），且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL 或經由肝組織切片（血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片）證實 HBcAg 陽性，無 D 型或 C 型肝炎合併感染，且無肝功能代償不全之患者。療程為 12 個月。（98/11/1）

IV. 符合上述 I、II、III 條件納入試辦計畫且經完成治療後停藥者：經 一年 觀察期，復發且符合上述 I、II、III 條件者，無肝代償不全者，可使用 Interferon alpha-2a、interferon alpha-2b、peginterferon alfa-2a 再治療二次（一個療程）或 lamivudine 100mg 或 entecavir 0.5mg、telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 治療 12~36 個月。若有肝代償不全者

| | | |
|--|---|--|
| <p>速使用 lamivudine 100mg、entecavir 1.0mg(每日限使用 1粒)、 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 再治療。 (98/11/1、 99/5/1、 100/6/1、 102/2/1、 106/1/1)</p> <p>V. 符合 10.7.3 之 1 及 3 至 5 項條件納 入治療計畫經完成 治療後停藥者：經 觀察 3 至 6 個月， 復發且符合上述 I、II、III 條件且 無肝代償不全者， 可使用 interferon alpha-2a、 interferon alpha-2b 或 peginterferon alfa-2a 再治療 (一個療程)，或 以 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg、 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 再治療。惟若有肝 代償不全者，則應 儘速使用 lamivudine</p> | <p>則應儘速使用 lamivudine 100mg 或 entecavir 0.5mg、 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 治療，療程為 12~36 個月。 (98/11/1、 99/5/1、 100/6/1、 102/2/1)</p> <p>V. 符合 10.7.3 之 3 至 5 項條件納入試 辦計畫經完成治療 後停藥者：經觀察 3 至 6 個月，復發 且符合上述 I、 II、III 條件且無 肝代償不全者，可 使用 interferon alpha-2a、 interferon alpha-2b 或 peginterferon alfa-2a 再治療二 次(一個療程)， 或 lamivudine 100mg 或 entecavir 0.5mg 或 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 治療 12~36 個月， 若有肝代償不全 者，則應儘速使用 lamivudine 100mg 或 entecavir</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>100mg、entecavir 1.0mg(每日限使用 1粒)、 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 再治療。 (98/11/1、 100/6/1、 102/2/1、 106/1/1)</p> <p><u>VI. 上述IV及V停藥 復發者再以口服 抗病毒藥物治療 之給付療程依 HBeAg(+)或 HBeAg(-)而定： HBeAg(+)病患治 療至 e 抗原轉陰 並再給付最多 12 個月； HBeAg(-) 病患治療至少二 年，治療期間需 檢驗血清 HBV DNA，並於檢驗血 清 HBV DNA 連續 三次，每次間隔 6 個月，均檢驗不 出 HBV DNA 時可 停藥，每次療程 至多給付 36 個 月。再次復發時 得再接受治療， 不限治療次數。 (106/1/1)</u></p> <p>(2)用於慢性病毒性 C 型肝炎治療時： I. 應與 Ribavirin 併用 II. 限 ALT 值異常</p> | <p>0.5mg、 telbivudine 600mg 或 tenofovir 300mg 治療，<u>療程為 12~36 個月。</u> (98/11/1、 100/6/1、 102/2/1)</p> <p>(2)用於慢性病毒性 C 型肝炎治療時： I. 應與 Ribavirin 併用 II. 限 ALT 值異常</p> | |
|--|--|--|

者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組織切片（血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片）以 METAVIR system 證實輕度纖維化大於或等於 F1 及肝炎變化，且無肝功能代償不全者。

(98/11/1)

III. 療程依 Viral

Kinetics 區分如下：(98/11/1)

- a、有 RVR (rapid virological response, 快速病毒反應) 者，給付治療不超過 24 週。
- b、無 RVR，但有 EVR (early virologic response) 者，給付治療 48 週。
- c、到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。
- d、第一次藥物治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，不超過 48 週。

※復發的定義：

者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組織切片（血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片）以 METAVIR system 證實輕度纖維化大於或等於 F1 及肝炎變化，且無肝功能代償不全者。

(98/11/1)

III. 療程依 Viral

Kinetics 區分如下：(98/11/1)

- a、有 RVR (rapid virological response, 快速病毒反應) 者，給付治療不超過 24 週。
- b、無 RVR，但有 EVR (early virologic response) 者，給付治療 48 週。
- c、到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。
- d、第一次藥物治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，不超過 48 週。

※復發的定義：

治療完成時，血中偵測不到病毒，停藥後血中病毒又再次偵測到。

(98/11/1)

2. 限用於下列癌瘤病患

「限 interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A)」(93/4/1、97/8/1)：

- (1)Chronic myelogenous leukemia
- (2)Multiple myeloma
- (3)Hairy cell leukemia
- (4)T細胞淋巴瘤病例 (限 a-2A、2B type) (87/4/1)。
- (5)卡波西氏肉瘤 (Kaposi' s sarcoma) 病例使用 (87/4/1)。
- (6)小於七十歲以下，罹患中、晚期之低度非何杰金氏淋巴瘤(low grade non-Hodgkin' s lymphoma)，且具有高腫瘤負荷(high tumor burden)之病患。(89/1/1) (「高腫瘤負荷」定義：第三或第四期病患；或血清 LDH > 350 IU/L；或腫塊大於十公分以上。)

(7)限使用於晚期不能手

治療完成時，血中偵測不到病毒，停藥後血中病毒又再次偵測到。

(98/11/1)

2. 限用於下列癌瘤病患

「限 interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 及 interferon alpha-2b (如 Intron A)」(93/4/1、97/8/1)：

- (1)Chronic myelogenous leukemia
- (2)Multiple myeloma
- (3)Hairy cell leukemia
- (4)T細胞淋巴瘤病例 (限 a-2A、2B type) (87/4/1)。
- (5)卡波西氏肉瘤 (Kaposi' s sarcoma) 病例使用 (87/4/1)。
- (6)小於七十歲以下，罹患中、晚期之低度非何杰金氏淋巴瘤(low grade non-Hodgkin' s lymphoma)，且具有高腫瘤負荷(high tumor burden)之病患。(89/1/1) (「高腫瘤負荷」定義：第三或第四期病患；或血清 LDH > 350 IU/L；或腫塊大於十公分以上。)

(7)限使用於晚期不能手

| | | |
|--|--|--|
| <p>術切除或轉移性腎細胞癌之病患(限 a-2A type) (89/1/1)</p> <p>(8)kasabach-Merritt 症候群。(93/4/1)</p> <p>(9)用於一般療法無法治療的 Lymphangioma。(93/4/1、97/8/1)</p> <p>8.2.6.2. Peginterferon alpha-2b (如 Peg-Intron) (92/10/1、94/10/1) ; interferon alfacon-1 (如 Infergen) (93/7/1、94/10/1、98/11/1)</p> <p>1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及慢性 C 型肝炎治療試辦計畫」之下列慢性病毒性 C 型肝炎患者，且應與 ribavirin 併用。</p> <p>2. 限 ALT 值異常者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)，以 METAVIR system 證實輕度纖維化大於或等於 F1 及肝炎變化，且無肝功能代償不全者。(98/11/1)</p> <p>3. 療程依 Viral kinetics 區分如下：(98/11/1)</p> <p>(1)有 RVR (rapid virological response, 快速病毒反應)者，給付治療不超過 24 週。</p> <p>(2)無 RVR，但有 EVR</p> | <p>術切除或轉移性腎細胞癌之病患(限 a-2A type) (89/1/1)</p> <p>(8)kasabach-Merritt 症候群。(93/4/1)</p> <p>(9)用於一般療法無法治療的 Lymphangioma。(93/4/1、97/8/1)</p> <p>8.2.6.2. Peginterferon alpha-2b (如 Peg-Intron) (92/10/1、94/10/1) ; interferon alfacon-1 (如 Infergen) (93/7/1、94/10/1、98/11/1)</p> <p>1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及慢性 C 型肝炎治療試辦計畫」之下列慢性病毒性 C 型肝炎患者，且應與 ribavirin 併用。</p> <p>2. 限 ALT 值異常者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)，以 METAVIR system 證實輕度纖維化大於或等於 F1 及肝炎變化，且無肝功能代償不全者。(98/11/1)</p> <p>3. 療程依 Viral kinetics 區分如下：(98/11/1)</p> <p>(1)有 RVR (rapid virological response, 快速病毒反應)者，給付治療不超過 24 週。</p> <p>(2)無 RVR，但有 EVR</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(early virologic response)者，給付治療 48 週。</p> <p>(3)到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。</p> <p>(4)第一次治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，給付不超過 48 週。</p> <p>8.2.7. Rituximab 注射劑（如 Mabthera）：用於類風濕性關節炎之成人治療部分（97/11/1、99/2/1、101/7/1、102/1/1、102/4/1）</p> <p>1. 給付條件：</p> <p>(1)限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子（如 etanercept、adalimumab 或 golimumab 等）治療，但未達療效，或無法耐受的成人活動性類風濕性關節炎患者。（101/7/1）</p> <p>I. Etanercept、adalimumab 或 golimumab 的療效：經治療後評估 DAS28 總積分下降程度大於等於 $(\geq)1.2$，或 DAS28 總積分小於 3.2 者。（101/7/1）</p> <p>II. 無法耐受的定義：無法忍受 etanercept、adalimumab 或</p> | <p>(early virologic response)者，給付治療 48 週。</p> <p>(3)到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。</p> <p>(4)第一次治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，給付不超過 48 週。</p> <p>8.2.7. Rituximab 注射劑（如 Mabthera）：用於類風濕性關節炎之成人治療部分（97/11/1、99/2/1、101/7/1、102/1/1、102/4/1）</p> <p>1. 給付條件：</p> <p>(1)限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子（如 etanercept、adalimumab 或 golimumab 等）治療，但未達療效，或無法耐受的成人活動性類風濕性關節炎患者。（101/7/1）</p> <p>I. Etanercept、adalimumab 或 golimumab 的療效：經治療後評估 DAS28 總積分下降程度大於等於 $(\geq)1.2$，或 DAS28 總積分小於 3.2 者。（101/7/1）</p> <p>II. 無法耐受的定義：無法忍受 etanercept、adalimumab 或</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>golimumab 治療的副作用。 (101/7/1)</p> <p>(2)需與 methotrexate 併用 (但對 methotrexate 過敏, 或 methotrexate 引起嚴重血球低下、肝毒性及其它嚴重副作用者除外)。</p> <p>(3)給予重複療程之時機： I. 與前次治療相隔 24 週或以上, 且 II. 符合下列給藥時機規定: DAS28 總積分 ≥ 3.2, 或與前次接受 rituximab 治療後第 21 週比較, DAS28 總積分上升 ≥ 0.6。</p> <p>(4)每次療程為靜脈注射 500 毫克~1,000 毫克, 兩週後相同劑量再注射一次, 共注射兩次。</p> <p>2. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者處方。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用： (1)申請初次治療: 應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子之用藥結果, 包括種類、劑量、治療前後 DAS28 積分及副作用報告等資料。並宜記錄患者 HBsAg 及 Anti-HCV 資料(若</p> | <p>golimumab 治療的副作用。 (101/7/1)</p> <p>(2)需與 methotrexate 併用 (但對 methotrexate 過敏, 或 methotrexate 引起嚴重血球低下、肝毒性及其它嚴重副作用者除外)。</p> <p>(3)給予重複療程之時機： I. 與前次治療相隔 24 週或以上, 且 II. 符合下列給藥時機規定: DAS28 總積分 ≥ 3.2, 或與前次接受 rituximab 治療後第 21 週比較, DAS28 總積分上升 ≥ 0.6。</p> <p>(4)每次療程為靜脈注射 500 毫克~1,000 毫克, 兩週後相同劑量再注射一次, 共注射兩次。</p> <p>2. 限內科專科醫師且具有風濕或免疫專科醫師證書者處方。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用： (1)申請初次治療: 應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子之用藥結果, 包括種類、劑量、治療前後 DAS28 積分及副作用報告等資料。並宜記錄患者 HBsAg 及 Anti-HCV 資料(若</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>HBsAg 檢驗為陽性，宜加作 HBV DNA)。</p> <p>(2)申請給予重複療程：符合下列條件者，得再提出申請。</p> <p>I. 接受 rituximab 初次治療後第 21 週評估 DAS28 總積分，必須下降程度 ≥ 1.2，或 DAS28 總積分 < 3.2 者，方可給予重複療程。</p> <p>II. 重複療程之申請可於治療後第 21 週提出。申請第 1 次重複療程者，應先填寫初次療效；申請第 2 次以上重複療程者，必須填寫前兩次療效。並宜記錄患者發生之重大感染等副作用。</p> <p>(3)每次申請時應檢附治療前後之相關照片。(99/2/1)</p> <p>4. 需排除或停止使用 rituximab 治療之情形如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 對 rituximab 過敏 - 重度活動性感染症 - 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1) - 心衰竭病患（New | <p>HBsAg 檢驗為陽性，宜加作 HBV DNA)。</p> <p>(2)申請給予重複療程：符合下列條件者，得再提出申請。</p> <p>I. 接受 rituximab 初次治療後第 21 週評估 DAS28 總積分，必須下降程度 ≥ 1.2，或 DAS28 總積分 < 3.2 者，方可給予重複療程。</p> <p>II. 重複療程之申請可於治療後第 21 週提出。申請第 1 次重複療程者，應先填寫初次療效；申請第 2 次以上重複療程者，必須填寫前兩次療效。並宜記錄患者發生之重大感染等副作用。</p> <p>(3)每次申請時應檢附治療前後之相關照片。(99/2/1)</p> <p>4. 需排除或停止使用 rituximab 治療之情形如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 對 rituximab 過敏 - 重度活動性感染症 - 未經完整治療之結核病的病患（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1) - 心衰竭病患（New | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>York Heart Association class IV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 懷孕或授乳婦女 - 未達療效 - 藥物引起嚴重毒性 <p>◎附表二十三：全民健康保險使用 rituximab 申請表</p> <p>8.2.8.Palivizumab (如 Synagis)(99/12/1、102/7/1)</p> <p>限符合下列條件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 出生時懷孕週數小於或等於 28 週之早產兒。 2. 併有慢性肺疾病 (Chronic Lung Disease ; CLD)之早產兒(小於或等於 35 週)。 3. 一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童。需符合以下條件： <ol style="list-style-type: none"> (1)納入條件：符合下列條件之一 <ol style="list-style-type: none"> I 非發紺性先天性心臟病合併心臟衰竭：符合下列三項中至少兩項：(1) 生長遲滯，體重小於第三百分位；(2)有明顯心臟擴大現象；(3)需兩種以上抗心臟衰竭藥物控制症狀。 II 發紺性先天性心臟病：完全矯正手術(含心導管或是外科手術矯正)前或 | <p>York Heart Association class IV)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 懷孕或授乳婦女 - 未達療效 - 藥物引起嚴重毒性 <p>◎附表二十三：全民健康保險使用 rituximab 申請表</p> <p>8.2.8.Palivizumab (如 Synagis)(99/12/1、102/7/1)</p> <p>限符合下列條件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 出生時懷孕週數小於或等於 28 週之早產兒。 2. 併有慢性肺疾病 (Chronic Lung Disease ; CLD)之早產兒(小於或等於 35 週)。 3. 一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童。需符合以下條件： <ol style="list-style-type: none"> (1)納入條件：符合下列條件之一 <ol style="list-style-type: none"> I 非發紺性先天性心臟病合併心臟衰竭：符合下列三項中至少兩項：(1) 生長遲滯，體重小於第三百分位；(2)有明顯心臟擴大現象；(3)需兩種以上抗心臟衰竭藥物控制症狀。 II 發紺性先天性心臟病：完全矯正手術(含心導管或是外科手術矯正)前或 | |
|--|--|--|

是矯正手術後仍有發紺或是心臟衰竭症狀者。

(2)排除條件：

I 非嚴重性先天性心臟病：不需藥物控制心臟衰竭，如心房中隔缺損，單純動脈瓣膜輕微狹窄等。

II 嚴重性先天性心臟病，但經心導管或外科手術治療，目前僅殘存輕微血行動力學異常，且無發紺症狀。

(3)施打方式：

I 一歲之內每個月給予 15mg/kg palivizumab 肌肉注射一次，直到年齡滿一歲或直到矯正手術(包括開心及心導管手術)為止。

II 一歲之內接受體外循環開心矯正手術者，術後出院前再給一劑。

III 最多施打六劑。

8.2.9. Thalidomide (如 Thado) (100/2/1)

1. 用於中度至重度癩瘋性結節性紅斑(ERYTHEMA NODOSUM LEPROSUM, ENL)出現皮膚徵兆之急性期治療。
2. 可持續用於預防及抑制 ENL 皮膚徵兆復發。
3. 不可單獨用於治療發生

是矯正手術後仍有發紺或是心臟衰竭症狀者。

(2)排除條件：

I 非嚴重性先天性心臟病：不需藥物控制心臟衰竭，如心房中隔缺損，單純動脈瓣膜輕微狹窄等。

II 嚴重性先天性心臟病，但經心導管或外科手術治療，目前僅殘存輕微血行動力學異常，且無發紺症狀。

(3)施打方式：

I 一歲之內每個月給予 15mg/kg palivizumab 肌肉注射一次，直到年齡滿一歲或直到矯正手術(包括開心及心導管手術)為止。

II 一歲之內接受體外循環開心矯正手術者，術後出院前再給一劑。

III 最多施打六劑。

8.2.9. Thalidomide (如 Thado) (100/2/1)

1. 用於中度至重度癩瘋性結節性紅斑(ERYTHEMA NODOSUM LEPROSUM, ENL)出現皮膚徵兆之急性期治療。
2. 可持續用於預防及抑制 ENL 皮膚徵兆復發。
3. 不可單獨用於治療發生

| | | |
|--|--|--|
| <p>中度至重度神經炎之 ENL。</p> <p>4. 需事前審查核准後使用。</p> <p>8.2.10. Eculizumab (如 Soliris) (101/4/1、102/10/1)</p> <p>一、限用於陣發性夜間血紅素尿症患者且 PNH granulocyte clone size 經兩種抗體確認大於 50%，並符合下列條件之一者使用：</p> <p>(一)有溶血性貧血，血紅素濃度至少有兩次檢測數值低於 7g/dL 或有心肺功能不全症狀 (New York Heart Association Class III 或 IV) 且血紅素濃度低於 9g/dL，並須長期大量輸血 (3 個月內至少輸血 6 個單位以上)。須排除其他原因引起之貧血，包括缺鐵性貧血或出血等。</p> <p>(二)有發生危及生命之虞之血栓並導致明顯器官功能受損者，但須排除其他已知原因引起之血栓。</p> <p>1. 任何位置之動脈血栓。</p> <p>2. 重要部位之靜脈性血栓，包括腦部靜脈、靜脈竇、上下腔靜脈、近端深部靜脈、肝靜脈或肝門靜脈血栓等。</p> <p>(三)發生因血管內溶血導致的進行性腎功能衰</p> | <p>中度至重度神經炎之 ENL。</p> <p>4. 需事前審查核准後使用。</p> <p>8.2.10. Eculizumab (如 Soliris) (101/4/1、102/10/1)</p> <p>一、限用於陣發性夜間血紅素尿症患者且 PNH granulocyte clone size 經兩種抗體確認大於 50%，並符合下列條件之一者使用：</p> <p>(一)有溶血性貧血，血紅素濃度至少有兩次檢測數值低於 7g/dL 或有心肺功能不全症狀 (New York Heart Association Class III 或 IV) 且血紅素濃度低於 9g/dL，並須長期大量輸血 (3 個月內至少輸血 6 個單位以上)。須排除其他原因引起之貧血，包括缺鐵性貧血或出血等。</p> <p>(二)有發生危及生命之虞之血栓並導致明顯器官功能受損者，但須排除其他已知原因引起之血栓。</p> <p>1. 任何位置之動脈血栓。</p> <p>2. 重要部位之靜脈性血栓，包括腦部靜脈、靜脈竇、上下腔靜脈、近端深部靜脈、肝靜脈或肝門靜脈血栓等。</p> <p>(三)發生因血管內溶血導致的進行性腎功能衰</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>竭 (serum creatinine 大於 2.0 mg/dL) , 且無法以其他原因解釋者。</p> <p>二、排除有高危險之骨髓化生不良症候群 (RAEB-1 或 RAEB-2) 的病患。</p> <p>三、新個案需經專家小組特殊專案審查核准後使用, 每次申請期限為 6 個月。</p> <p>四、每 6 個月須重新評估治療結果。若符合下列條件之一, 則不予同意使用。</p> <p>(一)接受治療的患者用藥後病情沒有改善者 (LDH 超過正常值上限的 1.5 倍或最近 3 個月內輸血多於 2 個單位)。</p> <p>(二)PNH granulocyte clone size \leq50%。</p> <p>(三)發生嚴重再生不良性貧血者。 (102/10/1)</p> <p>◎附表三十之一: 全民健康保險使用陣發性夜間血紅素尿症治療藥品 eculizumab 特殊專案審查申請表</p> <p>◎附表三十之二: 陣發性夜間血紅素尿症患者事前申請 Soliris (eculizumab) 用藥檢附資料查檢表</p> <p>8.2.11. Plerixafor (如 Mozobil): (102/12/1)</p> <p>1. 限用於須施行自體移植之非何杰金氏淋巴瘤或</p> | <p>竭 (serum creatinine 大於 2.0 mg/dL) , 且無法以其他原因解釋者。</p> <p>二、排除有高危險之骨髓化生不良症候群 (RAEB-1 或 RAEB-2) 的病患。</p> <p>三、新個案需經專家小組特殊專案審查核准後使用, 每次申請期限為 6 個月。</p> <p>四、每 6 個月須重新評估治療結果。若符合下列條件之一, 則不予同意使用。</p> <p>(一)接受治療的患者用藥後病情沒有改善者 (LDH 超過正常值上限的 1.5 倍或最近 3 個月內輸血多於 2 個單位)。</p> <p>(二)PNH granulocyte clone size \leq50%。</p> <p>(三)發生嚴重再生不良性貧血者。 (102/10/1)</p> <p>◎附表三十之一: 全民健康保險使用陣發性夜間血紅素尿症治療藥品 eculizumab 特殊專案審查申請表</p> <p>◎附表三十之二: 陣發性夜間血紅素尿症患者事前申請 Soliris (eculizumab) 用藥檢附資料查檢表</p> <p>8.2.11. Plerixafor (如 Mozobil): (102/12/1)</p> <p>1. 限用於須施行自體移植之非何杰金氏淋巴瘤或</p> | |
|--|--|--|

多發性骨髓瘤的病患，但驅動不佳者。為至少使用一療程之 G-CSF 合併化學治療的幹細胞驅動治療，收集數量每公斤體重 CD34+細胞少於 2 百萬個才可申請使用。

2. 須經事前審查核准後使用，原則上使用不超過 2 天。
3. 使用第 2 天應確實計算療程中已收集之 CD34+細胞總數，若仍未達每公斤體重 2 百萬個 CD34+細胞，方得再使用 1 天。

8. 2. 12. Canakinumab (如 Ilaris) : (104/8/1)

1. 限具有風濕或免疫專長之醫師處方。
2. 臨床診斷為 Cryopyrin 相關週期性症候群 (CAPS)，包括：嚴重型的家族性冷因性自體發炎症候群 (FCAS)/ 家族性寒冷蕁麻疹 (FCU)、Muckle-Wells 症候群 (MWS)、新生兒多重系統發炎疾病 (NOMID)/ 慢性嬰兒神經學、皮膚、關節症候群 (CINCA)，並符合下列所有條件：
 - (1) 具有 NLRP3 基因突變。
 - (2) 有下列兩個以上之併發症：
 - I. 中樞神經系統併發症。
 - II. 葡萄膜炎。
 - III. 感覺神經性聽

多發性骨髓瘤的病患，但驅動不佳者。為至少使用一療程之 G-CSF 合併化學治療的幹細胞驅動治療，收集數量每公斤體重 CD34+細胞少於 2 百萬個才可申請使用。

2. 須經事前審查核准後使用，原則上使用不超過 2 天。
3. 使用第 2 天應確實計算療程中已收集之 CD34+細胞總數，若仍未達每公斤體重 2 百萬個 CD34+細胞，方得再使用 1 天。

8. 2. 12. Canakinumab (如 Ilaris) : (104/8/1)

1. 限具有風濕或免疫專長之醫師處方。
2. 臨床診斷為 Cryopyrin 相關週期性症候群 (CAPS)，包括：嚴重型的家族性冷因性自體發炎症候群 (FCAS)/ 家族性寒冷蕁麻疹 (FCU)、Muckle-Wells 症候群 (MWS)、新生兒多重系統發炎疾病 (NOMID)/ 慢性嬰兒神經學、皮膚、關節症候群 (CINCA)，並符合下列所有條件：
 - (1) 具有 NLRP3 基因突變。
 - (2) 有下列兩個以上之併發症：
 - I. 中樞神經系統併發症。
 - II. 葡萄膜炎。
 - III. 感覺神經性聽

| | | |
|--|---|--|
| <p>損。</p> <p>IV. 腎臟類澱粉沉積症。</p> <p>(3)hsCRP (high sensitivity CRP) > 1mg/dL 及 ESR > 25mm/h。</p> <p>(4)經一般藥物及類固醇治療 3 個月以上無效。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)初次申請需於給藥兩週後進行療效評估，達療效者方可繼續使用，自初次起計使用期間為 1 年，療效之定義為符合下列條件之一：</p> <p>I. 治療後 hsCRP ≤ 1mg/dL 及 ESR ≤ 25mm/h。</p> <p>II. 治療後 hsCRP 及 ESR 改善程度 ≥ 50%。</p> <p>(2)使用 1 年期間後須暫緩續用，倘 hsCRP 及 ESR 較暫緩續用前上升程度 ≥ 50%，則可申請續用，續用期間為 1 年。hsCRP 檢驗結果上升應排除其他非 CAPS 之情況所引起。</p> <p>第 9 節 抗癌瘤藥物</p> <p>Antineoplastics drugs</p> <p>9.1. Aromatase Inhibitors</p> <p>9.1.1. Exemestane (如 Aromasin Sugar Coated Tablets)：(88/11/1、</p> | <p>損。</p> <p>IV. 腎臟類澱粉沉積症。</p> <p>(3)hsCRP (high sensitivity CRP) > 1mg/dL 及 ESR > 25mm/h。</p> <p>(4)經一般藥物及類固醇治療 3 個月以上無效。</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)初次申請需於給藥兩週後進行療效評估，達療效者方可繼續使用，自初次起計使用期間為 1 年，療效之定義為符合下列條件之一：</p> <p>I. 治療後 hsCRP ≤ 1mg/dL 及 ESR ≤ 25mm/h。</p> <p>II. 治療後 hsCRP 及 ESR 改善程度 ≥ 50%。</p> <p>(2)使用 1 年期間後須暫緩續用，倘 hsCRP 及 ESR 較暫緩續用前上升程度 ≥ 50%，則可申請續用，續用期間為 1 年。hsCRP 檢驗結果上升應排除其他非 CAPS 之情況所引起。</p> <p>第 9 節 抗癌瘤藥物</p> <p>Antineoplastics drugs</p> <p>9.1. Aromatase Inhibitors</p> <p>9.1.1. Exemestane (如 Aromasin Sugar Coated Tablets)：(88/11/1、90/10/1、99/6/1)</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>90/10/1、99/6/1、<u>105/8/1</u>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限停經後或卵巢切除後，且女性荷爾蒙受體 (estrogen receptor) 陽性之晚期乳癌病患，經使用 tamoxifen 無效後，方可使用。 2. 具有雌激素受體陽性之停經婦女，使用 tamoxifen 至少兩年之高危險早期侵犯性乳癌的輔助治療，且不得與 tamoxifen 或其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定：(99/6/1、<u>105/8/1</u>) <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>病歷上應詳細記載手術資料、病理報告</u>(應包含 ER、PR 之檢測結果且無復發現象)。 (2) 本案藥品使用不得超過三年。 <p>9.1.2. Anastrozole (如 Arimidex)：(88/6/1、92/3/1、93/6/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 停經後雌激素接受器為陽性或不清楚之局部晚期或轉移性乳癌第一線治療。(92/3/1) 2. 停經後婦女晚期乳癌，雌激素接受器為陰性，但曾對 tamoxifen 有陽性反應者。(92/3/1) 3. 停經後婦女罹患早期侵犯性乳癌，經外科手術切除後且雌激素接受器為陽性，且有血栓栓塞症或子宮內膜異常增生 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 限停經後或卵巢切除後，且女性荷爾蒙受體 (estrogen receptor) 陽性之晚期乳癌病患，經使用 tamoxifen 無效後，方可使用。 2. 具有雌激素受體陽性之停經婦女，使用 tamoxifen 至少兩年之 <u>腋下淋巴結有轉移之高危險早期侵犯性乳癌的輔助治療</u>，且不得與 tamoxifen 或其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定：(99/6/1) <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>申報時須檢附手術資料、病理報告</u>(應包含 ER、PR 之檢測結果且無復發現象)。 (2) 本案藥品使用不得超過三年。 (3) <u>需經事前審查核准後使用</u>。 <p>9.1.2. Anastrozole (如 Arimidex)：(88/6/1、92/3/1、93/6/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 停經後雌激素接受器為陽性或不清楚之局部晚期或轉移性乳癌第一線治療。(92/3/1) 2. 停經後婦女晚期乳癌，雌激素接受器為陰性，但曾對 tamoxifen 有陽性反應者。(92/3/1) 3. 停經後婦女罹患早期侵犯性乳癌，經外科手術切除後且雌激素接受器為陽性，且有血栓栓塞症或子宮內膜異常增生 | |
|---|--|--|

的高危險群，而無法使用 tamoxifen 治療者。

(93/6/1)

備註：療程期間以不超過五年為原則。血栓栓塞症或子宮內膜異常增生的高危險群需符合下列情形之一：

- (1)有腦血管梗塞病史者。
- (2)有靜脈血栓栓塞症病史者。
- (3)有子宮異常出血病史，且「經陰道超音波檢查」判定為子宮內膜異常增生的高危險群。

9.1.3. Letrozole：

(88/11/1、90/10/1、92/3/1、97/11/1、98/11/1、99/9/1、102/8/1)

1. 接受抗動情激素治療失敗的自然或人工停經後之末期乳癌病人之治療、停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。
2. 停經後且荷爾蒙接受體呈陽性，有淋巴結轉移之乳癌病人，作為 tamoxifen 治療五年後的延伸治療，且不得與其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定：(97/11/1)
 - (1)手術後大於等於 11 年且無復發者不得使

的高危險群，而無法使用 tamoxifen 治療者。

(93/6/1)

備註：療程期間以不超過五年為原則。血栓栓塞症或子宮內膜異常增生的高危險群需符合下列情形之一：

- (1)有腦血管梗塞病史者。
- (2)有靜脈血栓栓塞症病史者。
- (3)有子宮異常出血病史，且「經陰道超音波檢查」判定為子宮內膜異常增生的高危險群。

9.1.3. Letrozole：

(88/11/1、90/10/1、92/3/1、97/11/1、98/11/1、99/9/1、102/8/1)

1. 接受抗動情激素治療失敗的自然或人工停經後之末期乳癌病人之治療、停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。
2. 停經後且荷爾蒙接受體呈陽性，有淋巴結轉移之乳癌病人，作為 tamoxifen 治療五年後的延伸治療，且不得與其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定：(97/11/1)
 - (1)手術後大於等於 11 年且無復發者不得使

| | | |
|---|---|--|
| <p>用。</p> <p>(2)每日最大劑量 2.5mg，使用不得超過四年。</p> <p>3. 停經後且荷爾蒙接受體呈陽性之早期乳癌病人，經外科手術切除後之輔助治療，且不得與 tamoxifen 或其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定： (98/11/1、99/9/1、102/8/1)</p> <p>(1)每日最大劑量 2.5mg，使用不得超過五年；</p> <p>(2)若由 tamoxifen 轉換使用本品，則使用期限合計不得超過5年。</p> <p>4. 病歷上應詳細記載手術資料、病理報告(應包含 ER、PR 之檢測結果且無復發現象)及用藥紀錄(如 tamoxifen 使用五年證明)。</p> <p>9. 2. Carboplatin (如 Paraplatin；Carboplatin inj)： 限</p> <p>1. 卵巢癌患者。</p> <p>2. 腎功能不佳(CCr < 60)或曾作單側或以上腎切除之惡性腫瘤患者使用。</p> <p>9. 3. Docetaxel：(87/7/1、92/11/1、93/8/1、95/8/1、96/1/1、99/6/1、100/1/1、</p> | <p>用。</p> <p>(2)每日最大劑量 2.5mg，使用不得超過四年。</p> <p>3. 停經後且荷爾蒙接受體呈陽性之早期乳癌病人，經外科手術切除後之輔助治療，且不得與 tamoxifen 或其他 aromatase inhibitor 併用。使用時需同時符合下列規定： (98/11/1、99/9/1、102/8/1)</p> <p>(1)每日最大劑量 2.5mg，使用不得超過五年；</p> <p>(2)若由 tamoxifen 轉換使用本品，則使用期限合計不得超過5年。</p> <p>4. 病歷上應詳細記載手術資料、病理報告(應包含 ER、PR 之檢測結果且無復發現象)及用藥紀錄(如 tamoxifen 使用五年證明)。</p> <p>9. 2. Carboplatin (如 Paraplatin；Carboplatin inj)： 限</p> <p>1. 卵巢癌患者。</p> <p>2. 腎功能不佳(CCr < 60)或曾作單側或以上腎切除之惡性腫瘤患者使用。</p> <p>9. 3. Docetaxel：(87/7/1、92/11/1、93/8/1、95/8/1、96/1/1、99/6/1、100/1/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>101/9/1)</p> <p>1. 乳癌：</p> <p>(1) 局部晚期或轉移性乳癌。</p> <p>(2) 與 anthracycline 合併使用於腋下淋巴結轉移之早期乳癌之術後輔助性化學治療。(99/6/1)</p> <p>(3) 早期乳癌手術後，經診斷為三陰性反應且無淋巴轉移的病人，得作為與 cyclophosphamide 併用 doxorubicin 的化學輔助療法。(101/9/1)</p> <p>2. 非小細胞肺癌：局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。</p> <p>3. 前列腺癌：於荷爾蒙治療失敗之轉移性前列腺癌。</p> <p>4. 頭頸癌：限局部晚期且無遠端轉移之頭頸部鱗狀細胞癌且無法手術切除者，與 cisplatin 及 5-fluorouracil 併用，作為放射治療前的引導治療，限使用 4 個療程。(100/1/1)</p> <p>9. 4. Gemcitabine (如 Gemzar)：(92/12/1、93/8/1、94/10/1、96/5/1、99/10/1、<u>105/2/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1. 晚期或無法手術切除之非小細胞肺癌及胰臟癌病患。</p> | <p>101/9/1)</p> <p>1. 乳癌：</p> <p>(1) 局部晚期或轉移性乳癌。</p> <p>(2) 與 anthracycline 合併使用於腋下淋巴結轉移之早期乳癌之術後輔助性化學治療。(99/6/1)</p> <p>(3) 早期乳癌手術後，經診斷為三陰性反應且無淋巴轉移的病人，得作為與 cyclophosphamide 併用 doxorubicin 的化學輔助療法。(101/9/1)</p> <p>2. 非小細胞肺癌：局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。</p> <p>3. 前列腺癌：於荷爾蒙治療失敗之轉移性前列腺癌。</p> <p>4. 頭頸癌：限局部晚期且無遠端轉移之頭頸部鱗狀細胞癌且無法手術切除者，與 cisplatin 及 5-fluorouracil 併用，作為放射治療前的引導治療，限使用 4 個療程。(100/1/1)</p> <p>9. 4. Gemcitabine (如 Gemzar)：(92/12/1、93/8/1、94/10/1、96/5/1、99/10/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. 晚期或無法手術切除之非小細胞肺癌及胰臟癌病患。</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. 晚期膀胱癌病患。 (92/12/1)</p> <p>3. Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患。 (94/10/1)</p> <p>4. 用於曾經使用含鉑類藥物 (platinum-based) 治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療。 (96/5/1、99/10/1)</p> <p><u>5. 無法手術切除或晚期或復發之膽道癌(含肝內膽管)病患。(105/2/1)</u></p> <p>9. 5. Paclitaxel 成分注射劑：(88/8/1、88/11/1、89/6/1、89/10/1、91/4/1、91/8/1、93/8/1、94/1/1、98/8/1) 限用於</p> <p>1. 晚期卵巢癌，作為第一線治療時需與 cisplatin 併用。 (94/1/1)</p> <p>2. 非小細胞肺癌，作為第一線用藥時需與 cisplatin 併用。 (94/1/1)</p> <p>3. 已使用合併療法 (除非有禁忌症、至少應包括使用 anthracycline) 失敗的轉移性乳癌患者。 (91/4/1、94/1/1)</p> <p>4. 腋下淋巴轉移之乳癌且動情素受體為陰性之患</p> | <p>2. 晚期膀胱癌病患。 (92/12/1)</p> <p>3. Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患。 (94/10/1)</p> <p>4. 用於曾經使用含鉑類藥物 (platinum-based) 治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療。 (96/5/1、99/10/1)</p> <p>9. 5. Paclitaxel 成分注射劑：(88/8/1、88/11/1、89/6/1、89/10/1、91/4/1、91/8/1、93/8/1、94/1/1、98/8/1) 限用於</p> <p>1. 晚期卵巢癌，作為第一線治療時需與 cisplatin 併用。 (94/1/1)</p> <p>2. 非小細胞肺癌，作為第一線用藥時需與 cisplatin 併用。 (94/1/1)</p> <p>3. 已使用合併療法 (除非有禁忌症、至少應包括使用 anthracycline) 失敗的轉移性乳癌患者。 (91/4/1、94/1/1)</p> <p>4. 腋下淋巴轉移之乳癌且動情素受體為陰性之患</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>者，paclitaxel 可作為接續含 doxorubicin 在內之輔助化學治療。 (91/4/1、94/1/1、98/8/1)</p> <p>5. 卡波西氏肉瘤第二線用藥。(88/11/1)</p> <p>9. 6. Streptococcus pyrogene (如 Picibanil)： 限惡性腫瘤患者患有惡性腹水，肋膜積水或心包膜積水時使用，需檢附病歷摘要。</p> <p>9. 7. Protein bound polysaccharide (PSK，如 Krestin)： (87/7/1、94/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限胃癌病人經手術完全切除後，且同時接受化學治療者，並需經事前審查核准後使用。 2. 每一個案每半年需重新評估一次，用藥期間若有復發情形應即停止使用本品。(94/1/1) 3. 使用本品至多以一年為限。(94/1/1) <p>9. 8. Toremifene tab (如 Fareston)：(88/6/1) 限用於停經後，且女性荷爾蒙接受體(estrogen receptor)為陽性之轉移性乳癌病患。</p> <p>9. 9. Vinorelbine： (91/1/1、95/6/1、96/9/1、101/3/1) 附表九之十二</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於： (1)晚期或無法手術切除 | <p>者，paclitaxel 可作為接續含 doxorubicin 在內之輔助化學治療。 (91/4/1、94/1/1、98/8/1)</p> <p>5. 卡波西氏肉瘤第二線用藥。(88/11/1)</p> <p>9. 6. Streptococcus pyrogene (如 Picibanil)： 限惡性腫瘤患者患有惡性腹水，肋膜積水或心包膜積水時使用，需檢附病歷摘要。</p> <p>9. 7. Protein bound polysaccharide (PSK，如 Krestin)： (87/7/1、94/1/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限胃癌病人經手術完全切除後，且同時接受化學治療者，並需經事前審查核准後使用。 2. 每一個案每半年需重新評估一次，用藥期間若有復發情形應即停止使用本品。(94/1/1) 3. 使用本品至多以一年為限。(94/1/1) <p>9. 8. Toremifene tab (如 Fareston)：(88/6/1) 限用於停經後，且女性荷爾蒙接受體(estrogen receptor)為陽性之轉移性乳癌病患。</p> <p>9. 9. Vinorelbine： (91/1/1、95/6/1、96/9/1、101/3/1) 附表九之十二</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於： (1)晚期或無法手術切除 | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>之非小細胞肺癌及轉移性乳癌病患。</p> <p>(2)病理分期第二期及第三期前半(stage II & stage IIIA)非小細胞肺癌於接受根治性手術後與鉑金類藥品併用之輔助治療，需事前審查後使用，最長以4療程為限。</p> <p>2. 本成分之口服劑型與注射劑型不得併用。</p> <p>9. 10. Oxaliplatin： (89/7/1、91/10/1、93/8/1、98/2/1、98/3/1、98/7/1、102/9/1、102/12/1)</p> <p>1. 和 5-FU 和 folinic acid 併用</p> <p>(1)治療轉移性結腸直腸癌，惟若再加用 irinotecan (如 Campto)則不予給付。(91/10/1)</p> <p>(2)作為第三期結腸癌 (Duke's C) 原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。(98/2/1)</p> <p>2. 與 capecitabine 併用，可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。(98/2/1、98/3/1、98/7/1、102/9/1、102/12/1)</p> <p>9. 11. Uracil-Tegafur：(如 Ufur)(100/1/1)</p> <p>1. 限轉移性胃癌、轉移性直腸癌、轉移性結腸癌、轉移性乳癌之病患使用 (89/10/1、</p> | <p>之非小細胞肺癌及轉移性乳癌病患。</p> <p>(2)病理分期第二期及第三期前半(stage II & stage IIIA)非小細胞肺癌於接受根治性手術後與鉑金類藥品併用之輔助治療，需事前審查後使用，最長以4療程為限。</p> <p>2. 本成分之口服劑型與注射劑型不得併用。</p> <p>9. 10. Oxaliplatin： (89/7/1、91/10/1、93/8/1、98/2/1、98/3/1、98/7/1、102/9/1、102/12/1)</p> <p>1. 和 5-FU 和 folinic acid 併用</p> <p>(1)治療轉移性結腸直腸癌，惟若再加用 irinotecan (如 Campto)則不予給付。(91/10/1)</p> <p>(2)作為第三期結腸癌 (Duke's C) 原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。(98/2/1)</p> <p>2. 與 capecitabine 併用，可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。(98/2/1、98/3/1、98/7/1、102/9/1、102/12/1)</p> <p>9. 11. Uracil-Tegafur：(如 Ufur)(100/1/1)</p> <p>1. 限轉移性胃癌、轉移性直腸癌、轉移性結腸癌、轉移性乳癌之病患使用 (89/10/1、</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>97/12/1)。</p> <p>2. 頭頸部鱗狀上皮癌 (93/4/1、98/3/1、 99/10/1)。</p> <p>3. 與 cisplatin 併用治療 轉移及末期肺癌。</p> <p>4. 直腸癌、結腸癌第Ⅱ、 Ⅲ期患者之術後輔助性 治療，且使用期限不得 超過 2 年(94/10/1、 97/12/1)</p> <p>5. 用於病理分期為 T2 且腫 瘤\geq3cm 之肺腺癌病 人，作為手術後輔助治 療，使用期限以二年為 限。(100/1/1)</p> <p>9.12. Irinotecan (如 Campto injection)： (90/10/1、93/8/1) 限轉移性大腸直腸癌之 第一線治療藥物：</p> <p>1. 與 5-FU 及 folinic acid 合併，使用於未曾 接受過化學治療之患 者。</p> <p>2. 單獨使用於曾接受 5-FU 療程治療無效之患者。</p> <p>9.13. Aldesleukin (如 Proleukin for Injection)：(90/10/1、 93/8/1) 限轉移性腎細胞癌及惡 性黑色素癌病患使用。</p> <p>9.14. Doxorubicin hydrochloride liposome injection (如 Lipo- Dox、Caelyx)： (91/3/1、93/8/1、 93/11/1、99/10/1) 限用於下列適應症：</p> | <p>97/12/1)。</p> <p>2. 頭頸部鱗狀上皮癌 (93/4/1、98/3/1、 99/10/1)。</p> <p>3. 與 cisplatin 併用治療 轉移及末期肺癌。</p> <p>4. 直腸癌、結腸癌第Ⅱ、 Ⅲ期患者之術後輔助性 治療，且使用期限不得 超過 2 年(94/10/1、 97/12/1)</p> <p>5. 用於病理分期為 T2 且腫 瘤\geq3cm 之肺腺癌病 人，作為手術後輔助治 療，使用期限以二年為 限。(100/1/1)</p> <p>9.12. Irinotecan (如 Campto injection)： (90/10/1、93/8/1) 限轉移性大腸直腸癌之 第一線治療藥物：</p> <p>1. 與 5-FU 及 folinic acid 合併，使用於未曾 接受過化學治療之患 者。</p> <p>2. 單獨使用於曾接受 5-FU 療程治療無效之患者。</p> <p>9.13. Aldesleukin (如 Proleukin for Injection)：(90/10/1、 93/8/1) 限轉移性腎細胞癌及惡 性黑色素癌病患使用。</p> <p>9.14. Doxorubicin hydrochloride liposome injection (如 Lipo- Dox、Caelyx)： (91/3/1、93/8/1、 93/11/1、99/10/1) 限用於下列適應症：</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(99/10/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於治療曾接受第一線含 platinum 及 paclitaxel 化學治療而失敗者或再復發之進行性或轉移性卵巢癌病人。(91/3/1) 2. 用於治療 CD4 數量低下 (< 200 CD4 lymphocyte/mm³) 和粘膜、皮膚或內臟有病變的 AIDS related Kaposi' s Sarcoma 的病人。(91/3/1) 3. 用於單一治療有心臟疾病風險考量之轉移性乳癌患者。(93/11/1) <p>9.15. Tretinoin (如 Vesanoid Soft Gelatin) : (88/10/1) 限急性前髓性白血病使用。</p> <p>9.16. Topotecan (如 Hycamtin) : (88/10/1、93/8/1、98/11/1、100/6/1)</p> <p>9.16.1. Topotecan 注射劑 (88/10/1、93/8/1、98/11/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限卵巢癌及小細胞肺癌之第二線化學治療 (第一線治療應包括白金化合物)。 2. 與 cisplatin 併用適用於治療經組織學檢查確定患有第 IV-B 期復發性或持續性子宮頸癌, 且不適合以外科手術及 (或) 放射療法進行治療的患者。(98/11/1) | <p>(99/10/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於治療曾接受第一線含 platinum 及 paclitaxel 化學治療而失敗者或再復發之進行性或轉移性卵巢癌病人。(91/3/1) 2. 用於治療 CD4 數量低下 (< 200 CD4 lymphocyte/mm³) 和粘膜、皮膚或內臟有病變的 AIDS related Kaposi' s Sarcoma 的病人。(91/3/1) 3. 用於單一治療有心臟疾病風險考量之轉移性乳癌患者。(93/11/1) <p>9.15. Tretinoin (如 Vesanoid Soft Gelatin) : (88/10/1) 限急性前髓性白血病使用。</p> <p>9.16. Topotecan (如 Hycamtin) : (88/10/1、93/8/1、98/11/1、100/6/1)</p> <p>9.16.1. Topotecan 注射劑 (88/10/1、93/8/1、98/11/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限卵巢癌及小細胞肺癌之第二線化學治療 (第一線治療應包括白金化合物)。 2. 與 cisplatin 併用適用於治療經組織學檢查確定患有第 IV-B 期復發性或持續性子宮頸癌, 且不適合以外科手術及 (或) 放射療法進行治療的患者。(98/11/1) | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>9.16.2. Topotecan 口服劑型 (100/6/1) 限用於小細胞肺癌之第二線化學治療 (第一線治療應包括白金化合物)。</p> <p>9.17. Capecitabine (如 Xeloda) : (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1)</p> <p>1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>2. 單獨用於對 taxanes 及 anthracycline 化學治療無效，或無法使用 anthracycline 治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>3. 治療轉移性結腸直腸癌的第一線用藥。(92/6/1)</p> <p>4. 第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法，以八個療程為限。(96/9/1)</p> <p>5. Capecitabine 合併 platinum 可使用於晚期胃癌之第一線治療。(97/12/1)</p> <p>9.18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、<u>105/11/1</u>)</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、</p> | <p>9.16.2. Topotecan 口服劑型 (100/6/1) 限用於小細胞肺癌之第二線化學治療 (第一線治療應包括白金化合物)。</p> <p>9.17. Capecitabine (如 Xeloda) : (88/10/1、91/4/1、92/6/1、93/8/1、96/9/1、97/12/1)</p> <p>1. Capecitabine 與 docetaxel 併用於治療對 anthracycline 化學治療無效之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>2. 單獨用於對 taxanes 及 anthracycline 化學治療無效，或無法使用 anthracycline 治療之局部晚期或轉移性乳癌病患。</p> <p>3. 治療轉移性結腸直腸癌的第一線用藥。(92/6/1)</p> <p>4. 第三期結腸癌患者手術後的輔助性療法，以八個療程為限。(96/9/1)</p> <p>5. Capecitabine 合併 platinum 可使用於晚期胃癌之第一線治療。(97/12/1)</p> <p>9.18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1) <u>附表七之一</u></p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>99/8/1、99/10/1、101/1/1)</p> <p>(1) 外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥。 (99/10/1、101/1/1)</p> <p>(2) 使用至多以一年為限(99/8/1)。</p> <p>2. 轉移性乳癌</p> <p>(1) 單獨使用於治療腫瘤細胞上有 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)，曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。 (91/4/1、99/1/1)</p> <p>(2) 與 paclitaxel 或 docetaxel 併用，使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患，且為 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)者。(93/8/1、95/2/1、99/1/1)</p> <p>(3) 轉移性乳癌且 HER2 過度表現之病人，僅限先前未使用過本藥品者方可使用。 (99/1/1)</p> <p>3. 經事前審查核准後使用，核准後每 24 週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請</p> | <p>99/8/1、99/10/1、101/1/1)</p> <p>(1) 外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥。 (99/10/1、101/1/1)</p> <p>(2) 使用至多以一年為限(99/8/1)。</p> <p>2. 轉移性乳癌</p> <p>(1) 單獨使用於治療腫瘤細胞上有 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)，曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。 (91/4/1、99/1/1)</p> <p>(2) 與 paclitaxel 或 docetaxel 併用，使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患，且為 HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)者。(93/8/1、95/2/1、99/1/1)</p> <p>(3) 轉移性乳癌且 HER2 過度表現之病人，僅限先前未使用過本藥品者方可使用。 (99/1/1)</p> <p>3. 經事前審查核准後使用。</p> | |
|--|--|--|

(105/11/1)。

9.19. Estramustine sod.
phosphate monohydrate
(如 Estracyt)：

(91/4/1)

限晚期前列腺癌病患且
符合下列條件之一者使
用：

1. 經荷爾蒙治療無效。
2. 經診斷對單獨使用荷爾
蒙治療，具有預後療效
不佳因素的初次治療病
患。

9.20. Rituximab 注射劑 (如
Mabthera)： (91/4/1、
93/1/1、95/3/1、
97/2/1、102/1/1、
103/2/1、103/9/1、
104/6/1)

限用於

1. 復發或對化學療效有
抗性之低惡度 B 細胞
非何杰金氏淋巴瘤。
(91/4/1)
2. 併用 CHOP 或其他化學
療法，用於 CD20 抗原
陽性之 B 瀰漫性大細
胞非何杰金氏淋巴瘤
之病患。(93/1/1、
95/3/1)
3. 併用 CVP 化學療法，
用於未經治療之和緩
性 (組織型態為濾泡
型) B 細胞非何杰金
氏淋巴瘤的病人。
(95/3/1)
4. 作為濾泡性淋巴瘤患
者於接受含 rituximab
誘導化學治療後產生
反應(達 partial

9.19. Estramustine sod.
phosphate monohydrate
(如 Estracyt)：

(91/4/1)

限晚期前列腺癌病患且
符合下列條件之一者使
用：

1. 經荷爾蒙治療無效。
2. 經診斷對單獨使用荷爾
蒙治療，具有預後療效
不佳因素的初次治療病
患。

9.20. Rituximab 注射劑 (如
Mabthera)： (91/4/1、
93/1/1、95/3/1、
97/2/1、102/1/1、
103/2/1、103/9/1、
104/6/1)

限用於

1. 復發或對化學療效有
抗性之低惡度 B 細胞
非何杰金氏淋巴瘤。
(91/4/1)
2. 併用 CHOP 或其他化學
療法，用於 CD20 抗原
陽性之 B 瀰漫性大細
胞非何杰金氏淋巴瘤
之病患。(93/1/1、
95/3/1)
3. 併用 CVP 化學療法，
用於未經治療之和緩
性 (組織型態為濾泡
型) B 細胞非何杰金
氏淋巴瘤的病人。
(95/3/1)
4. 作為濾泡性淋巴瘤患
者於接受含 rituximab
誘導化學治療後產生
反應(達 partial

| | | |
|---|---|--|
| <p>remission 或 complete remission) 之病患，若在接受含 rituximab 誘導化學治療前有下列情形之一者，得接受 rituximab 維持治療，限用八劑，每三個月使用一劑，最多不超過二年。(97/2/1、104/6/1)</p> <p>(1)有單一腫瘤直徑超過 7 公分者；</p> <p>(2)有超過三顆腫瘤直徑超過 3 公分者；</p> <p>(3)脾臟腫大，其長度超過 16 公分者；</p> <p>(4)對 vital organs 造成擠壓者；</p> <p>(5)周邊血中出現淋巴球增生超過 5000/mm³ 者；</p> <p>(6)出現任一系列血球低下者 (platelet<100,000/mm³，或 Hb<10gm/dL，或 absolute neutrophil count<1500/mm³)。</p> <p>5. 慢性淋巴球性白血病：(103/2/1)</p> <p>(1) Rai Stage III/IV (或 Binet C 級)之 CLL 病人。若用於 Rai Stage I/II (或 Binet A/B 級) 併有疾病相關免疫性症候(如自體免疫性溶血、免疫性</p> | <p>remission 或 complete remission) 之病患，若在接受含 rituximab 誘導化學治療前有下列情形之一者，得接受 rituximab 維持治療，限用八劑，每三個月使用一劑，最多不超過二年。(97/2/1、104/6/1)</p> <p>(1)有單一腫瘤直徑超過 7 公分者；</p> <p>(2)有超過三顆腫瘤直徑超過 3 公分者；</p> <p>(3)脾臟腫大，其長度超過 16 公分者；</p> <p>(4)對 vital organs 造成擠壓者；</p> <p>(5)周邊血中出現淋巴球增生超過 5000/mm³ 者；</p> <p>(6)出現任一系列血球低下者 (platelet<100,000/mm³，或 Hb<10gm/dL，或 absolute neutrophil count<1500/mm³)。</p> <p>5. 慢性淋巴球性白血病：(103/2/1)</p> <p>(1) Rai Stage III/IV (或 Binet C 級)之 CLL 病人。若用於 Rai Stage I/II (或 Binet A/B 級) 併有疾病相關免疫性症候(如自體免疫性溶血、免疫性</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>血小板低下紫癍症等)的病人時，需經過至少一種標準的烷化基劑治療無效或病情惡化者，且 CD20 陽性細胞須大於 50%。</p> <p>(2) 與化學療法併用，做為復發或頑固性的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病患者之治療用藥，且 CD20 陽性細胞須大於 50%。</p> <p>(3) 初次申請最多六個(月)療程，再次申請以三個療程為限。</p> <p>6. 與類固醇併用，治療嗜中性白血球細胞質抗體(ANCA)陽性之肉芽腫性血管炎及顯微多發性血管炎病人：</p> <p>(103/9/1)</p> <p>(1) 需經事前審查核准後使用，診斷需有病理報告確定及血清學檢驗結果。</p> <p>(2) 初次發作之肉芽腫性血管炎及顯微多發性血管炎，經 cyclophosphamide 治療 4 週以上但療效不佳者。</p> <p>(3) 復發之肉芽腫性血管炎(GPA，或稱為韋格納肉芽腫症 Wegener's granulomatosis) 及顯微多發性血管</p> | <p>血小板低下紫癍症等)的病人時，需經過至少一種標準的烷化基劑治療無效或病情惡化者，且 CD20 陽性細胞須大於 50%。</p> <p>(2) 與化學療法併用，做為復發或頑固性的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病患者之治療用藥，且 CD20 陽性細胞須大於 50%。</p> <p>(3) 初次申請最多六個(月)療程，再次申請以三個療程為限。</p> <p>6. 與類固醇併用，治療嗜中性白血球細胞質抗體(ANCA)陽性之肉芽腫性血管炎及顯微多發性血管炎病人：</p> <p>(103/9/1)</p> <p>(1) 需經事前審查核准後使用，診斷需有病理報告確定及血清學檢驗結果。</p> <p>(2) 初次發作之肉芽腫性血管炎及顯微多發性血管炎，經 cyclophosphamide 治療 4 週以上但療效不佳者。</p> <p>(3) 復發之肉芽腫性血管炎(GPA，或稱為韋格納肉芽腫症 Wegener's granulomatosis) 及顯微多發性血管</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>炎(MPA)，先前曾接受過 cyclophosphamide 治療者。</p> <p>(4)對 cyclophosphamide 治療無法耐受且有 具體事證，或具使 用禁忌之肉芽腫性 血管炎及顯微多發 性血管炎。</p> <p>(5)每次申請，以治療 4週之療程為限。復 發時可再次申請。</p> <p>註：原發(初次發作) 之肉芽腫性血管 炎及顯微多發性 血管炎，經 cyclophosphamid e 治療 4 週以上 但療效不佳者之 定義為： 經 cyclophosphamid e 治療 4 週以 上，但至少有一 項受侵犯的主要 器官症狀未能改 善，包括： A 肺部 B 腎臟 C 神經系統 D 腸胃道系統 申請時需檢附病 歷及病理及影像 資料等，經專科 醫師事前審查同 意後使用。</p> <p>7. 使用於 1、4、5 及 6 病人時，需經事前審查</p> | <p>炎(MPA)，先前曾接 受過 cyclophosphamide 治療者。</p> <p>(4)對 cyclophosphamide 治療無法耐受且有 具體事證，或具使 用禁忌之肉芽腫性 血管炎及顯微多發 性血管炎。</p> <p>(5)每次申請，以治療 4週之療程為限。復 發時可再次申請。</p> <p>註：原發(初次發作) 之肉芽腫性血管 炎及顯微多發性 血管炎，經 cyclophosphamid e 治療 4 週以上 但療效不佳者之 定義為： 經 cyclophosphamid e 治療 4 週以 上，但至少有一 項受侵犯的主要 器官症狀未能改 善，包括： A 肺部 B 腎臟 C 神經系統 D 腸胃道系統 申請時需檢附病 歷及病理及影像 資料等，經專科 醫師事前審查同 意後使用。</p> <p>7. 使用於 1、4、5 及 6 病人時，需經事前審查</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>核准後使用。 (102/1/1、103/2/1、103/9/1)</p> <p>9. 21. Fludarabine (如 Fludara Oral, Film - Coated Tablet 及 Fludara Lyophilized IV Injection)： (92/12/1、93/3/1、94/10/1、99/ 10 /1) 附表八之一</p> <p>1. 用於 B-細胞慢性淋巴性白血病 (CLL) 病患的起始治療及 CLL 與低惡性度 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤 (Indolent B-Cell NHL) 病患，歷經至少一種標準內容的烷化基藥劑 (alkylating agent) 的治療方法都無效，或治療後雖有效但隨後疾病又繼續惡化的病人。</p> <p>2. 以本品作為第一線治療，限用於(94/10/1)。</p> <p>(1) Rai Stage III/IV (或 Binet C 級) 之 CLL 病人。若用於 Rai Stage I/II (或 Binet A/B 級) 併有疾病相關免疫性症候 (如自體免疫性溶血、免疫性血小板低下紫癥等) 的病人時，需經過至少一種標準的烷化基劑治療無效或病情惡化者。</p> <p>(2) 每次申請最多六個 (月) 療程，再次申請以三個療程為限。</p> | <p>核准後使用。 (102/1/1、103/2/1、103/9/1)</p> <p>9. 21. Fludarabine (如 Fludara Oral, Film - Coated Tablet 及 Fludara Lyophilized IV Injection)： (92/12/1、93/3/1、94/10/1、99/ 10 /1) 附表八之一</p> <p>1. 用於 B-細胞慢性淋巴性白血病 (CLL) 病患的起始治療及 CLL 與低惡性度 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤 (Indolent B-Cell NHL) 病患，歷經至少一種標準內容的烷化基藥劑 (alkylating agent) 的治療方法都無效，或治療後雖有效但隨後疾病又繼續惡化的病人。</p> <p>2. 以本品作為第一線治療，限用於(94/10/1)。</p> <p>(1) Rai Stage III/IV (或 Binet C 級) 之 CLL 病人。若用於 Rai Stage I/II (或 Binet A/B 級) 併有疾病相關免疫性症候 (如自體免疫性溶血、免疫性血小板低下紫癥等) 的病人時，需經過至少一種標準的烷化基劑治療無效或病情惡化者。</p> <p>(2) 每次申請最多六個 (月) 療程，再次申請以三個療程為限。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>3. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9.22. Imatinib (如 Glivec) : (91/5/1、93/7/1、97/8/1、99/6/1、100/ 2/ 1、102/9/1)附表九之八限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治療正值急性轉化期 (blast crisis)、加速期或經 ALPHA-干擾素治療無效之慢性期的慢性骨髓性白血病 (CML) 患者使用。 2. 用於治療初期診斷為慢性骨髓性白血病 (CML) 的病人。 3. 惡性胃腸道基質瘤 (GIST) : <ol style="list-style-type: none"> (1) 治療成年人無法手術切除或轉移的惡性胃腸道基質瘤。 (2) 作為成人胃腸道基質瘤完全切除後之術後輔助治療，符合下列一項條件可使用 3 年，須事前審查核准後使用。 <ol style="list-style-type: none"> A. 腫瘤大於 10 公分。 B. 有絲分裂指數 > 10/50 HPF(high power field)。 C. 腫瘤大於 5 公分且有絲分裂指數 > 5/50 HPF(high power field)。 D. 腫瘤破裂。 4. 治療初診斷為費城染色體陽性急性淋巴性白血 | <p>3. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9.22. Imatinib (如 Glivec) : (91/5/1、93/7/1、97/8/1、99/6/1、100/ 2/ 1、102/9/1)附表九之八限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治療正值急性轉化期 (blast crisis)、加速期或經 ALPHA-干擾素治療無效之慢性期的慢性骨髓性白血病 (CML) 患者使用。 2. 用於治療初期診斷為慢性骨髓性白血病 (CML) 的病人。 3. 惡性胃腸道基質瘤 (GIST) : <ol style="list-style-type: none"> (1) 治療成年人無法手術切除或轉移的惡性胃腸道基質瘤。 (2) 作為成人胃腸道基質瘤完全切除後之術後輔助治療，符合下列一項條件可使用 3 年，須事前審查核准後使用。 <ol style="list-style-type: none"> A. 腫瘤大於 10 公分。 B. 有絲分裂指數 > 10/50 HPF(high power field)。 C. 腫瘤大於 5 公分且有絲分裂指數 > 5/50 HPF(high power field)。 D. 腫瘤破裂。 4. 治療初診斷為費城染色體陽性急性淋巴性白血 | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>病 (Ph+ ALL)且併用化療之成年人。(99/6/1)</p> <p>5. 未曾使用 imatinib 治療之成人復發性或難治性費城染色體陽性急性淋巴性白血病(Ph+ ALL)之單一療法。(99/6/1)</p> <p>6. 下列適應症患者必須在第一線的藥物如 hydroxyurea;corticosteroid 等無效後，經事前審查核准才可使用，且每 6 個月需重新申請審查。(99/6/1)</p> <p>(1)治療患有與血小板衍生生長因子受體 (PDGFR)基因重組相關之骨髓發育不全症候群(MDS)/骨髓增生性疾病(MPD)之成人。</p> <p>(2)治療嗜伊紅性白血球增加症候群(HES)與/或慢性嗜伊紅性白血病(CEL)且有血小板衍生生長因子受體 (PDGFR)基因重組之成人患者，且存在器官侵犯證據者。</p> <p>7. 治療患有無法手術切除、復發性或轉移性且有血小板衍生生長因子受體(PDGFR)基因重組之隆突性皮膚纖維肉瘤 (DFSP)之成人患者。(99/ 6/1)</p> <p>9. 23. Arsenic trioxide (如 Asadin Inj.) : (91/8/1、92/9/1) 限用於急性前骨髓細胞白血病患者。</p> | <p>病 (Ph+ ALL)且併用化療之成年人。(99/6/1)</p> <p>5. 未曾使用 imatinib 治療之成人復發性或難治性費城染色體陽性急性淋巴性白血病(Ph+ ALL)之單一療法。(99/6/1)</p> <p>6. 下列適應症患者必須在第一線的藥物如 hydroxyurea;corticosteroid 等無效後，經事前審查核准才可使用，且每 6 個月需重新申請審查。(99/6/1)</p> <p>(1)治療患有與血小板衍生生長因子受體 (PDGFR)基因重組相關之骨髓發育不全症候群(MDS)/骨髓增生性疾病(MPD)之成人。</p> <p>(2)治療嗜伊紅性白血球增加症候群(HES)與/或慢性嗜伊紅性白血病(CEL)且有血小板衍生生長因子受體 (PDGFR)基因重組之成人患者，且存在器官侵犯證據者。</p> <p>7. 治療患有無法手術切除、復發性或轉移性且有血小板衍生生長因子受體(PDGFR)基因重組之隆突性皮膚纖維肉瘤 (DFSP)之成人患者。(99/ 6/1)</p> <p>9. 23. Arsenic trioxide (如 Asadin Inj.) : (91/8/1、92/9/1) 限用於急性前骨髓細胞白血病患者。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>9. 24. Gefitinib (如 Iressa):(93/11/1、96/8/1、96/11/1、100/6/1、101/5/1、101/10/1、103/5/1) 附表九之一</p> <p>1. 限單獨使用於</p> <p>(1)具有 EGFR-TK 基因突變之局部侵犯性或轉移性(即第ⅢB期或第Ⅳ期)之肺腺癌病患之第一線治療。 (100/6/1)</p> <p>(2)先前已使用過第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌。(96/11/1、100/6/1)</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)用於第一線用藥：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，及 EGFR-TK 基因突變檢測報告。 (100/6/1)</p> <p>(2)用於第二線以上用藥：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療之證明，及目前又有疾病惡化之影像診斷證明(如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影</p> | <p>9. 24. Gefitinib (如 Iressa):(93/11/1、96/8/1、96/11/1、100/6/1、101/5/1、101/10/1、103/5/1) 附表九之一</p> <p>1. 限單獨使用於</p> <p>(1)具有 EGFR-TK 基因突變之局部侵犯性或轉移性(即第ⅢB期或第Ⅳ期)之肺腺癌病患之第一線治療。 (100/6/1)</p> <p>(2)先前已使用過第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之肺腺癌。(96/11/1、100/6/1)</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用：</p> <p>(1)用於第一線用藥：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，及 EGFR-TK 基因突變檢測報告。 (100/6/1)</p> <p>(2)用於第二線以上用藥：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療之證明，及目前又有疾病惡化之影像診斷證明(如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>像)，此影像證明以可測量 (measurable) 的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估 (evaluable) 的病灶亦可採用。 (96/11/1、100/6/1、101/10/1)</p> <p>(3)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像 (如胸部 X 光或電腦斷層) (101/5/1)。</p> <p>3. 醫師每次開藥以 4 週為限。(101/10/1)</p> <p>4. 本藥品與 erlotinib(如 Tarceva)及 afatinib(如 Giotrif) 不得併用。(96/8/1、103/5/1)</p> <p>9. 25. Temozolomide (如 Temodal)：(94/3/1、97/1/1、98/9/1) 附表八之二 限用於</p> <p>1. 經手術或放射線治療後復發之下列病人： (1)退行性星狀細胞瘤 (AA- anaplastic</p> | <p>像)，此影像證明以可測量 (measurable) 的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估 (evaluable) 的病灶亦可採用。 (96/11/1、100/6/1、101/10/1)</p> <p>(3)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像 (如胸部 X 光或電腦斷層) (101/5/1)。</p> <p>3. 醫師每次開藥以 4 週為限。(101/10/1)</p> <p>4. 本藥品與 erlotinib(如 Tarceva)及 afatinib(如 Giotrif) 不得併用。(96/8/1、103/5/1)</p> <p>9. 25. Temozolomide (如 Temodal)：(94/3/1、97/1/1、98/9/1) 附表八之二 限用於</p> <p>1. 經手術或放射線治療後復發之下列病人： (1)退行性星狀細胞瘤 (AA- anaplastic</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>astrocytoma)</p> <p>(2)多形神經膠母細胞瘤 (GBM -Glioblastoma multiforme)</p> <p>(3)退行性寡樹突膠質細胞瘤(anaplastic oligodendroglioma) (98/9/1)</p> <p>2. 新診斷的多形神經膠母細胞瘤，與放射線治療同步進行，然後作為輔助性治療。(97/1/1)</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>4. 若用於退行性寡樹突膠質細胞瘤，每日最大劑量 200mg/m²。每次申請事前審查之療程以三個月為限，再次申請時需附上治療後相關臨床評估資料並檢附 MRI 或 CT 檢查，若復發之惡性膠質細胞瘤有惡化之證據，則必須停止使用。 (98/9/1)</p> <p>9. 26. Pemetrexed (如 Alimta) : (95/3/1、95/7/1、97/11/1、98/9/1、103/4/1、103/9/1) 附表八之三</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)與 cisplatin 併用於惡性肋膜間質細胞瘤。</p> <p>(2)以含鉑之化學療法治療或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍失敗之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌病患(顯著鱗</p> | <p>astrocytoma)</p> <p>(2)多形神經膠母細胞瘤 (GBM -Glioblastoma multiforme)</p> <p>(3)退行性寡樹突膠質細胞瘤(anaplastic oligodendroglioma) (98/9/1)</p> <p>2. 新診斷的多形神經膠母細胞瘤，與放射線治療同步進行，然後作為輔助性治療。(97/1/1)</p> <p>3. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>4. 若用於退行性寡樹突膠質細胞瘤，每日最大劑量 200mg/m²。每次申請事前審查之療程以三個月為限，再次申請時需附上治療後相關臨床評估資料並檢附 MRI 或 CT 檢查，若復發之惡性膠質細胞瘤有惡化之證據，則必須停止使用。 (98/9/1)</p> <p>9. 26. Pemetrexed (如 Alimta) : (95/3/1、95/7/1、97/11/1、98/9/1、103/4/1、103/9/1) 附表八之三</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1)與 cisplatin 併用於惡性肋膜間質細胞瘤。</p> <p>(2)以含鉑之化學療法治療或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍失敗之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌病患(顯著鱗</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>狀細胞組織型除外)之單一藥物治療。(95/7/1、97/11/1、98/9/1)</p> <p>(3)與含鉑類之化學療法併用，作為治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第一線化療用藥，且限用於 ECOG performance status 為 0~1 之病患。(98/9/1)</p> <p>2. 需經事前審查核准後，初次申請以 6 個療程為限，續用應每 4 個療程評估一次，如有發現病情惡化，應即停止使用。(103/4/1、103/9/1)</p> <p>9. 27. Cetuximab (如 Erbitux) : (96/3/1、98/7/1、98/8/1、99/10/1、101/12/1、104/11/1、<u>106/1/1</u>)附表七之三</p> <p>1. 直腸結腸癌治療部分： (1)與 FOLFIRI(Folinic acid/5-fluorouracil/irinotecan) 或 <u>FOLFOX(Folinic acid/5-fluorouracil/oxalip latin)</u>合併使用於治療具表皮生長因子受體表現型(EGFR expressing)，<u>RAS 野生型</u>之轉移性直腸結</p> | <p>狀細胞組織型除外)之單一藥物治療。(95/7/1、97/11/1、98/9/1)</p> <p>(3)與含鉑類之化學療法併用，作為治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第一線化療用藥，且限用於 ECOG performance status 為 0~1 之病患。(98/9/1)</p> <p>2. 需經事前審查核准後，初次申請以 6 個療程為限，續用應每 4 個療程評估一次，如有發現病情惡化，應即停止使用。(103/4/1、103/9/1)</p> <p>9. 27. Cetuximab (如 Erbitux) : (96/3/1、98/7/1、98/8/1、99/10/1、101/12/1、104/11/1)附表七之三</p> <p>1. 直腸結腸癌治療部分： (1)與 FOLFIRI(Folinic acid/5-fluorouracil/irinotecan)合併使用於治療具表皮生長因子受體表現型(EGFR expressing)，<u>KRAS 基因及 NRAS 基因沒有突變</u>之轉移性直腸結腸癌病患之第一線治療。(101/12/1、104/11/1)</p> | |
|---|---|--|

腸癌病患之第一線治療。(101/12/1、104/11/1、106/1/1)

- I. 本藥品需經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 18 週為限，再次申請必須提出客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。
- II. 使用總療程以 36 週為上限。
- III. 本藥品不得與 bevacizumab 併用。

(2) 與 irinotecan 合併使用，治療已接受過含 5-fluorouracil (5-FU)、irinotecan 及 oxaliplatin 二線以上之細胞毒性治療失敗、具有表皮生長因子受體(EGFR)表現型且 K-ras 基因沒有突變的轉移性直腸結腸癌的病患。

(98/8/1)

- I. 本藥需經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 9 週為限，再次申請必須提出客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。
- II. 使用總療程以 18 週為上限。

2. 口咽癌、下咽癌及喉癌

- I. 本藥品需經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 12 週為限，再次申請必須提出客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。
- II. 使用總療程以 24 週為上限。
- III. 本藥品不得與 bevacizumab 併用。

(2) 與 irinotecan 合併使用，治療已接受過含 5-fluorouracil (5-FU)、irinotecan 及 oxaliplatin 二線以上之細胞毒性治療失敗、具有表皮生長因子受體(EGFR)表現型且 K-ras 基因沒有突變的轉移性直腸結腸癌的病患。

(98/8/1)

- I. 本藥需經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 9 週為限，再次申請必須提出客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。
- II. 使用總療程以 18 週為上限。

2. 口咽癌、下咽癌及喉癌

| | | |
|--|--|--|
| <p>治療部分：(98/7/1、99/10/1)</p> <p>(1)限與放射線療法合併使用於局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌患者，且符合下列條件之一：</p> <p>I. 年齡 \geq 70 歲；</p> <p>II. Ccr < 50mL/min；</p> <p>III. 聽力障礙者(聽力障礙定義為 500Hz、1000Hz、2000Hz 平均聽力損失大於 25 分貝)；</p> <p>IV. 無法耐受 platinum-based 化學治療。</p> <p>(2)使用總療程以接受 8 次輸注為上限。</p> <p>(3)需經事前審查核准後使用。</p> <p><u>3. 頭頸癌部分(106/1/1)：</u></p> <p><u>(1)限無法接受局部治療之復發及/或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌，且未曾申報 cetuximab 之病患使用。</u></p> <p><u>(2)使用總療程以 18 週為限，每 9 週申請一次，需無疾病惡化情形方得繼續使用。</u></p> <p>9. 28. Bortezomib (如 Velcade for Injection)： (96/6/1、98/2/1、99/3/1、99/9/1、100/10/1、101/6/1、</p> | <p>治療部分：(98/7/1、99/10 /1)</p> <p>(1)限與放射線療法合併使用於局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌患者，且符合下列條件之一：</p> <p>I. 年齡 \geq 70 歲；</p> <p>II. Ccr < 50mL/min；</p> <p>III. 聽力障礙者(聽力障礙定義為 500Hz、1000Hz、2000Hz 平均聽力損失大於 25 分貝)；</p> <p>IV. 無法耐受 platinum-based 化學治療。</p> <p>(2)使用總療程以接受 8 次輸注為上限。</p> <p>(3)需經事前審查核准後使用。</p> <p>9. 28. Bortezomib (如 Velcade for Injection)： (96/6/1、98/2/1、99/3/1、99/9/1、100/10/1、101/6/1) 附</p> | |
|--|--|--|

105/5/1) 附表九之三

限用於

1. 合併其他癌症治療藥品使用於多發性骨髓瘤病人：(99/3/1、100/10/1、101/6/1)
 - (1)每人以 8 個療程為上限(99/9/1)。
 - (2)需經事前申請後使用，每次申請 4 個療程。(101/6/1)
 - (3)使用 4 個療程後，必須確定藥物使用後 paraprotein (M-protein)未上升(即表示為 response 或 stable status)，或對部分 non-secretory type MM 病人以骨髓檢查 plasma cell 之比率為療效依據，方可申請使用後 4 個療程。(101/6/1)
 - (4)若病患於前 4 個療程符合前項規定(3)之療效，則後續 4 個療程可保留，於疾病復發時，再行申請使用。(101/6/1)
2. 被套細胞淋巴瘤 (Mantle Cell Lymphoma, MCL) 病人：(98/2/1、105/5/1)
 - (1)每人以 8 個療程為上限。(99/9/1)
 - (2)每日最大劑量 1.5mg/m²/day；每個療程第 1, 4, 8, 11 日給藥。

表九之三

限用於

1. 合併其他癌症治療藥品使用於多發性骨髓瘤病人：(99/3/1、100/10/1、101/6/1)
 - (1)每人以 8 個療程為上限(99/9/1)。
 - (2)需經事前申請後使用，每次申請 4 個療程。(101/6/1)
 - (3)使用 4 個療程後，必須確定藥物使用後 paraprotein (M-protein)未上升(即表示為 response 或 stable status)，或對部分 non-secretory type MM 病人以骨髓檢查 plasma cell 之比率為療效依據，方可申請使用後 4 個療程。(101/6/1)
 - (4)若病患於前 4 個療程符合前項規定(3)之療效，則後續 4 個療程可保留，於疾病復發時，再行申請使用。(101/6/1)
2. 曾接受過至少一種治療方式復發或無效後的被套細胞淋巴瘤 Mantle Cell Lymphoma (MCL) 病人：(98/2/1)
 - (1)每人以 8 個療程為上限。(99/9/1)
 - (2)每日最大劑量 1.5mg/m²/day；每個療程第 1, 4, 8, 11

| | | |
|---|---|--|
| <p>(3) <u>第一線使用過復發者，不得申請再次使用。</u>(105/5/1)</p> <p>(4) 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9. 29. Erlotinib (如 Tarceva) : (96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1) 附表九之二</p> <p>1. 限單獨使用於</p> <p>(1) 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部侵犯性或轉移性(即第ⅢB期或第Ⅳ期)之肺腺癌病患之第一線治療(102/11/1)。</p> <p>(2) 已接受 4 個週期 platinum 類第一線化學療法後，腫瘤範圍穩定(stable disease，不含 partial response 或 complete response) 之局部晚期或轉移性肺腺癌的維持療法。(102/4/1)</p> <p>(3) 先前已使用過 platinum 類第一線化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之腺性非小細胞肺癌之第二線用藥。(97/6/1)</p> <p>(4) 先前已使用過 platinum 類及</p> | <p>日給藥。</p> <p>(3) 使用 <u>4 個療程後需再評估，確定有效後，則可再使用 4 個療程。</u></p> <p>(4) 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9. 29. Erlotinib (如 Tarceva) : (96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1) 附表九之二</p> <p>1. 限單獨使用於</p> <p>(1) 適用於具有 EGFR-TK 突變之局部侵犯性或轉移性(即第ⅢB期或第Ⅳ期)之肺腺癌病患之第一線治療(102/11/1)。</p> <p>(2) 已接受 4 個週期 platinum 類第一線化學療法後，腫瘤範圍穩定(stable disease，不含 partial response 或 complete response) 之局部晚期或轉移性肺腺癌的維持療法。(102/4/1)</p> <p>(3) 先前已使用過 platinum 類第一線化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療，但仍局部惡化或轉移之腺性非小細胞肺癌之第二線用藥。(97/6/1)</p> <p>(4) 先前已使用過 platinum 類及</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>docetaxel 或 paclitaxel 化學治療後，但仍局部惡化或轉移之非小細胞肺癌之第三線用藥。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，若經事前審查核准，因臨床治療需轉換同成份不同含量品項，得經報備後依臨床狀況轉換使用，惟總使用期限不得超過該次申請事前審查之療程期限。</p> <p>(97/6/1)</p> <p>(1) 用於已接受 platinum 類第一線化學療法後，病情穩定之維持療法：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，並附已接受 4 個週期 platinum 類第一線化學療法後，腫瘤範圍穩定 (stable disease, 不含 partial response 或 complete response) 之影像診斷證明 (如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像)。</p> <p>(102/4/1)</p> <p>(2) 用於第二線用藥：檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受 platinum 類第一線化學治療，或 70 歲 (含) 以上接受過第一線化學治療之證明，及目前又有疾病惡化</p> | <p>docetaxel 或 paclitaxel 化學治療後，但仍局部惡化或轉移之非小細胞肺癌之第三線用藥。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，若經事前審查核准，因臨床治療需轉換同成份不同含量品項，得經報備後依臨床狀況轉換使用，惟總使用期限不得超過該次申請事前審查之療程期限。</p> <p>(97/6/1)</p> <p>(1) 用於已接受 platinum 類第一線化學療法後，病情穩定之維持療法：檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，並附已接受 4 個週期 platinum 類第一線化學療法後，腫瘤範圍穩定 (stable disease, 不含 partial response 或 complete response) 之影像診斷證明 (如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像)。</p> <p>(102/4/1)</p> <p>(2) 用於第二線用藥：檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受 platinum 類第一線化學治療，或 70 歲 (含) 以上接受過第一線化學治療之證明，及目前又有疾病惡化</p> | |
|--|--|--|

之影像診斷證明（如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像），此影像證明以可測量

（measurable）的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估（evaluatable）的病灶亦可採用。

（97/6/1）

- (3)用於第三線用藥：檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線及第二線化學藥物如 platinum（cisplatin 或 carboplatin）與 taxanes（paclitaxel 或 docetaxel）治療之證明，及目前又有疾病惡化之影像診斷證明（如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像），此影像證明以可測量

（measurable）的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估（evaluatable）的病灶亦可採用。

（97/6/1）

- (4)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光

之影像診斷證明（如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像），此影像證明以可測量

（measurable）的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估（evaluatable）的病灶亦可採用。

（97/6/1）

- (3)用於第三線用藥：檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線及第二線化學藥物如 platinum（cisplatin 或 carboplatin）與 taxanes（paclitaxel 或 docetaxel）治療之證明，及目前又有疾病惡化之影像診斷證明（如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像），此影像證明以可測量

（measurable）的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估（evaluatable）的病灶亦可採用。

（97/6/1）

- (4)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光

或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）。

(101/5/1)

3. 醫師每次開藥以 4 週為限。(101/10/1)

4. 本藥品與 gefitinib(如 Iressa)及 afatinib(如 Giotrif)不得併用。

(103/5/1)

備註 1：非小細胞肺癌病患的第二線治療用藥之定義為：病患需先經第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療後，因疾病惡化，此時所給予之治療即為第二線用藥。

(97/6/1)

備註 2：非小細胞肺癌病患的第三線治療用藥之定義為：病患需先經第一線化學藥物治療後，因疾病惡化，再經第二線不同的化學藥物治療之後，若疾病再度惡化，此時所給予之治療即為第三線用藥。

9. 30. Dasatinib (如 Sprycel)：(98/1/1、102/4/1、104/12/1)

限用於

1. 第一線使用(102/4/1、104/12/1)：

或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）。

(101/5/1)

3. 醫師每次開藥以 4 週為限。(101/10/1)

4. 本藥品與 gefitinib(如 Iressa)及 afatinib(如 Giotrif)不得併用。

(103/5/1)

備註 1：非小細胞肺癌病患的第二線治療用藥之定義為：病患需先經第一線含鉑化學治療，或 70 歲(含)以上接受過第一線化學治療後，因疾病惡化，此時所給予之治療即為第二線用藥。

(97/6/1)

備註 2：非小細胞肺癌病患的第三線治療用藥之定義為：病患需先經第一線化學藥物治療後，因疾病惡化，再經第二線不同的化學藥物治療之後，若疾病再度惡化，此時所給予之治療即為第三線用藥。

9. 30. Dasatinib (如 Sprycel)：(98/1/1、102/4/1、104/12/1)

限用於

1. 第一線使用(102/4/1、104/12/1)：

治療新診斷的費城染色體陽性之慢性期慢性骨髓性白血病的成人。

2. 第二線使用

(104/12/1)：

- (1) 治療患有慢性、加速或急性期慢性骨髓性白血病，對先前經 imatinib 400mg(含) 以上治療後有抗藥性或無耐受性的成人。
- (2) 治療患有費城染色體陽性急性淋巴性白血病，且對先前經 imatinib 400mg(含) 以上治療後有抗藥性或無耐受性的成人。
- (3) 需檢送病歷及對 imatinib 耐受性不良或無效的證明

(104/12/1)。

9. 31. Sunitinib (如

Sutent)：(98/2/1、98/5/1、99/1 /1、99/ 2 /1、101/5/1、102/1/1、104/12/1)

1. 腸胃道間質腫瘤：

- (1) 限用於以 imatinib 治療期間出現疾病惡化或對該藥出現不能忍受之腸胃道間質腫瘤(99/ 2/ 1)。
- (2) 若使用本藥品出現疾病惡化或無法忍受其副作用，不得替換使用 imatinib 治療(99/ 2 / 1)。
- (3) 需經事前審查核准後使用，送審時須檢送病歷及對 imatinib 耐

治療新診斷的費城染色體陽性之慢性期慢性骨髓性白血病的成人。

2. 第二線使用

(104/12/1)：

- (1) 治療患有慢性、加速或急性期慢性骨髓性白血病，對先前經 imatinib 400mg(含) 以上治療後有抗藥性或無耐受性的成人。
- (2) 治療患有費城染色體陽性急性淋巴性白血病，且對先前經 imatinib 400mg(含) 以上治療後有抗藥性或無耐受性的成人。
- (3) 需檢送病歷及對 imatinib 耐受性不良或無效的證明

(104/12/1)。

9. 31. Sunitinib (如

Sutent)：(98/2/1、98/5/1、99/1 /1、99/ 2 /1、101/5/1、102/1/1、104/12/1)

1. 腸胃道間質腫瘤：

- (1) 限用於以 imatinib 治療期間出現疾病惡化或對該藥出現不能忍受之腸胃道間質腫瘤(99/ 2/ 1)。
- (2) 若使用本藥品出現疾病惡化或無法忍受其副作用，不得替換使用 imatinib 治療(99/ 2 / 1)。
- (3) 需經事前審查核准後使用，送審時須檢送病歷及對 imatinib 耐

| | | |
|--|--|--|
| <p>受性不良或無效之證明。(98/5/1)(99/2/1)</p> <p>2. 晚期腎細胞癌： (99/1/1)</p> <p>(1) 可用於第一線治療晚期或轉移性腎細胞癌，即病理上為亮細胞癌(clear cell renal carcinoma)。</p> <p>(2) 無效後則不給付 temsirolimus 及其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。</p> <p>(3) 需檢送影像資料，每三個月評估一次。 (104/12/1)</p> <p>(4) 病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他 TKI。</p> <p>3. 進展性，無法切除或轉移性分化良好之胰臟神經內分泌腫瘤的成人病患，須同時符合下列條件：(101/5/1)</p> <p>(1) 符合 WHO 2010 分類方式之 G1 or G2 胰臟神經內分泌瘤。</p> <p>(2) 於一年內影像檢查證實有明顯惡化者。</p> <p>(3) 不可合併使用化學治療或相關標靶藥物。 (102/1/1)</p> <p>(4) 經事前專案審查核准後使用，且需每 3 個</p> | <p>受性不良或無效之證明。(98/5/1)(99/2/1)</p> <p>2. 晚期腎細胞癌： (99/1/1)</p> <p>(1) 可用於第一線治療晚期或轉移性腎細胞癌，即病理上為亮細胞癌(clear cell renal carcinoma)。</p> <p>(2) 無效後則不給付 temsirolimus 及其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。</p> <p>(3) 需檢送影像資料，每三個月評估一次。 (104/12/1)</p> <p>(4) 病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他 TKI。</p> <p>3. 進展性，無法切除或轉移性分化良好之胰臟神經內分泌腫瘤的成人病患，須同時符合下列條件：(101/5/1)</p> <p>(1) 符合 WHO 2010 分類方式之 G1 or G2 胰臟神經內分泌瘤。</p> <p>(2) 於一年內影像檢查證實有明顯惡化者。</p> <p>(3) 不可合併使用化學治療或相關標靶藥物。 (102/1/1)</p> <p>(4) 經事前專案審查核准後使用，且需每 3 個</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>月評估一次。</p> <p>9. 32. Nilotinib：(98/6 /1、99/1/1、101/7/1) 附表九之六</p> <p>9. 32. 1. Nilotinib 200mg (如 Tasigna 200mg) (98/6 /1、99/1/1、 104/12/1)</p> <p>1. 限用於治療對 imatinib 400MG (含)以上耐受性不良或治療無效的「慢性期或加速期費城染色體(Philadelphia chromosome) 陽性的慢性骨髓性白血病(CML)成年患者」。</p> <p>2. 必須檢附耐受性不良或治療無效的證明。 (104/12/1)</p> <p>3. Nilotinib 與 dasatinib 不得合併使用。</p> <p>9. 32. 2. Nilotinib 150mg (如 Tasigna 150mg)： (101/7/1、104/12/1) 限用於新確診之慢性期費城染色體陽性的慢性骨髓性白血病。 (104/12/1)</p> <p>9. 33. Thalidomide (如 Thado)：(98/7/1) 治療新診斷多發性骨髓瘤。使用時須和 prednisolone 及 oral melphalan 併用，或和骨髓移植併用，或和 palmidronate 併用於骨髓移植後之治療。</p> <p>9. 34. Sorafenib (如 Nexavar)：(98/10/1、100/6/1、101/8/1、</p> | <p>月評估一次。</p> <p>9. 32. Nilotinib：(98/6 /1、99/1/1、101/7/1) 附表九之六</p> <p>9. 32. 1. Nilotinib 200mg (如 Tasigna 200mg) (98/6 /1、99/1/1、 104/12/1)</p> <p>1. 限用於治療對 imatinib 400MG (含)以上耐受性不良或治療無效的「慢性期或加速期費城染色體(Philadelphia chromosome) 陽性的慢性骨髓性白血病(CML)成年患者」。</p> <p>2. 必須檢附耐受性不良或治療無效的證明。 (104/12/1)</p> <p>3. Nilotinib 與 dasatinib 不得合併使用。</p> <p>9. 32. 2. Nilotinib 150mg (如 Tasigna 150mg)： (101/7/1、104/12/1) 限用於新確診之慢性期費城染色體陽性的慢性骨髓性白血病。 (104/12/1)</p> <p>9. 33. Thalidomide (如 Thado)：(98/7/1) 治療新診斷多發性骨髓瘤。使用時須和 prednisolone 及 oral melphalan 併用，或和骨髓移植併用，或和 palmidronate 併用於骨髓移植後之治療。</p> <p>9. 34. Sorafenib (如 Nexavar)：(98/10/1、100/6/1、101/8/1、</p> | |
|--|--|--|

104/6/1、105/11/1、
106/1/1)

1. 晚期腎細胞癌部分：

(1) 晚期腎細胞癌且已接受 interferon - alpha 或 interleukin-2 治療失敗，或不適合以上兩種藥物治療之病患。不適合以上兩種藥物治療之病患，須符合 cytokine 禁忌症者得直接使用 sorafenib。但須列舉出所符合之禁忌症及檢附相關證明。

(100/6/1)

(2) 無效後則不給付 temsirolimus 及其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。

(3) 需檢送影像資料，每 3 個月評估一次。

(104/12/1)

2. 晚期肝細胞癌部分：

(101/8/1、105/11/1)

(1) 轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗之晚期肝細胞癌，並符合下列條件之一：

I. 肝外轉移（遠端轉移或肝外淋巴結侵犯）的 Child-Pugh A class 患者。

II. 大血管侵犯（腫瘤侵犯主門靜脈或侵犯左/右靜脈第

104/12/1)

1. 晚期腎細胞癌部分：

(1) 晚期腎細胞癌且已接受 interferon - alpha 或 interleukin-2 治療失敗，或不適合以上兩種藥物治療之病患。不適合以上兩種藥物治療之病患，須符合 cytokine 禁忌症者得直接使用 sorafenib。但須列舉出所符合之禁忌症及檢附相關證明。

(100/6/1)

(2) 無效後則不給付 temsirolimus 及其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。

(3) 需檢送影像資料，每 3 個月評估一次。

(104/12/1)

2. 晚期肝細胞癌部分：

(101/8/1)

(1) 轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗之晚期肝細胞癌，並符合下列條件之一：

I. 肝外轉移（遠端轉移或肝外淋巴結侵犯）的 Child-Pugh A class 患者。

II. 大血管侵犯（腫瘤侵犯主門靜脈或侵犯左/右靜脈第

| | | |
|---|---|--|
| <p>一分支) 的 Child-Pugh A class 患者。</p> <p><u>III. 經導管動脈化學 藥物栓塞治療 (Transcatheter arterial chemoembolization, T.A.C.E.) 失敗 之晚期肝細胞癌的 Child-Pugh A class 患者，需提 供患者於六個月內 >=3 次局部治療之 記錄。</u></p> <p>(2) 需經事前審查核准後 使用，每次申請之療 程以 2 個月為限，送 審時需檢送影像資 料，每 2 個月評估一 次。</p> <p><u>3. 用於放射性碘治療無效 之局部晚期或轉移性的 進行性(progressive) 分化型甲狀腺癌(RAI-R DTC)：(106/1/1)</u></p> <p><u>(1) 放射性碘治療無效之 局部晚期或轉移性的 進行性 (progressive) 分化 型甲狀腺癌。</u></p> <p><u>(2) 需經事前審查核准後 使用，每次申請之療 程以 3 個月為限，送 審時需檢送影像資 料，每 3 個月評估一 次。</u></p> <p>9. 35. carmustine 植入劑 (如 Gliadel Wafer)： (100/2/1) 附表八之四</p> | <p>一分支) 的 Child-Pugh A class 患者。</p> <p>(2) 需經事前審查核准後 使用，每次申請之療 程以 2 個月為限，送 審時需檢送影像資 料，每 2 個月評估一 次。</p> <p>9. 35. carmustine 植入劑 (如 Gliadel Wafer)： (100/2/1) 附表八之四</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>1. 作為復發性多形神經膠母細胞瘤病人的手術輔助，且不得與 temozolomide 併用。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9.36. Everolimus： （100/2/1、102/1/1）附表九之九</p> <p>9.36.1. Everolimus 5mg 及 10mg（如 Afinitor 5mg 及 10mg） （100/2/1、102/1/1、104/9/1、104/12/1）：</p> <p>1. 治療使用 sunitinib 或 sorafenib 治療失敗之晚期腎細胞癌病患。</p> <p>2. 使用於胰臟神經內分泌腫瘤成人病患，需同時符合下列條件： （102/1/1）</p> <p>(1) 無法切除或轉移的成人胰臟內分泌腫瘤，其分化程度為良好或中度，或 WHO 2010 年分類為 G1、G2 者。</p> <p>(2) 為進展性腫瘤，即過去 12 個月影像檢查為持續惡化者（RECIST 定義為疾病惡化者）。</p> <p>(3) 不可合併使用化學藥物或其他標靶藥物。</p> <p>(4) 除因病人使用本品後，發生嚴重不良反應或耐受不良之情形外，本品與</p> | <p>1. 作為復發性多形神經膠母細胞瘤病人的手術輔助，且不得與 temozolomide 併用。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>9.36. Everolimus： （100/2/1、102/1/1）附表九之九</p> <p>9.36.1. Everolimus 5mg 及 10mg（如 Afinitor 5mg 及 10mg） （100/2/1、102/1/1、104/9/1、104/12/1）：</p> <p>1. 治療使用 sunitinib 或 sorafenib 治療失敗之晚期腎細胞癌病患。</p> <p>2. 使用於胰臟神經內分泌腫瘤成人病患，需同時符合下列條件： （102/1/1）</p> <p>(1) 無法切除或轉移的成人胰臟內分泌腫瘤，其分化程度為良好或中度，或 WHO 2010 年分類為 G1、G2 者。</p> <p>(2) 為進展性腫瘤，即過去 12 個月影像檢查為持續惡化者（RECIST 定義為疾病惡化者）。</p> <p>(3) 不可合併使用化學藥物或其他標靶藥物。</p> <p>(4) 除因病人使用本品後，發生嚴重不良反應或耐受不良之情形外，本品與</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>sunitinib 不得轉換使用。</p> <p>3. 與 exemestane 併用，作為已無適當之化學治療可供選擇，而先前已使用過非類固醇類之芳香環酶抑制劑治療無效，而未曾使用 exemestane 之轉移性乳癌，屬於荷爾蒙接受體陽性、HER2 受體陰性且尚未出現其他器官症狀之病人的第一線治療(104/9/1)。</p> <p>4. 除晚期腎細胞癌之外，其他疾病需經事前審核核准後使用，每次申請之療程以 3 個月為限。(104/12/1)</p> <p>5. 送審時需檢送影像資料，每 3 個月評估一次。(104/12/1)</p> <p>9. 36. 2. Everolimus 2.5mg 及 5mg (如領有罕藥藥證之 Afinitor 2.5mg 及 5mg): (102/1/1)</p> <p>1. 治療患有結節性硬化症 (tuberous sclerosis) 之腦室管膜下巨細胞星狀瘤 (SEGA: subependymal giant cell astrocytoma)，併有水腦症狀或其他顯著神經學症狀，且經神經外科專科醫師評估不適合接受或無法以外科切除手術的患者使用。</p> <p>2. 需經事前審核核准後使用，每次申請之療程以 6 個月為限，申請時需</p> | <p>sunitinib 不得轉換使用。</p> <p>3. 與 exemestane 併用，作為已無適當之化學治療可供選擇，而先前已使用過非類固醇類之芳香環酶抑制劑治療無效，而未曾使用 exemestane 之轉移性乳癌，屬於荷爾蒙接受體陽性、HER2 受體陰性且尚未出現其他器官症狀之病人的第一線治療(104/9/1)。</p> <p>4. 除晚期腎細胞癌之外，其他疾病需經事前審核核准後使用，每次申請之療程以 3 個月為限。(104/12/1)</p> <p>5. 送審時需檢送影像資料，每 3 個月評估一次。(104/12/1)</p> <p>9. 36. 2. Everolimus 2.5mg 及 5mg (如領有罕藥藥證之 Afinitor 2.5mg 及 5mg): (102/1/1)</p> <p>1. 治療患有結節性硬化症 (tuberous sclerosis) 之腦室管膜下巨細胞星狀瘤 (SEGA: subependymal giant cell astrocytoma)，併有水腦症狀或其他顯著神經學症狀，且經神經外科專科醫師評估不適合接受或無法以外科切除手術的患者使用。</p> <p>2. 需經事前審核核准後使用，每次申請之療程以 6 個月為限，申請時需</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>檢送影像檢查資料。</p> <p>3. 申請續用時，除需檢送治療前後之影像資料，且再經神經外科專科醫師評估，其仍不適合接受或無法以外科切除手術者，始得續用。</p> <p>4. 用藥後，若病情無法持續改善或疾病已惡化，則不予同意使用。</p> <p>9. 37. Bevacizumab (如 Avastin)：(100/6/1) (101/05/1)附表九之十</p> <p>1. 轉移性大腸或直腸癌： (1) Bevacizumab 與含有 irinotecan/ 5-fluorouracil/ leucovorin 或 5-fluorouracil/ leucovorin 的化學療法合併使用，作為轉移性大腸或直腸癌患者的第一線治療。 (2) 使用總療程以 24 週為上限。</p> <p>2. 惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級) - 神經膠母細胞瘤： 單獨使用可用於治療曾接受標準放射線治療且含 temozolomide 在內之化學藥物治療失敗之多型性神經膠母細胞瘤 (Glioblastoma multiforme)復發之成人患者。(101/05/1)</p> <p>3. 本藥須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 12 週為限，再次申請必須提出</p> | <p>檢送影像檢查資料。</p> <p>3. 申請續用時，除需檢送治療前後之影像資料，且再經神經外科專科醫師評估，其仍不適合接受或無法以外科切除手術者，始得續用。</p> <p>4. 用藥後，若病情無法持續改善或疾病已惡化，則不予同意使用。</p> <p>9. 37. Bevacizumab (如 Avastin)：(100/6/1) (101/05/1)附表九之十</p> <p>1. 轉移性大腸或直腸癌： (1) Bevacizumab 與含有 irinotecan/ 5-fluorouracil/ leucovorin 或 5-fluorouracil/ leucovorin 的化學療法合併使用，作為轉移性大腸或直腸癌患者的第一線治療。 (2) 使用總療程以 24 週為上限。</p> <p>2. 惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級) - 神經膠母細胞瘤： 單獨使用可用於治療曾接受標準放射線治療且含 temozolomide 在內之化學藥物治療失敗之多型性神經膠母細胞瘤 (Glioblastoma multiforme)復發之成人患者。(101/05/1)</p> <p>3. 本藥須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 12 週為限，再次申請必須提出</p> | |
|---|---|--|

客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。

9.38. Temsirolimus (如 Torisel): (101/1/1)
附表九之十一

1. 需經事前審查核准後使用，每次給付3個月藥量，送審時需檢送影像資料，每3個月評估一次。
 - (1) 治療不限細胞型的高風險晚期腎細胞癌。
 - (2) 需具有下列六個風險因子中至少3個以上因子：
 - I. 距離初次診斷出腎細胞癌之時間未達一年
 - II. Karnofsky Performance scale 介於60至70之間
 - III. 血色素低於正常值 12gm/dL
 - IV. 矯正後血鈣值超過 10mg/dL
 - V. 乳酸脫氫酶 (lactate dehydrogenase) 超過 1.5 倍正常值上限
 - VI. 超過一個以上的器官有轉移病灶。
 - (3) 無效後則不給付其他酪胺酸激酶阻斷劑 TKI。
2. 病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以

客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。

9.38. Temsirolimus (如 Torisel): (101/1/1)
附表九之十一

1. 需經事前審查核准後使用，每次給付3個月藥量，送審時需檢送影像資料，每3個月評估一次。
 - (1) 治療不限細胞型的高風險晚期腎細胞癌。
 - (2) 需具有下列六個風險因子中至少3個以上因子：
 - I. 距離初次診斷出腎細胞癌之時間未達一年
 - II. Karnofsky Performance scale 介於60至70之間
 - III. 血色素低於正常值 12gm/dL
 - IV. 矯正後血鈣值超過 10mg/dL
 - V. 乳酸脫氫酶 (lactate dehydrogenase) 超過 1.5 倍正常值上限
 - VI. 超過一個以上的器官有轉移病灶。
 - (3) 無效後則不給付其他酪胺酸激酶阻斷劑 TKI。
2. 病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以

| | | |
|---|---|--|
| <p>原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。</p> <p>9. 39. Flutamide； buserelin：(90/8/1、101/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 晚期 (包括 T3、淋巴腺轉移、器官轉移) 之腫瘤。 2. 攝護腺癌病人接受根除性攝護腺切除手術治療後，PSA 逐漸升高有局部復發或遠處轉移之情況。 3. 癌症臨床期別為 T2、T3，準備接受根除性攝護腺切除手術治療或其他定效治療，包括 irradiation 之前為求 tumor volume reduction，作為 neoadjuvant 治療之目的。 <p>9. 40. Bicalutamide： (89/10/1、101/7/1) 限用於與 LHRH 類似劑療法或手術去勢療法併用於進展性攝護腺癌。</p> <p>9. 41. Pazopanib (如 Votrient)： (101/8/1、104/4/1) 附表九之十三</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 腎細胞癌： <ol style="list-style-type: none"> (1) 可用於第一線治療晚期或轉移性腎細胞癌，其病理上為亮細胞癌 (clear cell renal carcinoma)。 | <p>原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI)。</p> <p>9. 39. Flutamide； buserelin：(90/8/1、101/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 晚期 (包括 T3、淋巴腺轉移、器官轉移) 之腫瘤。 2. 攝護腺癌病人接受根除性攝護腺切除手術治療後，PSA 逐漸升高有局部復發或遠處轉移之情況。 3. 癌症臨床期別為 T2、T3，準備接受根除性攝護腺切除手術治療或其他定效治療，包括 irradiation 之前為求 tumor volume reduction，作為 neoadjuvant 治療之目的。 <p>9. 40. Bicalutamide： (89/10/1、101/7/1) 限用於與 LHRH 類似劑療法或手術去勢療法併用於進展性攝護腺癌。</p> <p>9. 41. Pazopanib (如 Votrient)： (101/8/1、104/4/1) 附表九之十三</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 腎細胞癌： <ol style="list-style-type: none"> (1) 可用於第一線治療晚期或轉移性腎細胞癌，其病理上為亮細胞癌 (clear cell renal carcinoma)。 | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(2)本品使用無效後，不得申請使用 temsirolimus 或其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI) 等藥品。</p> <p>(3)需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以三個月為限，送審時需檢送影像資料，每三個月評估一次。</p> <p>(4)病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他 TKI。</p> <p>2. 軟組織肉瘤： (104/4/1)</p> <p>(1)用於治療先前曾接受化療失敗的晚期軟組織肉瘤(STS)患者。其病情若能接受手術治療者，須先經手術治療。</p> <p>(2)須排除胃腸道基質瘤、脂肪惡性肉瘤、橫紋肌惡性肉瘤、軟骨惡性肉瘤、骨性惡性肉瘤、依文氏 (Ewing' s sarcoma) 惡性肉瘤、原發性神經外胚層腫瘤 (primitive neuroectodermal tumor)、突起性表皮纖維惡性腫瘤</p> | <p>(2)本品使用無效後，不得申請使用 temsirolimus 或其他酪胺酸激酶阻斷劑 (tyrosine kinase inhibitor, TKI) 等藥品。</p> <p>(3)需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以三個月為限，送審時需檢送影像資料，每三個月評估一次。</p> <p>(4)病人若對藥物產生耐受性不佳 (intolerance)，則以原來藥物減量為原則，若嚴重耐受性不佳，可以換其他 TKI。</p> <p>2. 軟組織肉瘤： (104/4/1)</p> <p>(1)用於治療先前曾接受化療失敗的晚期軟組織肉瘤(STS)患者。其病情若能接受手術治療者，須先經手術治療。</p> <p>(2)須排除胃腸道基質瘤、脂肪惡性肉瘤、橫紋肌惡性肉瘤、軟骨惡性肉瘤、骨性惡性肉瘤、依文氏 (Ewing' s sarcoma) 惡性肉瘤、原發性神經外胚層腫瘤 (primitive neuroectodermal tumor)、突起性表皮纖維惡性腫瘤</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(dermatofibrosarcoma protuberance)或具骨轉移的患者。</p> <p>(3)須經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，每三個月需再次申請。 (須檢附影像學報告)</p> <p>9.42. Bendamustine (如 Innomustine) (101/10/1、103/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以本品作為第一線治療，限用於 Binet C 級之慢性淋巴性白血病患者 (CLL) 或 Binet B 級併有免疫性症候 (如自體免疫性溶血、免疫性血小板低下紫癥等) 相關疾病之 CLL 病人。 2. 用於 B-細胞慢性淋巴性白血病 (CLL) 病患 Binet B 及 C 之第二線治療，在經歷至少一種標準內容的烷化基藥劑 (alkylating agent) 治療方法無效，或治療後雖有效但隨後疾病又繼續惡化進展的病人。 3. 曾接受至少一種化療之和緩性非何杰金氏淋巴瘤，六個月內曾以 rituximab 治療失敗之單一治療。(103/2/1) 4. 不得與 fludarabine 合併使用。(103/2/1) 5. 須經事前審查核准後使用，每次申請最多六個月 (月) 療程。 <p>9.43. Lenalidomide (如 Revlimid) :</p> | <p>(dermatofibrosarcoma protuberance)或具骨轉移的患者。</p> <p>(3)須經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，每三個月需再次申請。 (須檢附影像學報告)</p> <p>9.42. Bendamustine (如 Innomustine) (101/10/1、103/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以本品作為第一線治療，限用於 Binet C 級之慢性淋巴性白血病患者 (CLL) 或 Binet B 級併有免疫性症候 (如自體免疫性溶血、免疫性血小板低下紫癥等) 相關疾病之 CLL 病人。 2. 用於 B-細胞慢性淋巴性白血病 (CLL) 病患 Binet B 及 C 之第二線治療，在經歷至少一種標準內容的烷化基藥劑 (alkylating agent) 治療方法無效，或治療後雖有效但隨後疾病又繼續惡化進展的病人。 3. 曾接受至少一種化療之和緩性非何杰金氏淋巴瘤，六個月內曾以 rituximab 治療失敗之單一治療。(103/2/1) 4. 不得與 fludarabine 合併使用。(103/2/1) 5. 須經事前審查核准後使用，每次申請最多六個月 (月) 療程。 <p>9.43. Lenalidomide (如 Revlimid) :</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(101/12/1)</p> <p>1. 與 dexamethasone 合併使用於先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤患者。</p> <p>(1)每人以 12 個療程為上限(每療程為 4 週)。</p> <p>(2)每天限使用 1 粒。</p> <p>(3)使用 4 個療程後，必須確定 paraprotein (M-protein)未上升(即表示對藥物有反應或為穩定狀態)或對部分 non-secretory type MM 病人以骨髓檢查 plasma cell 為療效依據，方可繼續使用。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 4 個療程為限，每 4 個療程須再次申請。</p> <p>3. 本品不得與 bortezomib 合併使用。</p> <p>9.44. Azacitidine (如 Vidaza) (102/1/1)</p> <p>1. 骨髓增生不良症候群高危險性病患：頑固性貧血併有過量芽細胞 (RA with excess blasts, RAEB)、轉變中的頑固性貧血併有過量芽細胞 (RAEB in transformation, RAEB-T)、及慢性骨髓單核細胞性白血病 (chronic myelomonocytic leukemia, CMMoL)。</p> | <p>(101/12/1)</p> <p>1. 與 dexamethasone 合併使用於先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤患者。</p> <p>(1)每人以 12 個療程為上限(每療程為 4 週)。</p> <p>(2)每天限使用 1 粒。</p> <p>(3)使用 4 個療程後，必須確定 paraprotein (M-protein)未上升(即表示對藥物有反應或為穩定狀態)或對部分 non-secretory type MM 病人以骨髓檢查 plasma cell 為療效依據，方可繼續使用。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 4 個療程為限，每 4 個療程須再次申請。</p> <p>3. 本品不得與 bortezomib 合併使用。</p> <p>9.44. Azacitidine (如 Vidaza) (102/1/1)</p> <p>1. 骨髓增生不良症候群高危險性病患：頑固性貧血併有過量芽細胞 (RA with excess blasts, RAEB)、轉變中的頑固性貧血併有過量芽細胞 (RAEB in transformation, RAEB-T)、及慢性骨髓單核細胞性白血病 (chronic myelomonocytic leukemia, CMMoL)。</p> | |
|--|--|--|

2. 需經事前審查核准後使用，申請事前審查時必須確定病患無病情惡化至急性骨髓性白血病，即可繼續使用。

(1) 第一次申請 4 治療療程。

(2) 第二次開始每 3 療程申請一次。

3. 急性骨髓性白血病之定義：骨髓芽細胞 (myeloblast) 大於 30 %。

9.45. Afatinib (如 Giotrif) : (103/5/1)

1. 限單獨使用於具有 EGFR-TK 基因突變之局部晚期或轉移性(即第 III B 期或第 IV 期)之肺腺癌病患之第一線治療。

2. 需經事前審查核准後使用，若經事前審查核准，因臨床治療需轉換同成分不同含量品項，得經報備後依臨床狀況轉換使用，惟總使用期限不得超過該次申請事前審查之療程期限。

(1) 檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，及 EGFR-TK 基因突變檢測報告。

(2) 每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢

2. 需經事前審查核准後使用，申請事前審查時必須確定病患無病情惡化至急性骨髓性白血病，即可繼續使用。

(1) 第一次申請 4 治療療程。

(2) 第二次開始每 3 療程申請一次。

3. 急性骨髓性白血病之定義：骨髓芽細胞 (myeloblast) 大於 30 %。

9.45. Afatinib (如 Giotrif) : (103/5/1)

1. 限單獨使用於具有 EGFR-TK 基因突變之局部晚期或轉移性(即第 III B 期或第 IV 期)之肺腺癌病患之第一線治療。

2. 需經事前審查核准後使用，若經事前審查核准，因臨床治療需轉換同成分不同含量品項，得經報備後依臨床狀況轉換使用，惟總使用期限不得超過該次申請事前審查之療程期限。

(1) 檢具確實患有肺腺癌之病理或細胞檢查報告，及 EGFR-TK 基因突變檢測報告。

(2) 每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢

| | | |
|--|--|--|
| <p>查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）</p> <p>3. 使用本藥品後，除因耐受性不良，否則不得轉換類似藥理機轉之其他酪胺酸激酶阻斷劑（tyrosine kinase inhibitor, TKI）。</p> <p>4. 醫師每次開藥以 4 週為限。</p> <p>5. 本藥品與 gefitinib（如 Iressa）及 erlotinib(如 Tarceva) 不得併用。</p> <p>9. 46. Tegafur/gimeracil/oteracil 複方製劑(如 TS-1) (103/6/1、105/12/1)：</p> <p>1. 治療局部晚期無法手術切除或轉移性胰臟癌病人。</p> <p>2. 胃癌(105/12/1)</p> <p>(1)<u>胃癌術後輔助性化療，用於罹患 TNM Stage II（排除 T1）、III A 或 III B 胃癌且接受過胃癌根治性手術的成年患者，限用 1 年。</u></p> <p>(2)<u>需經事前審查核准後使用。</u></p> <p>9. 47. lapatinib（如 Tykerb）：（103/9/1）</p> <p>1. 與 capecitabine 併用，使用於曾接受 anthracycline, taxane 以及 trastuzumab 治療</p> | <p>查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）</p> <p>3. 使用本藥品後，除因耐受性不良，否則不得轉換類似藥理機轉之其他酪胺酸激酶阻斷劑（tyrosine kinase inhibitor, TKI）。</p> <p>4. 醫師每次開藥以 4 週為限。</p> <p>5. 本藥品與 gefitinib（如 Iressa）及 erlotinib(如 Tarceva) 不得併用。</p> <p>9. 46. Tegafur/gimeracil/oteracil <u>poatssium</u>複方製劑(如 TS-1) (103/6/1)：</p> <p>治療局部晚期無法手術切除或轉移性胰臟癌病人。</p> <p>9. 47. lapatinib（如 Tykerb）：（103/9/1）</p> <p>1. 與 capecitabine 併用，使用於曾接受 anthracycline, taxane 以及 trastuzumab 治療</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>後病況惡化之轉移性乳癌併有腦部轉移，且為 HER2 過度表現患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限。再申請應檢附前次治療結果評估資料。</p> <p>9. 48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1)</p> <p>1. 用於治療轉移性乳癌患者且先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳癌之化學治療輔助性治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，如發現病情惡化應停止使用。再申請應檢附前次治療結果評估資料。</p> <p>9. 49. Abiraterone (如 Zytiga) (103/12/1、<u>105/9/1</u>)</p> <p>1. 治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌 (ECOG 分數須\leq2) 且已使用過 docetaxel 2 個療程以上且治療無效者。</p> <p>2. 需與 prednisone 或 prednisolone 併用。</p> <p>3. 須經事前審查核准後使用，每 3 個月需再次申請。</p> <p>4. <u>本品與 enzalutamide 僅能擇一使用。</u> (105/9/1)</p> <p>9. 50. Crizotinib (如</p> | <p>後病況惡化之轉移性乳癌併有腦部轉移，且為 HER2 過度表現患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限。再申請應檢附前次治療結果評估資料。</p> <p>9. 48. Eribulin (如 Halaven) : (103/12/1)</p> <p>1. 用於治療轉移性乳癌患者且先前曾接受過 anthracycline 和 taxane 兩種針對轉移性乳癌之化學治療輔助性治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，如發現病情惡化應停止使用。再申請應檢附前次治療結果評估資料。</p> <p>9. 49. Abiraterone (如 Zytiga) (103/12/1)</p> <p>1. 治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌 (ECOG 分數須\leq2) 且已使用過 docetaxel 2 個療程以上且治療無效者。</p> <p>2. 需與 prednisone 或 prednisolone 併用。</p> <p>3. 須經事前審查核准後使用，每 3 個月需再次申請。</p> <p>9. 50. Crizotinib (如</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Xalkori) (104/9/1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用於已接受一種含 platinum 類第一線化學治療失敗之 ALK 陽性之晚期非小細胞肺癌患者。 2. 符合前述之病患且併有腦轉移之非小細胞肺癌病人，需達腦部穩定狀態(brain stabilized)始得使用。 腦部穩定狀態定義為「無因腦轉移之臨床症狀(Asymptomatic brain metastases)或有腦轉移之臨床症狀(Symptomatic brain metastases)經治療後腦轉移相關臨床症狀穩定至少達三週以上之病人(類固醇劑量穩定)」。 3. 須經事前審查核准後使用： <ol style="list-style-type: none"> (1) 需檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線含鉑化學治療又有疾病惡化之影像診斷證明(如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像)，此影像證明以可測量(measurable)的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估(evaluable)的病灶亦可採用。 | <p>Xalkori) (104/9/1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適用於已接受一種含 platinum 類第一線化學治療失敗之 ALK 陽性之晚期非小細胞肺癌患者。 2. 符合前述之病患且併有腦轉移之非小細胞肺癌病人，需達腦部穩定狀態(brain stabilized)始得使用。 腦部穩定狀態定義為「無因腦轉移之臨床症狀(Asymptomatic brain metastases)或有腦轉移之臨床症狀(Symptomatic brain metastases)經治療後腦轉移相關臨床症狀穩定至少達三週以上之病人(類固醇劑量穩定)」。 3. 須經事前審查核准後使用： <ol style="list-style-type: none"> (1) 需檢具確實患有非小細胞肺癌之病理或細胞檢查報告，並附曾經接受第一線含鉑化學治療又有疾病惡化之影像診斷證明(如胸部 X 光、電腦斷層或其他可作為評估的影像)，此影像證明以可測量(measurable)的病灶為優先，如沒有可以測量的病灶，則可評估(evaluable)的病灶亦可採用。 | |
|--|--|--|

(2)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）。

(3)每次處方以 4 週為限。

9. 51. Regorafenib (如 Stivarga) :
(104/9/1、105/8/1)

1. 轉移性大腸直腸癌 (mCRC) :

(1)用於治療先前曾接受下列療法的轉移性大腸直腸癌 (mCRC) 患者，療法包括 fluoropyrimidine、oxaliplatin、irinotecan 為基礎的化療，和抗血管內皮生長因子 (anti-VEGF) 等療法；若 K-ras 為原生型 (wild type)，則需接受過抗表皮生長因子受體 (anti-EGFR) 療法。

(2)須經事前審查核准

(2)每次申請事前審查之療程以三個月為限，每三個月需再次申請，再次申請時並需附上治療後相關臨床資料，如給藥四週後，需追蹤胸部 X 光或電腦斷層等影像檢查一遍，評估療效，往後每四週做胸部 X 光檢查，每隔八週需追蹤其作為評估藥效的影像（如胸部 X 光或電腦斷層）。

(3)每次處方以 4 週為限。

9. 51. Regorafenib (如 Stivarga) :
(104/9/1)

1.用於治療先前曾接受下列療法的轉移性大腸直腸癌 (mCRC) 患者，療法包括 fluoropyrimidine-、oxaliplatin-、irinotecan- 為基礎的化療，和抗血管內皮生長因子 (anti-VEGF) 等療法；若 K-ras 為原生型 (wild type)，則需接受過抗表皮生長因子受體 (anti-EGFR) 療法。

後使用，每次申請
事前審查之療程以
8週為限，再次申
請必須提出客觀證
據（如：影像學）
證實無惡化，才可
繼續使用。

2. 胃腸道間質瘤(GIST)
(105/8/1)

(1) 先前曾接受

imatinib 與
sunitinib 治療的
局部晚期、無法切
除或轉移性的胃腸
道間質瘤患者。

(2) 需經事前審查核准
後使用，每次申請
之療程以3個月為
限，送審時需檢送
影像資料，每3個
月評估一次。

9. 52. Vemurafenib (如
Zelboraf)
(104/11/1) :

1. 用於治療 BRAF V600 突變陽性 WHO 體能狀態 ≤ 2 且罹患無法切除(第 III 期)或轉移性(第 IV 期)黑色素瘤之病人。
2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，如發現病情惡化應停止使用。再申請應檢附前次治療結果評估資料。

9. 53. Panitumumab (如
Vectibix) : (105/4/1)

1. 與 FOLFOX(folinic acid/5-fluorouracil/oxalip

2. 須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 8 週為限，再次申請必須提出客觀證據（如：影像學）證實無惡化，才可繼續使用。

9. 52. Vemurafenib (如
Zelboraf)
(104/11/1) :

1. 用於治療 BRAF V600 突變陽性 WHO 體能狀態 ≤ 2 且罹患無法切除(第 III 期)或轉移性(第 IV 期)黑色素瘤之病人。
2. 需經事前審查核准後使用，每次申請療程以三個月為限，如發現病情惡化應停止使用。再申請應檢附前次治療結果評估資料。

atin)合併使用於治療
K-RAS 基因及 N-RAS 基
因沒有突變之轉移性直
腸結腸癌病患之第一線
治療。

2. 本藥品需經事前審查核
准後使用，每次申請事
前審查之療程以 12 週
為限，再次申請必須提
出客觀證據（如：影像
學）證實無惡化，才可
繼續使用。

3. 使用總療程以 24 週為上
限。

4. Vectibix+FOLFOX 與
Erbix+FOLFIRI 二者
僅能擇一使用。唯有在
無法忍受化療（其副作
用）時方可互換。

9.54. Enzalutamide (如 Xtandi) (105/9/1)

1. 治療藥物或手術去勢抗
性的轉移性前列腺癌
（ECOG 分數須 \leq 2）且
已使用過 docetaxel 2
個療程以上且治療無效
者。

2. 須經事前審查核准後使
用，每 3 個月需再次申
請。

3. 本品與 abiraterone 僅
能擇一使用。

9.55. Ruxolitinib (如 Jakavi) (105/10/1)

1. 用於治療

International
Working Group (IWG)
Consensus Criteria 中
度風險-2 或高風險之骨
髓纖維化，包括原發性

骨髓纖維化、真性紅血球增多症後骨髓纖維化、或血小板增多症後骨髓纖維化等疾病所造成脾臟腫大 (symptomatic splenomegaly) 及/或其他相關全身症狀且不適於接受幹細胞移植的病人(stem cell transplantation)。

2. 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以6個月為限，送審時需檢送影像資料及症狀改善之病歷紀錄，每6個月評估一次。

3. 用藥後，若沒有減少脾臟體積【(在增加脾臟長度與基期相較達40%(約為脾臟體積增加達25%)】且沒有明確的疾病相關之症狀改善，則不予同意使用。

4. Jakavi 5mg 每日限最多使用4粒，Jakavi 15mg 或 20mg 每日限最多使用2粒，且其5mg不得與15mg 或 20mg 併用。

9.56. Brentuximab vedotin (如 Adcetris)(105/10/1)

限用於成人患者：

1. 治療復發或頑固型

CD30+何杰金氏淋巴瘤(HL)：(1)已接受自體幹細胞移植(ASCT)，或(2)無法使用 ASCT 或多重藥物化療，且先前至少已接受兩種治療。

2. 治療復發或頑固型全身性退行分化型大細胞淋巴瘤(systemic anaplastic large cell lymphoma; sALCL)。

3. 每次申請療程以 4 個療程為限，再申請應檢附前次治療結果評估資料。若病人病情已達完全緩解，得再給付 4 個療程。健保給付以 16 個療程為上限。

9.57. Clofarabine (如 Evoltra) :
(106/1/1)

1. 使用於先前接受至少兩種化療療程(如 TPOG 之療程表)治療無效或已復發第二次或以上之急性淋巴母細胞白血病(acute lymphoblastic leukemia)病，且計畫進行造血幹細胞移植的病人(限 21 歲以下)，每位病人限給付一療程。

2. 須事前審查核准後使用，申請時須檢附完整之造血幹細胞移植計畫，並詳細記載確認捐贈者名單、確認移植之執行醫院及移植前調適治療等資料。

9.58. Axitinib (如 Inlyta)
(106/1/1)

1. 治療已接受過 sunitinib 或 cytokine 治療失敗的晚期腎細胞癌病患。

2. 無效後則不給付
temsirolimus 及其他酪
胺酸激酶阻斷劑
(tyrosine kinase
inhibitor, TKI)。
3. 需經事前審查核准後使
用，每次申請之療程以
3 個月為限，送審時需
檢送影像資料，每 3 個
月評估一次。

第 10 節 抗微生物劑

Antimicrobial agents

10.1. 抗微生物劑用藥給付規定通則：

1. 凡醫師診斷為感染症，確有臨床需要者得適當使用抗微生物製劑。
2. 門診使用抗微生物製劑以不超過三日份用量為原則。如有必要，每次以七日為限；慢性骨髓炎病患得視病情需要延長抗微生物製劑給藥日數，惟每次門診處方仍以兩週為上限 (87/7/1)。
3. 「上呼吸道感染病患」如屬一般感冒 (common cold) 或病毒性感染者，不應使用抗生素。如需使用，應有細菌性感染之臨床佐證，例如診斷為細菌性中耳炎、細菌性鼻竇炎、細菌性咽喉炎，始得使用抗生素治療 (90/2/1)。
4. 使用抗微生物製劑，宜以同療效、價廉為原則。使用三種抗微生物製劑(含)以上，需附微

第 10 節 抗微生物劑

Antimicrobial agents

10.1. 抗微生物劑用藥給付規定通則：

1. 凡醫師診斷為感染症，確有臨床需要者得適當使用抗微生物製劑。
2. 門診使用抗微生物製劑以不超過三日份用量為原則。如有必要，每次以七日為限；慢性骨髓炎病患得視病情需要延長抗微生物製劑給藥日數，惟每次門診處方仍以兩週為上限 (87/7/1)。
3. 「上呼吸道感染病患」如屬一般感冒 (common cold) 或病毒性感染者，不應使用抗生素。如需使用，應有細菌性感染之臨床佐證，例如診斷為細菌性中耳炎、細菌性鼻竇炎、細菌性咽喉炎，始得使用抗生素治療 (90/2/1)。
4. 使用抗微生物製劑，宜以同療效、價廉為原則。使用三種抗微生物製劑(含)以上，需附微

生物培養及藥物敏感試驗報告，藥物敏感試驗報告應包括第一線及第二線抗微生物製劑及各類常用藥物；同類同抗菌範疇之抗微生物製劑，若未能都進行藥物敏感性試驗時，得以其中之一種藥物的敏感性試驗結果做為使用其他同類同抗菌範疇藥物合理性之判定參考。

(87/4/1)

5. 使用抗微生物製劑應以本保險規定之第一線抗微生物製劑優先使用，如欲使用第一線以外之抗微生物製劑，需依規定第 6、7 項辦理。
6. 醫師得按下列病情及診斷於進行微生物培養及藥物敏感試驗後直接使用第一線以外抗微生物製劑，惟若微生物培養證明第一線抗微生物製劑有效，應考慮改用第一線抗微生物製劑。

(91/4/1)

- (1) 感染病情嚴重者，包括：
 - I. 敗血症(sepsis) 或敗血性休克 (septic shock)
 - II. 中樞神經感染
 - III. 使用呼吸器者。
- (2) 免疫狀態不良併發感染者：
 - I. 接受免疫抑制劑。
 - II. 接受抗癌化學療

生物培養及藥物敏感試驗報告，藥物敏感試驗報告應包括第一線及第二線抗微生物製劑及各類常用藥物；同類同抗菌範疇之抗微生物製劑，若未能都進行藥物敏感性試驗時，得以其中之一種藥物的敏感性試驗結果做為使用其他同類同抗菌範疇藥物合理性之判定參考。

(87/4/1)

5. 使用抗微生物製劑應以本保險規定之第一線抗微生物製劑優先使用，如欲使用第一線以外之抗微生物製劑，需依規定第 6、7 項辦理。
6. 醫師得按下列病情及診斷於進行微生物培養及藥物敏感試驗後直接使用第一線以外抗微生物製劑，惟若微生物培養證明第一線抗微生物製劑有效，應考慮改用第一線抗微生物製劑。

(91/4/1)

- (1) 感染病情嚴重者，包括：
 - I. 敗血症(sepsis) 或敗血性休克 (septic shock)
 - II. 中樞神經感染
 - III. 使用呼吸器者。
- (2) 免疫狀態不良併發感染者：
 - I. 接受免疫抑制劑。
 - II. 接受抗癌化學療

法。

III. 白血球數在
1000/cumm 以下或
多核白血球數在
500/cumm 以下。

- (3) 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）
(86/10/1、92/9/1)。
 - (4) 手術中發現有明顯感染病灶者。
 - (5) 脾臟切除病人有不明原因發熱者。
 - (6) 臟器穿孔。
 - (7) 嚴重污染傷口病人。
 - (8) 患疑似感染之早產兒及新生兒（出生二個月以內）。
 - (9) 發生明確嚴重院內感染症者。
 - (10) 常有厭氧菌與非厭氧菌混合感染之組織部位感染時(如糖尿病足部壞疽併感染、骨盆腔內感染)，得直接使用可同時治療厭氧菌與非厭氧菌多重感染之單一非第一線抗微生物製劑。
7. 醫師得按下列病情改用第一線以外抗微生物製劑：
- (1) 使用第一線抗微生物製劑超過 72 小時，經微生物培養及藥物敏感試驗證實對第一線抗微生物製劑具抗藥

法。

III. 白血球數在
1000/cumm 以下或
多核白血球數在
500/cumm 以下。

- (3) 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）
(86/10/1、92/9/1)。
 - (4) 手術中發現有明顯感染病灶者。
 - (5) 脾臟切除病人有不明原因發熱者。
 - (6) 臟器穿孔。
 - (7) 嚴重污染傷口病人。
 - (8) 患疑似感染之早產兒及新生兒（出生二個月以內）。
 - (9) 發生明確嚴重院內感染症者。
 - (10) 常有厭氧菌與非厭氧菌混合感染之組織部位感染時(如糖尿病足部壞疽併感染、骨盆腔內感染)，得直接使用可同時治療厭氧菌與非厭氧菌多重感染之單一非第一線抗微生物製劑。
7. 醫師得按下列病情改用第一線以外抗微生物製劑：
- (1) 使用第一線抗微生物製劑超過 72 小時，經微生物培養及藥物敏感試驗證實對第一線抗微生物製劑具抗藥

性，確有需要使用者，並請檢附該檢驗報告。

(2)每 72 小時更換第一線抗微生物製劑一次，歷經 7 日以上仍無效，由其他醫療機構轉送至有微生物培養室醫院病人者。

(3)嬰幼兒（出生二個月以上至滿五足歲）患疑似感染疾病，在使用第一線抗微生物製劑 72 小時仍無明顯療效者。

8. 預防性的使用抗微生物製劑：(105/2/1)。

(1)清淨的手術：大致可分甲、乙兩類。

甲類：如單純性疝氣手術、精索靜脈曲張手術、甲狀腺手術、乳房切除手術…等，原則上可「免用」抗微生物製劑，如需使用，可術前一劑量，手術時間超過二小時者得於術中追加一劑，使用之抗微生物製劑應以本表之第一線抗微生物製劑為限（90/2/1）。

乙類：如心臟手術、腦部手術、臟

性，確有需要使用者，並請檢附該檢驗報告。

(2)每 72 小時更換第一線抗微生物製劑一次，歷經 7 日以上仍無效，由其他醫療機構轉送至有微生物培養室醫院病人者。

(3)嬰幼兒（出生二個月以上至滿五足歲）患疑似感染疾病，在使用第一線抗微生物製劑 72 小時仍無明顯療效者。

8. 預防性的使用抗微生物製劑：

(1)清淨的手術：大致可分甲、乙兩類。

甲類：如單純性疝氣手術、精索靜脈曲張手術、甲狀腺手術、乳房切除手術…等，原則上可「免用」抗微生物製劑，如需使用，可術前一劑量，手術時間超過二小時者得於術中追加一劑，使用之抗微生物製劑應以本表之第一線抗微生物製劑為限（90/2/1）。

乙類：如心臟手術、腦部手術、臟

器移植手術及放置人工植入物之手術，原則上使用不可超過 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主；如需使用第一線以外之抗微生物製劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查（90/2/1、95/6/1）

(2) 清淨但易受污染的手術。

術野是清淨但術中易受污染，如肝膽胃腸手術、泌尿道手術、肺部手術、婦科手術、耳鼻喉科手術、牙科手術…等手術。原則上抗微生物製劑使用 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主，若有厭氧菌與嗜氧菌混合污染之可能時，得使用 Cephamycin (cefoxitin, cefmetazole) 或 ampicillin 類合併 β -lactamase inhibitor (ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid) 之藥物；如需使用第一線以外之抗微生物製

器移植手術及放置人工植入物之手術，原則上使用不可超過 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主；如需使用第一線以外之抗微生物製劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查（90/2/1、95/6/1）

(2) 清淨但易受污染的手術。

術野是清淨但術中易受污染，如肝膽胃腸手術、泌尿道手術、肺部手術、婦科手術、耳鼻喉科手術、牙科手術…等手術。原則上抗微生物製劑使用 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主，若有厭氧菌與嗜氧菌混合污染之可能時，得使用 Cephamycin (cefoxitin, cefmetazole) 或 ampicillin 類合併 β -lactamase inhibitor (ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid) 之藥物；如需使用第一線以外之抗微生物製

劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查（90/2/1、95/6/1）。

(3) 免疫不全病人經醫師

判斷感染風險高，依實證及流行病學資料及相關治療指引等，經感染症專科醫師認定需使用者，得適當使用預防性抗微生物製劑。申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。
(105/2/1)。

9. 污染性傷口之手術及手術後發生感染併發症，依本保險規定之抗微生物製劑使用原則用藥（90/2/1）。
10. 本保險第一線抗微生物製劑範圍暫訂如附表一，並得視實際需要予以增減。
11. 使用本表以外之抗微生物製劑超過七日時，除需附微生物培養與敏感試驗報告外，尚需附相關檢驗報告（如血、尿…等）與 TPR chart 影本並註明使用抗微生物製劑之規格、劑量、使用日期以利審核。
12. 非第一線抗微生物製劑其於本藥品給付規定中另訂有規定者，依各該規定給付之。
13. 有關結核病治療選擇的藥物種類、使用的劑量與治療的時程，應依衛

劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查（90/2/1、95/6/1）。

9. 污染性傷口之手術及手術後發生感染併發症，依本保險規定之抗微生物製劑使用原則用藥（90/2/1）。
10. 本保險第一線抗微生物製劑範圍暫訂如附表一，並得視實際需要予以增減。
11. 使用本表以外之抗微生物製劑超過七日時，除需附微生物培養與敏感試驗報告外，尚需附相關檢驗報告（如血、尿…等）與 TPR chart 影本並註明使用抗微生物製劑之規格、劑量、使用日期以利審核。
12. 非第一線抗微生物製劑其於本藥品給付規定中另訂有規定者，依各該規定給付之。
13. 有關結核病治療選擇的藥物種類、使用的劑量與治療的時程，應依衛

| | | |
|--|--|--|
| <p>生福利部疾病管制署最新 版「結核病診治指引」 辦理(網址 http://www.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=5710&ctNode=1540&mp=230)。 (99/11/1、102/7/23)</p> <p>10.2. 盤尼西林類 Penicillins</p> <p>10.2.1. Amoxicillin + clavulanic acid (如 Augmentin tab) : (85/1/1)</p> <p>用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 厭氧性細菌感染。 4. 菌血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 <p>10.2.2. Ampicillin + sulbactam 注射劑 (如 Unasyn 注射劑、Ansellina 注射劑) : (91/7/1)</p> <p>單次處方劑量為 1.5 公克時，不得以 0.75 公克兩瓶申報。</p> <p>10.3. 頭孢子菌素 Cephalosporins</p> <p>10.3.1. Cefaclor : (85/1/1、89/7/1)</p> <p>用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 敗血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 | <p>生福利部疾病管制署最新 版「結核病診治指引」 辦理(網址 http://www.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=5710&ctNode=1540&mp=230)。 (99/11/1、102/7/23)</p> <p>10.2. 盤尼西林類 Penicillins</p> <p>10.2.1. Amoxicillin + clavulanic acid (如 Augmentin tab) : (85/1/1)</p> <p>用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 厭氧性細菌感染。 4. 菌血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 <p>10.2.2. Ampicillin + sulbactam 注射劑 (如 Unasyn 注射劑、Ansellina 注射劑) : (91/7/1)</p> <p>單次處方劑量為 1.5 公克時，不得以 0.75 公克兩瓶申報。</p> <p>10.3. 頭孢子菌素 Cephalosporins</p> <p>10.3.1. Cefaclor : (85/1/1、89/7/1)</p> <p>用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 敗血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>10.3.2. Cefuroxime tab : (87/4/1) 用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 敗血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 <p>10.3.3. Ceftriaxone : (95/6/1) 用於疑似或證實為淋病尿道炎、子宮頸炎、軟性下疳時，可第一線單一劑量使用。</p> <p>10.3.4. Cefixime : (95/6/1) 用於疑似或證實為淋病尿道炎、子宮頸炎、軟性下疳時，可第一線單一劑量使用。</p> <p>10.4. 巨環類 Macrolides (如 erythromycin、azithromycin、clarithromycin、roxithromycin) : (90/11/1、93/9/1、97/12/1、98/10/1、100/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於經臨床診斷或實驗室診斷為黴漿菌 (mycoplasma) 或披衣菌 (chlamydia) 或退伍軍人桿菌 (legionella) 引起之感染、或經培養證實為 macrolides 有效之致病菌感染 (需於病歷記載診斷依據，俾利審查)。 2. (1) Azithromycin | <p>10.3.2. Cefuroxime tab : (87/4/1) 用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。 2. 急性下呼吸道感染。 3. 敗血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。 <p>10.3.3. Ceftriaxone : (95/6/1) 用於疑似或證實為淋病尿道炎、子宮頸炎、軟性下疳時，可第一線單一劑量使用。</p> <p>10.3.4. Cefixime : (95/6/1) 用於疑似或證實為淋病尿道炎、子宮頸炎、軟性下疳時，可第一線單一劑量使用。</p> <p>10.4. 巨環類 Macrolides (如 erythromycin、azithromycin、clarithromycin、roxithromycin) : (90/11/1、93/9/1、97/12/1、98/10/1、100/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於經臨床診斷或實驗室診斷為黴漿菌 (mycoplasma) 或披衣菌 (chlamydia) 或退伍軍人桿菌 (legionella) 引起之感染、或經培養證實為 macrolides 有效之致病菌感染 (需於病歷記載診斷依據，俾利審查)。 2. (1) Azithromycin | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>a. 錠劑膠囊劑(如 Zithromax capsules)使用期間不得超過3日，每日最大劑量500mg。對於「禽結核桿菌(Mycobacterium avium-intracellulare complex, MAC)」感染患者，使用期限及劑量則不受上述之限制。(100/5/1)</p> <p>b. 口服液劑(如 Zithromax Powder for Oral Suspension)使用期間不得超過3日，每日最大劑量500mg。(100/5/1)</p> <p>(2)Azithromycin 長效製劑(如 Zmax extended release powder for oral suspension)限單次投予，每次最大劑量為2g；不受全民健康保險藥品給付規定通則八之限制。(97/12/1、100/5/1)</p> <p>3. (1)Clarithromycin (如 Klaricid Tab、Klaricid Paediatric Suspension)使用期間不得超過10日，每日最大劑量500mg。對於「非結核分枝(耐酸)桿菌(NTM)」感染患者，</p> | <p>a. 錠劑膠囊劑(如 Zithromax capsules)使用期間不得超過3日，每日最大劑量500mg。對於「禽結核桿菌(Mycobacterium avium-intracellulare complex, MAC)」感染患者，使用期限及劑量則不受上述之限制。(100/5/1)</p> <p>b. 口服液劑(如 Zithromax Powder for Oral Suspension)使用期間不得超過3日，每日最大劑量500mg。(100/5/1)</p> <p>(2)Azithromycin 長效製劑(如 Zmax extended release powder for oral suspension)限單次投予，每次最大劑量為2g；不受全民健康保險藥品給付規定通則八之限制。(97/12/1、100/5/1)</p> <p>3. (1)Clarithromycin (如 Klaricid Tab、Klaricid Paediatric Suspension)使用期間不得超過10日，每日最大劑量500mg。對於「非結核分枝(耐酸)桿菌(NTM)」感染患者，</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>每日得使用 1000mg，且得持續使用 6 個月以上。 (93/9/1、100/5/1)</p> <p>(2)Clarithromycin (如 Klaricid Tab) 用於 消化性潰瘍之胃幽門 桿菌消除治療，使用 總量以 28 顆 (每顆 250mg) 為限；依比 例換算使用 clarithromycin 500mg 者，則使用總 量以 14 顆為限。 (98/10/1、100/5/1)</p> <p>4. Roxithromycin (如 Rulid)使用期間不得超 過 10 日，每日最大劑量 500mg。(100/5/1)</p> <p>5. 本類製劑應儘量避免合 併使用其他抗生素，用 於治療「非結核分枝(耐 酸)桿菌 (NTM)」者不在 此限。(100/5/1)</p> <p>10. 5. Carbapenem 類抗微生物 製劑：</p> <p>10. 5. 1. Imipenem + cilastatin (如 Tienam)；meropenem (如 Mepem)： (87/11/1、93/2/1、 93/5/1、99/5/1、 99/8/1)</p> <p>1. 經細菌培養證實有意義 之致病菌且對其他抗微 生物製劑均具抗藥性， 而對 carbapenem 具有感 受性 (sensitivity)。</p> <p>2. 經細菌培養，發現有意 義之致病菌對</p> | <p>每日得使用 1000mg，且得持續使 用 6 個月以上。 (93/9/1、100/5/1)</p> <p>(2)Clarithromycin (如 Klaricid Tab) 用於 消化性潰瘍之胃幽門 桿菌消除治療，使用 總量以 28 顆 (每顆 250mg) 為限；依比 例換算使用 clarithromycin 500mg 者，則使用總 量以 14 顆為限。 (98/10/1、100/5/1)</p> <p>4. Roxithromycin (如 Rulid)使用期間不得超 過 10 日，每日最大劑量 500mg。(100/5/1)</p> <p>5. 本類製劑應儘量避免合 併使用其他抗生素，用 於治療「非結核分枝(耐 酸)桿菌 (NTM)」者不在 此限。(100/5/1)</p> <p>10. 5. Carbapenem 類抗微生物 製劑：</p> <p>10. 5. 1. Imipenem + cilastatin (如 Tienam)；meropenem (如 Mepem)： (87/11/1、93/2/1、 93/5/1、99/5/1、 99/8/1)</p> <p>1. 經細菌培養證實有意義 之致病菌且對其他抗微 生物製劑均具抗藥性， 而對 carbapenem 具有感 受性 (sensitivity)。</p> <p>2. 經細菌培養，發現有意 義之致病菌對</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>carbapenem 及其他抗微生物製劑具有感受性，但病患對其他抗微生物製劑過敏無其他藥物可供選用時。</p> <p>3. 臨床上為嚴重之細菌感染，且經其他廣效性的非第一線抗微生物製劑治療仍無法控制病情者。</p> <p>4. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）。(93/5/1)</p> <p>10.5.2. Ertapenem（如 Invanz inj.）： （93/5/1、96/12/1）</p> <p>1. 臨床上為中、重度細菌感染，且經其他抗微生物製劑治療仍無法控制病情者，但限用於： （1）複雜的腹腔內感染 （2）感染性肺炎 （3）急性骨盆感染</p> <p>2. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）。</p> <p>10.5.3. Doripenem（如 Finibax）：(99/8/1)</p> <p>1. 經細菌培養證實有意義之致病菌且對其他抗微生物製劑均具抗藥性或對其他具有感受性抗微生物製劑過敏，而對 carbapenem 具有感受性 (sensitivity) 之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎</p> | <p>carbapenem 及其他抗微生物製劑具有感受性，但病患對其他抗微生物製劑過敏無其他藥物可供選用時。</p> <p>3. 臨床上為嚴重之細菌感染，且經其他廣效性的非第一線抗微生物製劑治療仍無法控制病情者。</p> <p>4. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）。(93/5/1)</p> <p>10.5.2. Ertapenem（如 Invanz inj.）： （93/5/1、96/12/1）</p> <p>1. 臨床上為中、重度細菌感染，且經其他抗微生物製劑治療仍無法控制病情者，但限用於： （1）複雜的腹腔內感染 （2）感染性肺炎 （3）急性骨盆感染</p> <p>2. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）。</p> <p>10.5.3. Doripenem（如 Finibax）：(99/8/1)</p> <p>1. 經細菌培養證實有意義之致病菌且對其他抗微生物製劑均具抗藥性或對其他具有感受性抗微生物製劑過敏，而對 carbapenem 具有感受性 (sensitivity) 之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>炎)及複雜性腹腔內感染。</p> <p>2. 臨床上為嚴重之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)及複雜性腹腔內感染，且經其他廣效性的非第一線抗微生物製劑治療仍無法控制病情者。</p> <p>3. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者(申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料)。</p> <p>10.6. 抗黴菌劑 Antifungal drugs</p> <p>10.6.1. Fluconazole oral (如 Diflucan oral) : (85/10/1、87/4/1) 限</p> <p>1. 全身黴菌感染之治療。</p> <p>2. 免疫不全病例，治療或預防黴菌感染時使用。</p> <p>3. 非愛滋病隱球菌腦膜炎患者使用，原則上使用6到8週，視病人臨床反應，抗原效價及培養結果調整療期，而治黴菌藥物之終止以效價下降四倍及兩次培養陰性為原則。</p> <p>4. 用於念珠性陰道炎，限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療者單一劑量使用。</p> <p>10.6.2. Fluconazole Inj (如 Diflucan inj) : (85/10/1) 限</p> <p>1. 已證實為全身性黴菌感</p> | <p>炎)及複雜性腹腔內感染。</p> <p>2. 臨床上為嚴重之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)及複雜性腹腔內感染，且經其他廣效性的非第一線抗微生物製劑治療仍無法控制病情者。</p> <p>3. 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者(申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料)。</p> <p>10.6. 抗黴菌劑 Antifungal drugs</p> <p>10.6.1. Fluconazole oral (如 Diflucan oral) : (85/10/1、87/4/1) 限</p> <p>1. 全身黴菌感染之治療。</p> <p>2. 免疫不全病例，治療或預防黴菌感染時使用。</p> <p>3. 非愛滋病隱球菌腦膜炎患者使用，原則上使用6到8週，視病人臨床反應，抗原效價及培養結果調整療期，而治黴菌藥物之終止以效價下降四倍及兩次培養陰性為原則。</p> <p>4. 用於念珠性陰道炎，限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療者單一劑量使用。</p> <p>10.6.2. Fluconazole Inj (如 Diflucan inj) : (85/10/1) 限</p> <p>1. 已證實為全身性黴菌感</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>染(經組織或培養證實)病例使用。</p> <p>2. 非愛滋病隱球菌腦膜炎患者使用，原則上使用6到8週，視病人臨床反應，抗原效價及培養結果調整療期，而治黴菌藥物之終止以效價下降四倍及兩次培養陰性為原則。</p> <p>10.6.3. Itraconazole： (85/1/1、91/4/1、91/8/1、96/6/1、96/8/1、96/10/1、98/8/1)</p> <p>10.6.3.1. Itraconazole 膠囊劑(如 Sporanox cap)： (85/1/1、91/4/1、91/8/1、98/8/1、104/1/1) 限</p> <p>1. 甲癬病人使用。使用時，手指甲癬限用84顆，每顆100mg(以itraconazole 100mg計算，每日服用2顆)，需於9週內使用完畢。足趾甲癬限用168顆，需於17週內使用完畢。治療結束日起算，並各在6及12個月內不得重複使用本品或其他同類口服藥品。(91/4/1、98/8/1)</p> <p>2. 念珠性陰道炎(限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療病人)。</p> <p>3. 其他頑固性體癬。</p> <p>4. 全身性或侵入性黴菌感染(經組織切片、微生物</p> | <p>染(經組織或培養證實)病例使用。</p> <p>2. 非愛滋病隱球菌腦膜炎患者使用，原則上使用6到8週，視病人臨床反應，抗原效價及培養結果調整療期，而治黴菌藥物之終止以效價下降四倍及兩次培養陰性為原則。</p> <p>10.6.3. Itraconazole： (85/1/1、91/4/1、91/8/1、96/6/1、96/8/1、96/10/1、98/8/1)</p> <p>10.6.3.1. Itraconazole 膠囊劑(如 Sporanox cap)： (85/1/1、91/4/1、91/8/1、98/8/1、104/1/1) 限</p> <p>1. 甲癬病人使用。使用時，手指甲癬限用84顆，每顆100mg(以itraconazole 100mg計算，每日服用2顆)，需於9週內使用完畢。足趾甲癬限用168顆，需於17週內使用完畢。治療結束日起算，並各在6及12個月內不得重複使用本品或其他同類口服藥品。(91/4/1、98/8/1)</p> <p>2. 念珠性陰道炎(限頑固性疾病或無性經驗病人無法使用塞劑治療病人)。</p> <p>3. 其他頑固性體癬。</p> <p>4. 全身性或侵入性黴菌感染(經組織切片、微生物</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>或抗原檢測確定之全身性或侵入性黴菌感染，且經感染症專科醫師或皮膚科專科醫師判定需使用本劑者，以 12 週至 24 週為原則)。(91/8/1、98/8/1)</p> <p>5. 用於復發性汗斑之治療，每日使用 200mg 治療 7 天為一療程，每月以一療程為限。(104/1/1)</p> <p>6. 每次門診時，應註明使用日期，目前已使用週數及預定停藥日期。</p> <p>7. 病人接受本品治療期間，不得併用其他同類藥品。</p> <p>10. 6. 3. 2. Itraconazole 注射劑 (如 Sporanox inj.): (96/6/1、96/8/1、99/10/1)</p> <p>1. 限用於第一線治療藥物 amphotericin B 治療無效或有嚴重副作用之侵入性麴菌症、侵入性念珠菌感染症、組織漿病菌之第二線用藥使用，以 14 日為限。</p> <p>2. 限用於第一線治療藥物無法使用或無效的免疫功能不全及中樞神經系統罹患隱球菌病(包括隱球菌腦膜炎)的病人，並以 14 日為限。</p> <p>3. 因病情需要，經感染症專科醫師會診確認需要使用者(申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料)。(96/8/1、</p> | <p>或抗原檢測確定之全身性或侵入性黴菌感染，且經感染症專科醫師或皮膚科專科醫師判定需使用本劑者，以 12 週至 24 週為原則)。(91/8/1、98/8/1)</p> <p>5. 用於復發性汗斑之治療，每日使用 200mg 治療 7 天為一療程，每月以一療程為限。(104/1/1)</p> <p>6. 每次門診時，應註明使用日期，目前已使用週數及預定停藥日期。</p> <p>7. 病人接受本品治療期間，不得併用其他同類藥品。</p> <p>10. 6. 3. 2. Itraconazole 注射劑 (如 Sporanox inj.): (96/6/1、96/8/1、99/10/1)</p> <p>1. 限用於第一線治療藥物 amphotericin B 治療無效或有嚴重副作用之侵入性麴菌症、侵入性念珠菌感染症、組織漿病菌之第二線用藥使用，以 14 日為限。</p> <p>2. 限用於第一線治療藥物無法使用或無效的免疫功能不全及中樞神經系統罹患隱球菌病(包括隱球菌腦膜炎)的病人，並以 14 日為限。</p> <p>3. 因病情需要，經感染症專科醫師會診確認需要使用者(申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料)。(96/8/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>99/10/1)</p> <p>10.6.3.3. Itraconazole 內服液劑 (如 Itraconazole oral solution): (96/10/1)</p> <p>限用於 HIV 陽性反應及其它免疫功能不全病人的口腔念珠菌感染及食道念珠菌感染者。</p> <p>10.6.4. Terbinafine (如 Lamisil tab): (85/1/1、91/4/1、98/8/1)</p> <p>限</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 手指甲癬及足趾甲癬病例使用，每日 250 mg，手指甲癬限用 42 顆，需於 8 週內使用完畢。足趾甲癬限用 84 顆，需於 16 週內使用完畢。治療結束日起算，各在 6 及 12 個月內不得重複使用本品或其他同類口服藥品。(98/8/1) 2. 其他頑固性體癬及股癬病例使用，每日一次，最長使用 2 週，治療期間不得併用其他同類藥品。 3. 頭癬病例使用，每日一次，最長使用 4 週，若確需延長治療時間，需於病歷詳細載明備查。(98/8/1) <p>10.6.5. Amphotericin B Injection colloidal dispersion 及 liposomal complex 劑型 (如 Amphocil Injection、AmBisome for</p> | <p>99/10/1)</p> <p>10.6.3.3. Itraconazole 內服液劑 (如 Itraconazole oral solution): (96/10/1)</p> <p>限用於 HIV 陽性反應及其它免疫功能不全病人的口腔念珠菌感染及食道念珠菌感染者。</p> <p>10.6.4. Terbinafine (如 Lamisil tab): (85/1/1、91/4/1、98/8/1)</p> <p>限</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 手指甲癬及足趾甲癬病例使用，每日 250 mg，手指甲癬限用 42 顆，需於 8 週內使用完畢。足趾甲癬限用 84 顆，需於 16 週內使用完畢。治療結束日起算，各在 6 及 12 個月內不得重複使用本品或其他同類口服藥品。(98/8/1) 2. 其他頑固性體癬及股癬病例使用，每日一次，最長使用 2 週，治療期間不得併用其他同類藥品。 3. 頭癬病例使用，每日一次，最長使用 4 週，若確需延長治療時間，需於病歷詳細載明備查。(98/8/1) <p>10.6.5. Amphotericin B Injection colloidal dispersion 及 liposomal complex 劑型 (如 Amphocil Injection、AmBisome for</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Injection) : (91/8/1、93/2/1) 限用於侵入性黴菌感染 (invasive fungal infection)，且腎功能不全患者</p> <p>10.6.6. Caspofungin Injection 劑型 (如 Cancidas Injection 50mg) : (92/8/1、94/1/1、96/7/1、99/10/1) 限符合下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於其他黴菌藥物治療無效或有嚴重副作用之侵入性麴菌症、侵入性念珠菌感染症之第二線用藥。 2. 經感染症專科醫師認定需使用者，惟治療食道念珠菌感染限用於 fluconazole 無效或有嚴重副作用者。 (99/10/1) <p>10.6.7. Micafungin Injection 劑型(如 Mycamine for Injection) : (96/4/1)(97/10/1) 限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治療 16 歲以上成人的食道念珠菌感染。 2. 預防接受造血幹細胞移植病患的念珠菌感染。 3. 治療念珠菌血症與其他侵襲性之念珠菌感染。 (97/10/1) <p>10.6.8. Flucytosine (如 Flusine Tablets)(96/6/1)</p> | <p>Injection) : (91/8/1、93/2/1) 限用於侵入性黴菌感染 (invasive fungal infection)，且腎功能不全患者</p> <p>10.6.6. Caspofungin Injection 劑型 (如 Cancidas Injection 50mg) : (92/8/1、94/1/1、96/7/1、99/10/1) 限符合下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於其他黴菌藥物治療無效或有嚴重副作用之侵入性麴菌症、侵入性念珠菌感染症之第二線用藥。 2. 經感染症專科醫師認定需使用者，惟治療食道念珠菌感染限用於 fluconazole 無效或有嚴重副作用者。 (99/10/1) <p>10.6.7. Micafungin Injection 劑型(如 Mycamine for Injection) : (96/4/1)(97/10/1) 限用於</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 治療 16 歲以上成人的食道念珠菌感染。 2. 預防接受造血幹細胞移植病患的念珠菌感染。 3. 治療念珠菌血症與其他侵襲性之念珠菌感染。 (97/10/1) <p>10.6.8. Flucytosine (如 Flusine Tablets)(96/6/1)</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>限用於 Cryptococcus infection 的病患。</p> <p>10.6.9. Anidulafungin 注射劑 (如 Eraxis for Injection) (97/10/1、105/8/1)</p> <p>限用於治療成人<u>侵襲性念珠菌感染</u>。</p> <p>10.6.10. Posaconazole (如 Posanol) : (101/1/1、104/7/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1) 對 amphotericin B 或 itraconazole 或 voriconazole 治療無效或不能忍受之成人侵入性麴菌病 (invasive aspergillosis) 的第二線用藥。(無效的定義是先前用有效抗黴菌劑的治療劑量至少 7 天，感染惡化或未改善)。</p> <p>(2) 對 itraconazole 或 fluconazole 治療無效或不能忍受之成人<u>口咽念珠菌感染</u> (oropharyngeal candidiasis) 的第二線用藥。(無效的定義是先前用有效抗黴菌劑的治療劑量至少治療一段時間：持續性黴菌血症 3 天，非黴菌血症型感染 7 天，食道念珠菌病 14 天，感染惡化或未改善) 限使用口服懸液</p> | <p>限用於 Cryptococcus infection 的病患。</p> <p>10.6.9. Anidulafungin 注射劑 (如 Eraxis for Injection) (97/10/1)</p> <p>限用於治療<u>非白血球低下之成人念珠菌血症、念珠菌腹膜炎及念珠菌腹腔內膿瘍</u>。</p> <p>10.6.10. Posaconazole (如 Posanol) : (101/1/1、104/7/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1) 對 amphotericin B 或 itraconazole 或 voriconazole 治療無效或不能忍受之成人侵入性麴菌病 (invasive aspergillosis) 的第二線用藥。(無效的定義是先前用有效抗黴菌劑的治療劑量至少 7 天，感染惡化或未改善)。</p> <p>(2) 對 itraconazole 或 fluconazole 治療無效或不能忍受之成人<u>口咽念珠菌感染</u> (oropharyngeal candidiasis) 的第二線用藥。(無效的定義是先前用有效抗黴菌劑的治療劑量至少治療一段時間：持續性黴菌血症 3 天，非黴菌血症型感染 7 天，食道念珠菌病 14 天，感染惡化或未改善) 限使用口服懸液</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>劑劑型。(104/7/1)</p> <p>(3)用於造血幹細胞移植接受者因發生嚴重(grade III、IV)急性植體宿主反應(acute graft versus host reaction, GVHD),而接受高劑量免疫抑制劑(prednisolone 使用劑量超過 0.8mg/kg/day)治療之 13 歲以上高危險病人,做為預防侵入性黴菌感染,使用期間以 3 個月為限。</p> <p>(4)急性骨髓性白血病(acute myelogenous leukemia)或高危險骨髓化生不良症候群(myelodysplastic syndrome)病人接受誘導性化學治療者,給付條件如下: (104/7/1)</p> <p>I. 用於初診斷之誘導性化學治療、誘導失敗進行第二次誘導性化學治療,或復發病患進行復發後第一次誘導性化學治療者。</p> <p>II. 誘導性化學治療需使用 「cytarabine(Ara-C)7 天及 anthracycline 類藥物 3 天」、或 「高劑量 Ara-C」、或「老年人(>60 歲)使用</p> | <p>劑劑型。(104/7/1)</p> <p>(3)用於造血幹細胞移植接受者因發生嚴重(grade III、IV)急性植體宿主反應(acute graft versus host reaction, GVHD),而接受高劑量免疫抑制劑(prednisolone 使用劑量超過 0.8mg/kg/day)治療之 13 歲以上高危險病人,做為預防侵入性黴菌感染,使用期間以 3 個月為限。</p> <p>(4)急性骨髓性白血病(acute myelogenous leukemia)或高危險骨髓化生不良症候群(myelodysplastic syndrome)病人接受誘導性化學治療者,給付條件如下: (104/7/1)</p> <p>I. 用於初診斷之誘導性化學治療、誘導失敗進行第二次誘導性化學治療,或復發病患進行復發後第一次誘導性化學治療者。</p> <p>II. 誘導性化學治療需使用 「cytarabine(Ara-C)7 天及 anthracycline 類藥物 3 天」、或 「高劑量 Ara-C」、或「老年人(>60 歲)使用</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>cytarabine (Ara-C)5 天及 anthracycline 類藥物 2 天」、或較上述療法更強的化學治療。</p> <p>III. 自化學治療第一天開始使用，當絕對嗜中性白血球數 (absolute neutrophil count, ANC) 大於 500/mm³，或出現侵入性黴菌感染時應停止使用。每次療程投予 posaconazole 預防以一個月為限，最多給付 2 次誘導性化學治療療程。</p> <p>2. 使用本藥須經感染症專科醫師會診確認需要使用，申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。</p> <p>10.7. 抗病毒劑 Antiviral drugs (98/11/1)</p> <p>10.7.1. 抗疱疹病毒劑 (98/11/1)</p> <p>10.7.1.1. 全身性抗疱疹病毒劑</p> <p>1. Acyclovir : (98/11/1、100/7/1)</p> <p>(1) 使用本類製劑應以下列條件為限：</p> <p>I. 疱疹性腦炎。</p> <p>II. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 VI 皮節，可能危及眼角</p> | <p>cytarabine (Ara-C)5 天及 anthracycline 類藥物 2 天」、或較上述療法更強的化學治療。</p> <p>III. 自化學治療第一天開始使用，當絕對嗜中性白血球數 (absolute neutrophil count, ANC) 大於 500/mm³，或出現侵入性黴菌感染時應停止使用。每次療程投予 posaconazole 預防以一個月為限，最多給付 2 次誘導性化學治療療程。</p> <p>2. 使用本藥須經感染症專科醫師會診確認需要使用，申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。</p> <p>10.7. 抗病毒劑 Antiviral drugs (98/11/1)</p> <p>10.7.1. 抗疱疹病毒劑 (98/11/1)</p> <p>10.7.1.1. 全身性抗疱疹病毒劑</p> <p>1. Acyclovir : (98/11/1、100/7/1)</p> <p>(1) 使用本類製劑應以下列條件為限：</p> <p>I. 疱疹性腦炎。</p> <p>II. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 VI 皮節，可能危及眼角</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>膜者。</p> <p>III. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯薦椎S2皮節，將影響排泄功能者。</p> <p>IV. 免疫機能不全、癌症、器官移植等病患之感染帶狀疱疹或單純性疱疹者。</p> <p>V. 新生兒或免疫機能不全患者的水痘感染。</p> <p>VI. 罹患水痘，合併高燒(口溫 38°C 以上)及肺炎(需 X 光顯示)或腦膜炎，並需住院者(85/1/1)。</p> <p>VII. 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。</p> <p>VIII. 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。</p> <p>IX. 帶狀疱疹發疹三日內且感染部位在頭頸部、生殖器周圍之病人，可給予五日內之口服或外用藥品(86/1/1、87/4/1)。</p> <p>X. 骨髓移植術後病患得依下列規定預防性使用 acyclovir：(87/11/1)</p> <p>A. 限接受異體骨髓</p> | <p>膜者。</p> <p>III. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯薦椎S2皮節，將影響排泄功能者。</p> <p>IV. 免疫機能不全、癌症、器官移植等病患之感染帶狀疱疹或單純性疱疹者。</p> <p>V. 新生兒或免疫機能不全患者的水痘感染。</p> <p>VI. 罹患水痘，合併高燒(口溫 38°C 以上)及肺炎(需 X 光顯示)或腦膜炎，並需住院者(85/1/1)。</p> <p>VII. 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。</p> <p>VIII. 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。</p> <p>IX. 帶狀疱疹發疹三日內且感染部位在頭頸部、生殖器周圍之病人，可給予五日內之口服或外用藥品(86/1/1、87/4/1)。</p> <p>X. 骨髓移植術後病患得依下列規定預防性使用 acyclovir：(87/11/1)</p> <p>A. 限接受異體骨髓</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>移植病患。</p> <p>B. 接受高劑量化療或全身放射治療 (TBI) 前一天至移植術後第三十天為止。</p> <p>(2) 其中 I 與 VI 應優先考慮注射劑型的 acyclovir。疱疹性腦炎得使用 14 至 21 天。(95/6/1、100/7/1)</p> <p>2. Famciclovir ; valaciclovir : (100/7/1、101/5/1)</p> <p>使用本類製劑應以下列條件為限：</p> <p>(1) 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 VI 皮節，可能危及眼角膜者。</p> <p>(2) 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯薦椎 S2 皮節，將影響排泄功能者。</p> <p>(3) 免疫機能不全、癌症、器官移植等病患之感染帶狀疱疹或單純性疱疹者。</p> <p>(4) 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。</p> <p>(5) 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。</p> <p>(6) 帶狀疱疹發疹 3 日內且感染部位在頭頸部、生殖器周圍之病人，可給予 5 日內之口服或外用藥品。</p> <p>(7) 骨髓移植術後病患得</p> | <p>移植病患。</p> <p>B. 接受高劑量化療或全身放射治療 (TBI) 前一天至移植術後第三十天為止。</p> <p>(2) 其中 I 與 VI 應優先考慮注射劑型的 acyclovir。疱疹性腦炎得使用 14 至 21 天。(95/6/1、100/7/1)</p> <p>2. Famciclovir ; valaciclovir : (100/7/1、101/5/1)</p> <p>使用本類製劑應以下列條件為限：</p> <p>(1) 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 VI 皮節，可能危及眼角膜者。</p> <p>(2) 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯薦椎 S2 皮節，將影響排泄功能者。</p> <p>(3) 免疫機能不全、癌症、器官移植等病患之感染帶狀疱疹或單純性疱疹者。</p> <p>(4) 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。</p> <p>(5) 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。</p> <p>(6) 帶狀疱疹發疹 3 日內且感染部位在頭頸部、生殖器周圍之病人，可給予 5 日內之口服或外用藥品。</p> <p>(7) 骨髓移植術後病患得</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>依下列規定用於預防復發性生殖器疱疹： (101/5/1)</p> <p>A. 限接受異體骨髓移植病患。</p> <p>B. 接受高劑量化療或全身放射治療(TBI)前一天至移植術後第30天為止。</p> <p>3. Acyclovir、famciclovir 及 valaciclovir 除上述特別規定外，使用療程原則以10天為限，口服、注射劑及外用藥膏擇一使用，不得合併使用。 (95/6/1、100/7/1、101/5/1)</p> <p>10. 7. 1. 2. 局部抗疱疹病毒劑(如 Acyclovir 外用製劑；tromantadine 外用製劑；penciclovir 外用製劑)：(97/12/1、98/11/1、100/7/1、102/7/1)</p> <p>1. 單純性疱疹(感染部位在頭頸部、生殖器周圍、嘴唇、口腔、陰部)3日內可使用 acyclovir 或 tromantadine 藥膏，每次給予藥量限5公克以內(100/7/1)。</p> <p>2. Penciclovir 藥膏用於治療由單純疱疹病毒引起之復發性唇疱疹，每次處方以1支(2公克)為原則。(102/7/1)</p> <p>3. 口服、注射劑及外用藥膏擇一使用，不得合併</p> | <p>依下列規定用於預防復發性生殖器疱疹： (101/5/1)</p> <p>A. 限接受異體骨髓移植病患。</p> <p>B. 接受高劑量化療或全身放射治療(TBI)前一天至移植術後第30天為止。</p> <p>3. Acyclovir、famciclovir 及 valaciclovir 除上述特別規定外，使用療程原則以10天為限，口服、注射劑及外用藥膏擇一使用，不得合併使用。 (95/6/1、100/7/1、101/5/1)</p> <p>10. 7. 1. 2. 局部抗疱疹病毒劑(如 Acyclovir 外用製劑；tromantadine 外用製劑；penciclovir 外用製劑)：(97/12/1、98/11/1、100/7/1、102/7/1)</p> <p>1. 單純性疱疹(感染部位在頭頸部、生殖器周圍、嘴唇、口腔、陰部)3日內可使用 acyclovir 或 tromantadine 藥膏，每次給予藥量限5公克以內(100/7/1)。</p> <p>2. Penciclovir 藥膏用於治療由單純疱疹病毒引起之復發性唇疱疹，每次處方以1支(2公克)為原則。(102/7/1)</p> <p>3. 口服、注射劑及外用藥膏擇一使用，不得合併</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>使用。</p> <p>10.7.2. Ribavirin 膠囊劑 (如 Robatrol、 Rebetol) (93/2/1、 93/7/1、93/8/1、 95/11/1、98/11/1、 100/4/1)：</p> <p>1. 限用於參加「全民健康 保險加強慢性 B 型及慢 性 C 型肝炎治療試辦計 畫」之下列慢性病毒性 C 型肝炎患者且應與 interferon-alfa 2a 或 interferon-alfa 2b 或 interferon alfacon-1 或 peginterferon alfa-2b 或 peginterferon alfa-2a 合併治療： 限 ALT 值異常者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組 織切片（血友病患及類 血友病患經照會消化系 專科醫師同意後，得不 作切片），以 METAVIR system 證實輕度纖維化 大於或等於 F1 及肝炎變 化，且無肝功能代償不 全者。（98/11/1）</p> <p>2. 療程依 Viral Kinetics 區分如下：（98/11/1）</p> <p>(1) 有 RVR (rapid virological response, 快速病毒 反應) 者，給付治療不 超過 24 週。</p> <p>(2) 無 RVR，但有 EVR (early virologic response) 者，給付治</p> | <p>使用。</p> <p>10.7.2. Ribavirin 膠囊劑 (如 Robatrol、 Rebetol) (93/2/1、 93/7/1、93/8/1、 95/11/1、98/11/1、 100/4/1)：</p> <p>1. 限用於參加「全民健康 保險加強慢性 B 型及慢 性 C 型肝炎治療試辦計 畫」之下列慢性病毒性 C 型肝炎患者且應與 interferon-alfa 2a 或 interferon-alfa 2b 或 interferon alfacon-1 或 peginterferon alfa-2b 或 peginterferon alfa-2a 合併治療： 限 ALT 值異常者，且 Anti-HCV 與 HCV RNA 均為陽性，或經由肝組 織切片（血友病患及類 血友病患經照會消化系 專科醫師同意後，得不 作切片），以 METAVIR system 證實輕度纖維化 大於或等於 F1 及肝炎變 化，且無肝功能代償不 全者。（98/11/1）</p> <p>2. 療程依 Viral Kinetics 區分如下：（98/11/1）</p> <p>(1) 有 RVR (rapid virological response, 快速病毒 反應) 者，給付治療不 超過 24 週。</p> <p>(2) 無 RVR，但有 EVR (early virologic response) 者，給付治</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>療 48 週。</p> <p>(3)到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。</p> <p>(4)第一次治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，給付不超過 48 週。</p> <p>10.7.3. Lamivudine 100mg(如 Zeffix)； entecavir (如 Baraclude)； telbivudine 600mg (如 Sebivo)； tenofovir 300mg (如 Viread)： (92/10/1、93/2/1、93/8/1、94/10/1、95/10/1、95/11/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、<u>106/1/1</u>)</p> <p>限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療計畫」之下列慢性病毒性 B 型肝炎患者：</p> <p>1. HBsAg(+)且已發生肝代償不全者，以 lamivudine 100mg、entecavir 1.0mg、telbivudine 600mg、或 tenofovir 300mg 治療，<u>其給付療程如下：</u> (98/11/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1、<u>106/1/1</u>)</p> <p><u>(1)HBeAg 陽性病患治療至 e 抗原轉陰並再給付最多 12 個月治療。</u></p> | <p>療 48 週。</p> <p>(3)到第 12 週未到 EVR 者，應中止治療，治療期間不超過 16 週。</p> <p>(4)第一次治療 24 週後復發者，可以給予第二次治療，給付不超過 48 週。</p> <p>10.7.3. Lamivudine 100mg(如 Zeffix)； entecavir (如 Baraclude)； telbivudine 600mg (如 Sebivo)； tenofovir 300mg (如 Viread)： (92/10/1、93/2/1、93/8/1、94/10/1、95/10/1、95/11/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1)</p> <p>限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及慢性 C 型肝炎治療試辦計畫」之下列慢性病毒性 B 型肝炎患者：</p> <p>1. HBsAg (+) 且已發生肝代償不全者； <u>(98/11/1)</u></p> <p><u>(1)以 lamivudine 100mg、entecavir 1.0mg、或 telbivudine 600mg、或 tenofovir 300mg 治療，療程 12~36 個月；</u> (98/11/1、100/6/1、102/2/1、104/12/1)</p> | |
|---|--|--|

(2)HBeAg 陰性病患治療至少二年，治療期間需檢驗血清 HBV DNA，並於檢驗血清 HBV DNA 連續三次，每次間隔 6 個月，均檢驗不出 HBV DNA 時可停藥，每次療程至多給付 36 個月。

註：

- I. 肝代償不全條件為
prothrombin time
延長 \geq 3 秒或
bilirubin
(total) \geq
2.0mg/dL，
prothrombin time
延長係以該次檢驗
control 值為準。
 - II. Entecavir 每日限
使用 1 粒。
2. 慢性 B 型肝炎病毒帶原者 HBsAg(+)：
(98/11/1)
- (1)接受非肝臟之器官移植後，B 型肝炎發作者，可長期使用。
(98/11/1)
 - (2)接受癌症化學療法中，B 型肝炎發作者，經照會消化系專科醫師同意後，可長期使用。(93/2/1、94/10/1、98/11/1)
 - (3)接受肝臟移植者，可預防性使用。
(95/10/1、98/11/1)
 - (4)接受癌症化學療法，經照會消化系專科醫師同意後，可於化學

(2)HBeAg 陽性病患若治療療程 36 個月內有 e 抗原轉陰者，則可再給付最多 12 個月治療。(98/11/1)

註：

- I. 肝代償不全條件為
prothrombin time
延長 \geq 3 秒或
bilirubin \geq 2.0mg
/dL，prothrombin
time 延長係以該
次檢驗 control 值
為準。
 - II. Entecavir 每日限
使用 1 粒。
2. 慢性 B 型肝炎病毒帶原者 HBsAg(+)：
(98/11/1)
- (1)接受非肝臟之器官移植後，B 型肝炎發作者，可長期使用。
(98/11/1)
 - (2)接受癌症化學療法中，B 型肝炎發作者，經照會消化系專科醫師同意後，可長期使用。(93/2/1、94/10/1、98/11/1)
 - (3)接受肝臟移植者，可預防性使用。
(95/10/1、98/11/1)
 - (4)接受癌症化學療法，經照會消化系專科醫師同意後，可於化學

療法前 1 週開始給付使用，直至化學療法結束後 6 個月，以預防 B 型肝炎發作。

(98/11/1)

(5) 肝硬化病患，可長期使用。(99/7/1)

註：肝硬化條件為需同時符合下列二項條件：(99/7/1)

I. HBsAg(+) 且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL 者。

II. 診斷標準：

- a. 肝組織切片 (Metavir F4 或 Ishak F5 以上，血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)；或
- b. 超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張，或超音波診斷為肝硬化併脾腫大。若患者因其他臨床適應症接受電腦斷層或核磁共振檢查而被診斷為肝硬化時，可做為診斷依據。

(6) 在異體造血幹細胞移植時：(104/12/1)

I. 捐贈者之 HBsAg 為陽性反應，則捐贈者可自其確認為移植捐贈者後開始使

療法前 1 週開始給付使用，直至化學療法結束後 6 個月，以預防 B 型肝炎發作。

(98/11/1)

(5) 肝硬化病患，可長期使用。(99/7/1)

註：肝硬化條件為需同時符合下列二項條件：(99/7/1)

I. HBsAg(+) 且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL 者。

II. 診斷標準：

- a. 肝組織切片 (Metavir F4 或 Ishak F5 以上，血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)；或
- b. 超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張，或超音波診斷為肝硬化併脾腫大。若患者因其他臨床適應症接受電腦斷層或核磁共振檢查而被診斷為肝硬化時，可做為診斷依據。

(6) 在異體造血幹細胞移植時：(104/12/1)

I. 捐贈者之 HBsAg 為陽性反應，則捐贈者可自其確認為移植捐贈者後開始使

用預防性抗病毒藥物治療，原則上治療到血液中偵測不到 HBV DNA；若捐贈者符合 10.7.3 之 3 至 5 項治療條件，則依其規範給付。

II. 受贈者之 HBsAg 為陽性反應，或捐贈來源之 HBsAg 為陽性反應，則受贈者可在經照會消化系專科醫師同意後，於移植前一週起至移植後免疫抑制藥物停用後 6 個月內，給付使用抗 B 型肝炎病毒藥物以預防發作。

3. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(+)超過 3 個月，且 ALT 值大於(或等於)正常值上限 5 倍以上 ($ALT \geq 5X$)，符合前述條件者，其給付療程為治療至 e 抗原轉陰並再給付最多 12 個月。
(98/11/1、99/5/1、106/1/1)

4. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(+)超過 3 個月，其 ALT 值介於正常值上限 2 至 5 倍之間 ($2X \leq ALT < 5X$)，且血清 HBV DNA $\geq 20,000$ IU/mL，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意

用預防性抗病毒藥物治療，原則上治療到血液中偵測不到 HBV DNA；若捐贈者符合 10.7.3 之 3 至 5 項治療條件，則依其規範給付。

II. 受贈者之 HBsAg 為陽性反應，或捐贈來源之 HBsAg 為陽性反應，則受贈者可在經照會消化系專科醫師同意後，於移植前一週起至移植後免疫抑制藥物停用後 6 個月內，給付使用抗 B 型肝炎病毒藥物以預防發作。

3. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(+)超過 3 個月，且 ALT 值大於(或等於)正常值上限 5 倍以上 ($ALT \geq 5X$)，符合前述條件者，其給付療程為 12 至 36 個月。若治療療程 36 個月內有 e 抗原轉陰者，則可再給付最多 12 個月治療。(98/11/1、99/5/1)

4. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(+)超過 3 個月，其 ALT 值介於正常值上限 2 至 5 倍之間 ($2X \leq ALT < 5X$)，且血清 HBV DNA $\geq 20,000$ IU/mL，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科

後，得不作切片) 證實 HBcAg 陽性之患者，符合前述條件者，其給付療程為治療至 e 抗原轉陰並再給付最多 12 個月。(93/8/1、95/11/1、98/11/1、99/5/1、106/1/1)

5. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(-)超過 3 個月，且 ALT 值半年有兩次以上(每次間隔 3 個月)大於或等於正常值上限 2 倍以上(ALT \geq 2X)，且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)證實 HBcAg 陽性之患者，符合前述條件者，其療程至少二年，治療期間需檢驗血清 HBV DNA，並於檢驗血清 HBV DNA 連續三次，每次間隔 6 個月，均檢驗不出 HBV DNA 時可停藥，每次療程至多給付 36 個月。(93/8/1、95/11/1、98/11/1、106/1/1)

6. 若上述治療中出現 lamivudine 100mg、entecavir、telbivudine 抗藥性病毒株，可改換對於抗藥株有效之 B 型肝炎抗病毒藥劑治療，治療藥物

醫師同意後，得不作切片) 證實 HBcAg 陽性之患者，符合前述條件者，其給付療程為 12 至 36 個月。若治療療程 36 個月內有 e 抗原轉陰者，則可再給付最多 12 個月治療。(93/8/1、95/11/1、98/11/1、99/5/1)

5. HBsAg(+)超過 6 個月及 HBeAg(-)超過 3 個月，且 ALT 值半年有兩次以上(每次間隔 3 個月)大於或等於正常值上限 2 倍以上(ALT \geq 2X)，且血清 HBV DNA \geq 2,000 IU/mL，或經由肝組織切片(血友病患及類血友病患經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片)證實 HBcAg 陽性之患者，符合前述條件者，其療程為 12 至 36 個月。(93/8/1、95/11/1、98/11/1)

6. 若上述治療中出現 lamivudine 100mg、entecavir、telbivudine 抗藥性病毒株，可改換對於抗藥株有效之 B 型肝炎抗病毒藥劑治療，治療藥物

| | | |
|--|--|--|
| <p>及療程之規定詳如 10.7.4.之1至4項。 (98/11/1、99/5/1、 99/7/1、102/2/1、 104/12/1)</p> <p>7.符合第2至5項條件 者，若使用 entecavir，劑量為每日 0.5mg。(104/12/1)</p> <p>10.7.4.Adefovir dipivoxil (如 Hepsera Tablets 10mg)；Entecavir (如 Baraclude 1.0mg)； tenofovir 300mg (如 Viread)：(95/9/1、 95/10/1、97/8/1、 98/11/1、99/5/1、 99/7/1、102/2/1、 104/12/1、106/1/1)</p> <p>限用於參加「全民健康 保險加強慢性B型及C 型肝炎治療計畫」之下 列慢性病毒性B型肝炎 患者：</p> <p>1.經使用 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg 或 1.0mg、 telbivudine 治療或預 防B型肝炎發作出現抗 藥株(指於治療中一旦 HBV DNA 從治療期間之 最低值上升超過一個對 數值(1 log IU/mL)， 以下條件擇一給付： (98/11/1、99/5/1、 102/2/1、104/12/1)</p> <p>(1)得以原治療藥物再加 上 adefovir 進行合 併救援治療 (rescue therapy) 3年；</p> | <p>及療程之規定詳如 10.7.4.之1至4項。 (98/11/1、99/5/1、 99/7/1、102/2/1、 104/12/1)</p> <p>7.符合第2至5項條件 者，若使用 entecavir，劑量為每日 0.5mg。(104/12/1)</p> <p>10.7.4.Adefovir dipivoxil (如 Hepsera Tablets 10mg)；Entecavir (如 Baraclude 1.0mg)； tenofovir 300mg (如 Viread)：(95/9/1、 95/10/1、97/8/1、 98/11/1、99/5/1、 99/7/1、102/2/1、 104/12/1)</p> <p>限用於參加「全民健康 保險加強慢性B型及C 型肝炎治療試辦計畫」 之下列慢性病毒性B型 肝炎患者：</p> <p>1.經使用 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg 或 1.0mg、 telbivudine 治療或預 防B型肝炎發作出現抗 藥株(指於治療中一旦 HBV DNA 從治療期間之 最低值上升超過一個對 數值(1 log IU/mL)， 以下條件擇一給付： (98/11/1、99/5/1、 102/2/1、104/12/1)</p> <p>(1)得以原治療藥物再加 上 adefovir 進行合 併救援治療 (rescue therapy) 3年；</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(95/9/1、95/10/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(2)改用 entecavir 1.0mg(僅限於 lamivudine 產生抗藥性之病人)單一藥物治療 3 年；(98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(3)以 Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 或 interferon alpha-2b (如 Intron A) 或 peginterferon alpha-2a (如 Pegasys) 治療 1 年。(98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(4)改用 tenofovir 300mg 單一藥物治療 3 年。(104/12/1)</p> <p>(5)原已接受其他口服抗病毒藥物救援治療，治療期間出現抗藥株，或治療未達預期之病毒學反應，得改以 tenofovir 單一藥物救援治療，並給付其原救援治療剩餘之期間。(104/12/1)</p> <p>2. 若停藥後復發，得以合併療法或 tenofovir 單一藥物再治療，或以干擾素再治療 1 年。<u>以口服抗病毒藥物治療之給付療程依 HBeAg(+)或 HBeAg(-)而定：</u> <u>HBeAg(+)病患治療至 e 抗原轉陰並再給付最多 12 個月；HBeAg(-)病患</u></p> | <p>(95/9/1、95/10/1、97/8/1、98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(2)改用 entecavir 1.0mg(僅限於 lamivudine 產生抗藥性之病人)單一藥物治療 3 年；(98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(3)以 Interferon alpha-2a (如 Roferon-A) 或 interferon alpha-2b (如 Intron A) 或 peginterferon alpha-2a (如 Pegasys) 治療 1 年。(98/11/1、99/5/1、99/7/1)</p> <p>(4)改用 tenofovir 300mg 單一藥物治療 3 年。(104/12/1)</p> <p>(5)原已接受其他口服抗病毒藥物救援治療，治療期間出現抗藥株，或治療未達預期之病毒學反應，得改以 tenofovir 單一藥物救援治療，並給付其原救援治療剩餘之期間。(104/12/1)</p> <p>2. 若停藥後復發，得以合併療法或 tenofovir 單一藥物再治療<u>一次，療程為 3 年；或以干擾素再治療 1 年。</u>(99/7/1、104/12/1)</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>治療至少二年，治療期間需檢驗血清 HBV DNA，並於檢驗血清 HBV DNA 連續三次，每次間隔 6 個月，均檢驗不出 HBV DNA 時可停藥，每次療程至多給付 36 個月。前述再次復發時得再接受治療，不限治療次數。(99/7/1、104/12/1、106/1/1)</u></p> <p>3. 慢性 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) 帶原者：</p> <p>(1) 肝硬化之病患。 (99/7/1)</p> <p>(2) 接受非肝臟之器官移植後發作或接受肝臟移植，須持續接受免疫抑制劑時。 (95/10/1、97/8/1、99/5/1) 上述病患長期使用 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg、telbivudine，以治療或預防 B 型肝炎發作，若出現抗藥性病毒株者，治療藥物及療程之規定詳如 10.7.4. 之 1 項。 (95/10/1、97/8/1、99/5/1、99/7/1、102/2/1)</p> <p>4. 臨床上若產生多重抗藥病毒株時可給予 tenofovir 300mg 單一藥物治療，或合併 entecavir 1.0mg 及 tenofovir 300mg 治療 3 年。(104/12/1)</p> | <p>3. 慢性 B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) 帶原者：</p> <p>(1) 肝硬化之病患。 (99/7/1)</p> <p>(2) 接受非肝臟之器官移植後發作或接受肝臟移植，須持續接受免疫抑制劑時。 (95/10/1、97/8/1、99/5/1) 上述病患長期使用 lamivudine 100mg、entecavir 0.5mg、telbivudine，以治療或預防 B 型肝炎發作，若出現抗藥性病毒株者，治療藥物及療程之規定詳如 10.7.4. 之 1 項。 (95/10/1、97/8/1、99/5/1、99/7/1、102/2/1)</p> <p>4. 臨床上若產生多重抗藥病毒株時可給予 tenofovir 300mg 單一藥物治療，或合併 entecavir 1.0mg 及 tenofovir 300mg 治療 3 年。(104/12/1)</p> | |
|--|--|--|

註：多重抗藥病毒株指病毒對 lamivudine、telbivudine、entecavir 或 adefovir 產生二種(含)藥物以上之抗藥性。(104/12/1)

10.7.5. Daclatasvir (如 Daklinza) 及 asunaprevir (如 Sunvepra) (106/1/24) :

1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療計畫」之成人慢性病毒性C型肝炎患者。

2. Daclatasvir 與 asunaprevir 合併使用於 Anti-HCV 陽性超過六個月、HCV RNA 為陽性之病毒基因型第 1b 型成人病患，且需同時符合下列條件：

(1) 先前曾以 interferon 及 ribavirin 合併治療失敗且無肝功能代償不全者。

(2) 經由肝組織切片或肝臟纖維化掃描或 Fibrosis-4 (FIB-4) 證實，等同 METAVIR system 纖維化大於或等於 F3；或超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張，或超音波診斷為肝硬化併脾腫大。

註 1：先前曾以 interferon 及

註：多重抗藥病毒株指病毒對 lamivudine、telbivudine、entecavir 或 adefovir 產生二種(含)藥物以上之抗藥性。(104/12/1)

ribavirin 合併治療失敗之定義為：
以 interferon 及 ribavirin 合併治療 12 週未到 EVR 而停藥者；或治療完成時仍測的到病毒者；或治療完成時，血中偵測不到病毒，停藥後 24 週，血中又再次偵測到病毒者。

註 2：以肝臟纖維化掃描或 Fibrosis-4 (FIB-4) 證實等同 METAVIR system 纖維化大於或等於 F3 之定義為：

I. 肝臟纖維化掃描

transient elastography (Fibroscan) \geq 9.5Kpa 或 Acoustic Radiation Force Impulse elastography (ARFI) \geq 1.81。

II. Fibrosis-4

(FIB-4) \geq 3.25，計算公式為 [Age(years) \times AST(U/L)] / [Platelet count(10^9 /L) \times \sqrt ALT(U/L)]。

3. 使用前應檢測血液病毒非結構性蛋白 5A 處 (NS5A) 不具抗藥性病毒株者方可使用。

4. 每人給付療程 24 週，醫師每次開藥以 4 週為限。服藥後需定期監測病毒量，使用 4 週後病毒量未能下降超過二個對數值(即下降未達 100 倍)者，應停止治療，給付不超過 6 週。

5. 限未曾申請給付其他同類全口服直接抗病毒藥物(direct-acting anti-viral, DAAs)，且不得併用其他 DAAs。

10.7.6.

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (如 Viekirax) 及 dasabuvir (如 Exviera)
(106/1/24) :

1. 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療計畫」之成人慢性病毒性 C 型肝炎患者。

2. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 與 dasabuvir 合併使用於 Anti-HCV 陽性超過六個月、HCV RNA 為陽性之病毒基因型第 1 型成人病患，且需同時符合下列條件：

(1) 先前曾以 interferon 及 ribavirin 合併治療失敗且無肝功能代償不全者。

(2) 經由肝組織切片或肝臟纖維化掃描或 FIB-4 證實，等同 METAVIR system 纖維

化大於或等於 F3；或
超音波診斷為肝硬化
併食道或胃靜脈曲
張，或超音波診斷為
肝硬化併脾腫大。

註 1：先前曾以

interferon 及
ribavirin 合併治
療失敗之定義為：
以 interferon 及
ribavirin 合併治
療 12 週未到 EVR 而
停藥者；或治療完
成時仍測的到病毒
者；或治療完成
時，血中偵測不到
病毒，停藥後 24
週，血中又再次偵
測到病毒者。

註 2：以肝臟纖維化掃描

或 Fibrosis-4
(FIB-4)證實等同
METAVIR system 纖
維化大於或等於 F3
之定義為：

I. 肝臟纖維化掃描

transient
elastography
(Fibroscan) \geq
9.5Kpa 或
Acoustic
Radiation
Force Impulse
elastography
(ARFI) \geq 1.81。

II. Fibrosis-4

(FIB-4) \geq
3.25，計算公式
為 [Age(years)
 \times AST(U/L)] /

$$\frac{[\text{Platelet count}(10^9/\text{L}) \times \sqrt{\text{ALT}(\text{U/L})}]。$$

3. 給付療程如下，醫師每次開藥以4週為限。服藥後需定期監測病毒量，使用4週後病毒量未能下降超過二個對數值(即下降未達100倍)者，應停止治療，給付不超過6週。

(1) 基因型1a型且無肝硬化者，需合併ribavirin治療，給付12週。

(2) 基因型1a型且具代償性肝硬化(Child-Pugh score A)者，需合併ribavirin治療，給付24週。

(3) 基因型1b型且無肝硬化者或具代償性肝硬化(Child-Pugh score A)者，給付12週。

4. 限未曾申請給付其他同類全口服直接抗病毒藥物(direct-acting anti-viral, DAAs)，且不得併用其他DAAs。

10.8. 其他 Miscellaneous

10.8.1. Teicoplanin 及 vancomycin：(88/3/1)

1. 對其他抗生素有抗藥性之革蘭氏陽性菌感染。
2. 病患對其他抗生素有嚴重過敏反應之革蘭氏陽性菌感染。
3. 治療抗生素引起之腸炎 (antibiotics-

10.8. 其他 Miscellaneous

10.8.1. Teicoplanin 及 vancomycin：(88/3/1)

1. 對其他抗生素有抗藥性之革蘭氏陽性菌感染。
2. 病患對其他抗生素有嚴重過敏反應之革蘭氏陽性菌感染。
3. 治療抗生素引起之腸炎 (antibiotics-

| | | |
|--|--|--|
| <p>associated colitis) , 經使用 metronidazole 無效者始可使用口服 vancomycin 。</p> <p>4. vancomycin 10 gm(溶液用粉劑)限骨髓移植病例使用。</p> <p>5. 其他經感染症專科醫師認定需使用者。</p> <p>10.8.2. Fluoroquinolone 類：(96/9/1、97/9/1) 限使用於下列疾病，若使用於結核病不予給付。(96/9/1)</p> <p>10.8.2.1. Moxifloxacin (如 Avelox)：(91/2/1、92/11/1、94/3/1、97/9/1、105/8/1) 限用於成人(18歲以上)之<u>下列感染症</u>：</p> <p>1. 慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性腹腔內感染。</p> <p>2. <u>急性鼻竇炎或複雜性皮膚和軟組織感染，因抗藥性細菌感染及病情需要，經感染科醫師會診確認需要使用者。</u></p> <p>10.8.2.2. Gemifloxacin (如 Factive)：(96/6/1、97/9/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎。</p> <p>10.8.2.3. Levofloxacin (如 Cravit) (97/9/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性泌尿道感染。</p> | <p>associated colitis) , 經使用 metronidazole 無效者始可使用口服 vancomycin 。</p> <p>4. vancomycin 10 gm(溶液用粉劑)限骨髓移植病例使用。</p> <p>5. 其他經感染症專科醫師認定需使用者。</p> <p>10.8.2. Fluoroquinolone 類：(96/9/1、97/9/1) 限使用於下列疾病，若使用於結核病不予給付。(96/9/1)</p> <p>10.8.2.1. Moxifloxacin (如 Avelox)：(91/2/1、92/11/1、94/3/1、97/9/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性腹腔內感染。</p> <p>10.8.2.2. Gemifloxacin (如 Factive)：(96/6/1、97/9/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎。</p> <p>10.8.2.3. Levofloxacin (如 Cravit) (97/9/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性泌尿道感染。</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>10.8.3.Linezolid (如 Zyvox Injection 及 Tablets) : (91/4/1、100/7/1、<u>105/2/1</u>)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1) 證實 MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 感染，且證明為 vancomycin 抗藥菌株或使用 vancomycin、teicoplanin 治療失敗者或對 vancomycin、teicoplanin 治療無法耐受者。</p> <p><u>(2) 確定或高度懷疑為 MRSA 肺炎 (痰液培養出 MRSA，伴隨全身發炎反應，且 CXR 出現新的浸潤或痰液性狀改變或氧氣需求增加)，並符合下列危險因子之一：</u></p> <p><u>(105/2/1)</u></p> <p><u>I. 65 歲以上。</u></p> <p><u>II. BMI ≥ 30。</u></p> <p><u>III. 急性腎衰竭、腎功能不穩定時。</u></p> <p>(3) 證實為 VRE (vancomycin-resistant enterococci) 感染，且無其他藥物可供選擇者。</p> <p>(4) 其他抗藥性革蘭氏陽性球菌感染，因病情需要，經感染症專科</p> | <p>10.8.3.Linezolid (如 Zyvox Injection 及 Tablets) : (91/4/1、100/7/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用：</p> <p>(1) 證實 MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 感染，且證明為 vancomycin 抗藥菌株或使用 vancomycin、teicoplanin 治療失敗者或對 vancomycin、teicoplanin 治療無法耐受者。</p> <p>(2) 證實為 VRE (vancomycin-resistant enterococci) 感染，且無其他藥物可供選擇者。</p> <p>(3) 其他抗藥性革蘭氏陽性球菌感染，因病情需要，經感染症專科</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>醫師會診確認需要使用者。</p> <p>2. 骨髓炎(osteomyelitis)及心內膜炎(endocarditis)病患不建議使用。</p> <p>3. 申報費用時需檢附會診紀錄或相關之病歷資料。</p> <p>10.8.4. Telithromycin (如 Ketek) : (93/10/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化或輕度至中度社區性肺炎。</p> <p>10.8.5. Tigecycline (如 Tygacil) : (95/12/1、100/7/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用： (1)經細菌培養證實有意義之致病菌且對其他抗微生物製劑均具抗藥性或對其他具有感受性抗微生物製劑過敏，而對 tigecycline 具有感受性(sensitivity)之複雜性皮膚及皮膚結構感染或複雜性腹腔內感染症使用。 (2)其他經感染症專科醫師會診，認定需使用之下列感染症：複雜性皮膚及皮膚結構感染、複雜性腹腔內感染、社區感染性肺炎。(100/7/1)</p> <p>2. 申報費用時需檢附會診紀錄或相關之病歷資料。</p> | <p>醫師會診確認需要使用者。</p> <p>2. 骨髓炎(osteomyelitis)及心內膜炎(endocarditis)病患不建議使用。</p> <p>3. 申報費用時需檢附會診紀錄或相關之病歷資料。</p> <p>10.8.4. Telithromycin (如 Ketek) : (93/10/1) 限用於成人(18歲以上)之慢性支氣管炎的急性惡化或輕度至中度社區性肺炎。</p> <p>10.8.5. Tigecycline (如 Tygacil) : (95/12/1、100/7/1)</p> <p>1. 限下列條件之一使用： (1)經細菌培養證實有意義之致病菌且對其他抗微生物製劑均具抗藥性或對其他具有感受性抗微生物製劑過敏，而對 tigecycline 具有感受性(sensitivity)之複雜性皮膚及皮膚結構感染或複雜性腹腔內感染症使用。 (2)其他經感染症專科醫師會診，認定需使用之下列感染症：複雜性皮膚及皮膚結構感染、複雜性腹腔內感染、社區感染性肺炎。(100/7/1)</p> <p>2. 申報費用時需檢附會診紀錄或相關之病歷資料。</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>10.8.6 Colistin 可用於靜脈注射劑(97/9/1、98/9/1、99/2/1)</p> <p>限經感染症專科醫師會診，確定使用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染。</p> <p>10.8.7. Daptomycin 注射劑：(98/1/1)</p> <p>1. 證實為 MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 複雜皮膚和皮膚組織感染，且證明為 vancomycin 抗藥菌株或使用 vancomycin、teicoplanin 治療失敗者或對 vancomycin、teicoplanin 治療無法耐受者。</p> <p>2. 其他抗藥性革蘭氏陽性菌引起的複雜皮膚和皮膚組織感染或 MRSA 菌血症(含右側感染性心內膜炎)，因病情需要經感染症專科醫師會診確認需要使用者(申報費用時需檢附會診及相關之病歷資料)。</p> <p>10.8.8. Fidaxomicin(如 Dificid)：(103/9/1)</p> <p>1. 限用於經第一線藥物 metronidazole 及 vancomycin 治療無效或復發，且細菌培養或毒素分析(toxin assay)報告證實為困難梭狀桿菌相關腹瀉(C.</p> | <p>10.8.6 Colistin 可用於靜脈注射劑(97/9/1、98/9/1、99/2/1)</p> <p>限經感染症專科醫師會診，確定使用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染。</p> <p>10.8.7. Daptomycin 注射劑：(98/1/1)</p> <p>1. 證實為 MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) 複雜皮膚和皮膚組織感染，且證明為 vancomycin 抗藥菌株或使用 vancomycin、teicoplanin 治療失敗者或對 vancomycin、teicoplanin 治療無法耐受者。</p> <p>2. 其他抗藥性革蘭氏陽性菌引起的複雜皮膚和皮膚組織感染或 MRSA 菌血症(含右側感染性心內膜炎)，因病情需要經感染症專科醫師會診確認需要使用者(申報費用時需檢附會診及相關之病歷資料)。</p> <p>10.8.8. Fidaxomicin(如 Dificid)：(103/9/1)</p> <p>1. 限用於經第一線藥物 metronidazole 及 vancomycin 治療無效或復發，且細菌培養或毒素分析(toxin assay)報告證實為困難梭狀桿菌相關腹瀉(C.</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>difficile-associated diarrhoea, CDAD)，並經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者。</p> <p>2. 申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。</p> <p>第 13 節 皮膚科製劑</p> <p>Dermatological preparations</p> <p>13.1. (刪除)(104/6/1)</p> <p>13.2. Cadexomer iodine (如 Iodosorb powder) : (87/4/1)</p> <p>限慢性腿部潰瘍病例及慢性感染性潰瘍傷口使用，每日用量超過一包時，需檢附傷口照片以利審查。</p> <p>13.3. Calcipotriol 外用製劑：(87/4/1、89/2/1、94/3/1、94/5/1、99/12/1)</p> <p>13.3.1. Calcipotriol 外用單方製劑 (87/4/1、89/2/1、94/3/1、99/12/1)</p> <p>限確經診斷為尋常性牛皮癬 (psoriasis) 之病例使用，使用量以每星期不高於 30gm 或 30mL 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 或 30mL 者，應於病歷詳細紀錄理由。</p> <p>13.3.2. 含 calcipotriol 及類固醇之外用複方製劑 (如 Daivobet) (94/5/1、99/12/1)</p> <p>1. 限確經診斷為尋常性牛</p> | <p>difficile-associated diarrhoea, CDAD)，並經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者。</p> <p>2. 申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。</p> <p>第 13 節 皮膚科製劑</p> <p>Dermatological preparations</p> <p>13.1. (刪除)(104/6/1)</p> <p>13.2. Cadexomer iodine (如 Iodosorb powder) : (87/4/1)</p> <p>限慢性腿部潰瘍病例及慢性感染性潰瘍傷口使用，每日用量超過一包時，需檢附傷口照片以利審查。</p> <p>13.3. Calcipotriol 外用製劑：(87/4/1、89/2/1、94/3/1、94/5/1、99/12/1)</p> <p>13.3.1. Calcipotriol 外用單方製劑 (87/4/1、89/2/1、94/3/1、99/12/1)</p> <p>限確經診斷為尋常性牛皮癬 (psoriasis) 之病例使用，使用量以每星期不高於 30gm 或 30mL 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 或 30mL 者，應於病歷詳細紀錄理由。</p> <p>13.3.2. 含 calcipotriol 及類固醇之外用複方製劑 (如 Daivobet) (94/5/1、99/12/1)</p> <p>1. 限確經診斷為尋常性牛</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>皮癬 (psoriasis) 之病例使用，使用量以每星期不高於 30gm 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細紀錄理由。</p> <p>2. 同一部位之療程不得超過 4 週。</p> <p>13.3.3 與 tazarotene 併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細紀錄理由。 (99/12/1)</p> <p>13.4. Isotretinoin 口服製劑 (如 Roaccutane)： (86/9/1、87/4/1、94/3/1)</p> <p>1. 限皮膚科專科醫師使用。</p> <p>2. 需檢附病人之服藥同意書 (詳附表十)，以及經傳統治療無效之病歷資料或治療前之照片，經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次申請以一療程為限，若需再次療程，請檢附原來照片與最近照片再次申請事前審查核准後使用 (每一療程最高總劑量為 100 mg - 120 mg/kg，於四至六個月完成)。</p> <p>13.5. Acitretin (如 Neotigason)： (87/11/1)</p> <p>申報費用時需檢具病患同意書 (附表十一)，並</p> | <p>皮癬 (psoriasis) 之病例使用，使用量以每星期不高於 30gm 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細紀錄理由。</p> <p>2. 同一部位之療程不得超過 4 週。</p> <p>13.3.3 與 tazarotene 併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細紀錄理由。 (99/12/1)</p> <p>13.4. Isotretinoin 口服製劑 (如 Roaccutane)： (86/9/1、87/4/1、94/3/1)</p> <p>1. 限皮膚科專科醫師使用。</p> <p>2. 需檢附病人之服藥同意書 (詳附表十)，以及經傳統治療無效之病歷資料或治療前之照片，經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次申請以一療程為限，若需再次療程，請檢附原來照片與最近照片再次申請事前審查核准後使用 (每一療程最高總劑量為 100 mg - 120 mg/kg，於四至六個月完成)。</p> <p>13.5. Acitretin (如 Neotigason)： (87/11/1)</p> <p>申報費用時需檢具病患同意書 (附表十一)，並</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>檢送含確定診斷之詳細病歷資料，俾利審查。</p> <p>13.6. Methoxsalen 製劑： (87/11/1)</p> <p>限皮膚科專科醫師使用於 PUVA 治療（配合紫外線照射），申報費用時需檢送含確定診斷之詳細病歷資料，俾利審查。</p> <p>13.7. Doxepin HCl cream (如 Ichderm)：(88/6/1)</p> <p>限成人使用，每次處方不超過七天。</p> <p>13.8. Tazarotene 外用製劑： (91/4/1、99/12/1、101/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限乾癬之病例使用。 2. 使用量以每星期不高於 30gm 為原則。若因病情需要，使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記載理由。 (99/12/1) 3. 與 calcitriol（或 calcipotriol）併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記載理由。(99/12/1) <p>13.9. Calcitriol（如 Silkis ointment）：(92/11/1、93/9/1、99/12/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於小於 35%體表面積之輕度至中重度乾癬之病例，使用量以每星期不高於 30gm 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 者，應 | <p>檢送含確定診斷之詳細病歷資料，俾利審查。</p> <p>13.6. Methoxsalen 製劑： (87/11/1)</p> <p>限皮膚科專科醫師使用於 PUVA 治療（配合紫外線照射），申報費用時需檢送含確定診斷之詳細病歷資料，俾利審查。</p> <p>13.7. Doxepin HCl cream (如 Ichderm)：(88/6/1)</p> <p>限成人使用，每次處方不超過七天。</p> <p>13.8. Tazarotene 外用製劑： (91/4/1、99/12/1、101/2/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限乾癬之病例使用。 2. 使用量以每星期不高於 30gm 為原則。若因病情需要，使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記載理由。 (99/12/1) 3. 與 calcitriol（或 calcipotriol）併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記載理由。(99/12/1) <p>13.9. Calcitriol（如 Silkis ointment）：(92/11/1、93/9/1、99/12/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於小於 35%體表面積之輕度至中重度乾癬之病例，使用量以每星期不高於 30gm 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30gm 者，應 | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>於病歷詳細記錄理由。 其面積計算:依照 rule of nines 計算法。(同 13.10 備註 1)</p> <p>2. 與 tazarotene 併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記錄理由。 (99/12/1)</p> <p>13.10. Tacrolimus (如 Protopic Ointment) : (91/12/1、93/8/1、95/7/1、99/12/1)</p> <p>限二歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用： (95/7/1)</p> <p>1. 成人患部面積 30%~50%，每星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 60gm。 (99/12/1)</p> <p>2. 孩童患部面積 30%~50%，每兩星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 30gm。(99/12/1)</p> <p>3. 面積計算：成人依照 rule of nines(詳備註 1)，由部位乘予大約比例之總和，兒童依比例</p> | <p>於病歷詳細記錄理由。 其面積計算:依照 rule of nines 計算法。(同 13.10 備註 1)</p> <p>2. 與 tazarotene 併用，兩者合計總量每星期不超過 30gm 或 30mL，若因病情需要兩者合併使用量需超過每星期 30gm 者，應於病歷詳細記錄理由。 (99/12/1)</p> <p>13.10. Tacrolimus (如 Protopic Ointment) : (91/12/1、93/8/1、95/7/1、99/12/1)</p> <p>限二歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用： (95/7/1)</p> <p>1. 成人患部面積 30%~50%，每星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 60gm。 (99/12/1)</p> <p>2. 孩童患部面積 30%~50%，每兩星期不超過 30gm；患部面積>50%，每星期不超過 30gm。(99/12/1)</p> <p>3. 面積計算：成人依照 rule of nines(詳備註 1)，由部位乘予大約比例之總和，兒童依比例</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(備註 2, Barkin 公式) 修訂。</p> <p>4. 使用一個月後，症狀若無改善，應改用其他藥物治療。</p> <p>5. 以三個月為一個療程，作間歇性長期治療者，若需繼續治療，每月限使用 30 公克。(93/8 /1)</p> <p>6. 不可合併紫外線治療。(93/8 /1)</p> <p>7. 與 pimecrolimus 併用時 (99/12/1)：</p> <p>(1)成人：患部面積 30%~50%，每星期兩者合併用量不超過 30gm；患部面積 >50%，兩者每星期合併用量不超過 60gm。</p> <p>(2)孩童：患部面積 30%~50%，每兩星期兩者合併用量不超過 30gm；患部面積 >50%，每星期兩者合併用量不超過 30gm。</p> <p>(3)若因病情需要兩者合併使用量需超過限制者，應於病歷詳細記錄理由。</p> <p>備註 1：Rule of nines 計算法：頭頸 9%，兩上肢 18%，軀幹 18%，背 18%，兩下肢 36%，陰部 1%。</p> <p>備註 2：兒童患部面積計算如附表十七 (From Roger M. Barkin)</p> <p>13. 11. Pimecrolimus</p> | <p>(備註 2, Barkin 公式) 修訂。</p> <p>4. 使用一個月後，症狀若無改善，應改用其他藥物治療。</p> <p>5. 以三個月為一個療程，作間歇性長期治療者，若需繼續治療，每月限使用 30 公克。(93/8 /1)</p> <p>6. 不可合併紫外線治療。(93/8 /1)</p> <p>7. 與 pimecrolimus 併用時 (99/12/1)：</p> <p>(1)成人：患部面積 30%~50%，每星期兩者合併用量不超過 30gm；患部面積 >50%，兩者每星期合併用量不超過 60gm。</p> <p>(2)孩童：患部面積 30%~50%，每兩星期兩者合併用量不超過 30gm；患部面積 >50%，每星期兩者合併用量不超過 30gm。</p> <p>(3)若因病情需要兩者合併使用量需超過限制者，應於病歷詳細記錄理由。</p> <p>備註 1：Rule of nines 計算法：頭頸 9%，兩上肢 18%，軀幹 18%，背 18%，兩下肢 36%，陰部 1%。</p> <p>備註 2：兒童患部面積計算如附表十七 (From Roger M. Barkin)</p> <p>13. 11. Pimecrolimus</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>(Elidel 1%)： (92/11/1、93/8/1、 94/3/1、95/7/1、 99/12/1)</p> <p>限二歲以上孩童、青少年及成人且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：(94/3/1、95/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成人患部面積 30%~50%，每星期不超過30gm；患部面積>50%，每星期不超過60gm。 (94/3/1、99/12/1) 2. 孩童患部面積 30%~50%，每兩星期不超過30gm；患部面積>50%，每星期不超過30gm。(99/12/1) 3. 面積計算：成人依照rule of nines(詳13.10之備註1)，由部位乘予大約比例之總和，兒童依比例(詳13.10之備註2，Barkin公式)修訂。(94/3/1) 4. 使用一個月後，症狀若無改善，應改用其他藥物治療。 5. 以三個月為一個療程，作間歇性長期治療者，若需繼續治療，每月限使用30公克。 (93/8/1) 6. 不可合併紫外線治療。 (93/8/1) 7. 與 tacrolimus 併用時 (99/12/1)： (1)成人：患部面積 | <p>(Elidel 1%)： (92/11/1、93/8/1、 94/3/1、95/7/1、 99/12/1)</p> <p>限二歲以上孩童、青少年及成人且患部面積>30%之中、重度異位性皮膚炎之下列病患第二線使用：(94/3/1、95/7/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成人患部面積 30%~50%，每星期不超過30gm；患部面積>50%，每星期不超過60gm。 (94/3/1、99/12/1) 2. 孩童患部面積 30%~50%，每兩星期不超過30gm；患部面積>50%，每星期不超過30gm。(99/12/1) 3. 面積計算：成人依照rule of nines(詳13.10之備註1)，由部位乘予大約比例之總和，兒童依比例(詳13.10之備註2，Barkin公式)修訂。(94/3/1) 4. 使用一個月後，症狀若無改善，應改用其他藥物治療。 5. 以三個月為一個療程，作間歇性長期治療者，若需繼續治療，每月限使用30公克。 (93/8/1) 6. 不可合併紫外線治療。 (93/8/1) 7. 與 tacrolimus 併用時 (99/12/1)： (1)成人：患部面積 | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>30%~50%，每星期兩者合併用量不超過30gm；患部面積>50%，兩者每星期合併用量不超過60gm。</p> <p>(2) 孩童：患部面積30%~50%，每兩星期兩者合併用量不超過30gm；患部面積>50%，每星期兩者合併用量不超過30gm。</p> <p>(3) 若因病情需要兩者合併使用量需超過限制者，應於病歷詳細記錄理由。</p> <p>13.12. Amorolfine (如Amocoat)：(99/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於皮真菌、酵母菌及黴菌引起之甲癬。 2. 每年限使用一瓶5mL。 3. 許可證類別若變更為指示用藥，將不予給付。 <p>13.13. Podophyllotoxin (如Wart Del Cream)：(102/9/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限皮膚、泌尿、婦產專科醫師或經病理診斷確認，使用於生殖器疣(包括外生殖器及肛門附近)之治療。 2. 每次限給付乙支(5gm)，一個月內不得重複處方，每次療程間應相隔至少3個月，治療期間不得與其它冷凍、電燒、雷射治療合併申報。 3. 若病灶侵犯生殖器部位超過50%，每療程處方之總劑量以10gm為上 | <p>30%~50%，每星期兩者合併用量不超過30gm；患部面積>50%，兩者每星期合併用量不超過60gm。</p> <p>(2) 孩童：患部面積30%~50%，每兩星期兩者合併用量不超過30gm；患部面積>50%，每星期兩者合併用量不超過30gm。</p> <p>(3) 若因病情需要兩者合併使用量需超過限制者，應於病歷詳細記錄理由。</p> <p>13.12. Amorolfine (如Amocoat)：(99/4/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於皮真菌、酵母菌及黴菌引起之甲癬。 2. 每年限使用一瓶5mL。 3. 許可證類別若變更為指示用藥，將不予給付。 <p>13.13. Podophyllotoxin (如Wart Del Cream)：(102/9/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限皮膚、泌尿、婦產專科醫師或經病理診斷確認，使用於生殖器疣(包括外生殖器及肛門附近)之治療。 2. 每次限給付乙支(5gm)，一個月內不得重複處方，每次療程間應相隔至少3個月，治療期間不得與其它冷凍、電燒、雷射治療合併申報。 3. 若病灶侵犯生殖器部位超過50%，每療程處方之總劑量以10gm為上 | |
|---|---|--|

限，並且需於病歷上詳載，併得合併申報冷凍、電燒或雷射治療。

13.14. Ingenol (如

Picato) : (105/11/1)

限用於治療局部性、非過度角化 (non-hyperkeratotic)、非肥厚型 (non-hypertrophic) 光化性角化症

1. 限用於局部性治療 25cm² 的連續治療面積內，4 個(含)以上病灶數量。

2. 須經皮膚科醫師診斷為光化性角化症，並附照片備查。

3. 療程:

(1) 150 微克/克(0.015%)

用於臉部或頭皮，每天一次、連續塗抹 3 天，每部位每一次療程限處方 3 支； 500 微克/克(0.05%) 用於身軀或四肢，每天一次，連續塗抹 2 天，每部位每一次療程限處方 2 支。

(2) 若未達完全清除、或病灶復發或出現新病灶，須進行第二次療程，須距第一次療程八週以上，一年內以兩療程為限。

(3) 於局部治療範圍處，八週內不得同時併用其他光化性角化症治療，如冷凍治療、雷射、電燒等。

限，並且需於病歷上詳載，併得合併申報冷凍、電燒或雷射治療。

| | | |
|---|---|--|
| <p>preparations</p> <p>14. 1. 高眼壓及青光眼眼用製劑(101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 1. 1. 單方製劑(90/10/1、101/12/1、104/4/1):</p> <p>1. β-交感神經阻斷劑(β-blockers)</p> <p>2. 碳酸酐酶抑制劑 (Carbonic anhydrase inhibitor) : 限對 β-blockers 有禁忌、不適或使用效果不佳之病患使用。</p> <p>3. 前列腺素衍生物類： (Prostaglandin analogues) : (93/2/1、101/12/1)</p> <p>(1)限對 β-blockers 使用效果不佳或不適用之病患使用。宜先以單獨使用為原則。</p> <p>(2)療效仍不足時，得併用其他降眼壓用藥(含複方製劑)。</p> <p>4. 單眼每四週處方為一瓶，雙眼得每二週或三週處方一瓶。 (101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 1. 2. 複方製劑： (92/2/1、101/12/1、104/4/1)</p> <p>1. 限經單一降眼壓藥物治療後，眼壓仍控制不良之患者第二線(含)以上用藥。(91/12/1、97/8/1、97/9/1、101/12/1)</p> | <p>preparations</p> <p>14. 1. 高眼壓及青光眼眼用製劑(101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 1. 1. 單方製劑(90/10/1、101/12/1、104/4/1):</p> <p>1. β-交感神經阻斷劑(β-blockers)</p> <p>2. 碳酸酐酶抑制劑 (Carbonic anhydrase inhibitor) : 限對 β-blockers 有禁忌、不適或使用效果不佳之病患使用。</p> <p>3. 前列腺素衍生物類： (Prostaglandin analogues) : (93/2/1、101/12/1)</p> <p>(1)限對 β-blockers 使用效果不佳或不適用之病患使用。宜先以單獨使用為原則。</p> <p>(2)療效仍不足時，得併用其他降眼壓用藥(含複方製劑)。</p> <p>4. 單眼每四週處方為一瓶，雙眼得每二週或三週處方一瓶。 (101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 1. 2. 複方製劑： (92/2/1、101/12/1、104/4/1)</p> <p>1. 限經單一降眼壓藥物治療後，眼壓仍控制不良之患者第二線(含)以上用藥。(91/12/1、97/8/1、97/9/1、101/12/1)</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>2. 單眼每四週處方為一瓶，雙眼得每二週或三週處方一瓶。 (101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 2. Acyclovir 眼用製劑：限下列病例使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 V1 皮節，可能危及眼角膜者。 2. 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。 3. 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。 4. 本品不宜與口服、外用或注射製劑合併使用。 <p>14. 3. Maxitrol oph oint ; pimafulcin oint : 門診處方限一支。</p> <p>14. 4. Quinolone 類眼用製劑：(87/4/1、90/12/1、93/2/1、94/7/1)</p> <p>14. 4. 1. Ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin 眼用製劑：(87/4/1、93/2/1、94/7/1、96/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於角膜潰瘍或嚴重角膜炎病例。 2. 其餘眼科疾患，則列為第二線用藥，申報費用時需檢附細菌敏感試驗報告。 <p>14. 4. 2. Lomefloxacin</p> | <p>2. 單眼每四週處方為一瓶，雙眼得每二週或三週處方一瓶。 (101/12/1、102/8/1、104/4/1)</p> <p>14. 2. Acyclovir 眼用製劑：限下列病例使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帶狀疱疹或單純性疱疹侵犯三叉神經第一分枝 V1 皮節，可能危及眼角膜者。 2. 帶狀疱疹或單純性疱疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。 3. 急性視網膜壞死症 (acute retina necrosis)。 4. 本品不宜與口服、外用或注射製劑合併使用。 <p>14. 3. Maxitrol oph oint ; pimafulcin oint : 門診處方限一支。</p> <p>14. 4. Quinolone 類眼用製劑：(87/4/1、90/12/1、93/2/1、94/7/1)</p> <p>14. 4. 1. Ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin 眼用製劑：(87/4/1、93/2/1、94/7/1、96/5/1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限用於角膜潰瘍或嚴重角膜炎病例。 2. 其餘眼科疾患，則列為第二線用藥，申報費用時需檢附細菌敏感試驗報告。 <p>14. 4. 2. Lomefloxacin</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>(Okacin)：(90/12/1、93/2/1)</p> <p>1. 對 lomefloxacin hydrochloride 易感性細菌所造成之結膜炎、眼瞼炎等之第二線用藥。</p> <p>2. 申報費用時需檢附細菌敏感試驗報告。</p> <p>14.5. 人工淚液：(87/7/1、93/2/1)</p> <p>1. 乾眼症病患經淚液分泌機能檢查(basal Schirmer test)至少單眼淚液分泌少於 5 mm 者。</p> <p>2. 因乾眼症導致角膜病變、暴露性角膜病變或其它相關之角膜病變必須時之使用。</p> <p>14.6. (刪除)(101/12/1)</p> <p>14.7. (刪除)(101/12/1)</p> <p>14.8. Ketorolac tromethamine (如 Acular Ophthalmic Solution)：(89/11/1) 限白內障手術後之眼部發炎使用。</p> <p>14.9. 其他 Miscellaneous</p> <p>14.9.1. (刪除) (95/6/1、104/5/1)</p> <p>14.9.2. 新生血管抑制劑 (Anti-angiogenic agents)：Verteporfin (如 Visudyne)及 Anti-VEGF 如 ranibizumab (Lucentis)、 aflibercept (Eylea) (100/1/1、101/5/1、102/2/1、103/8/1、</p> | <p>(Okacin)：(90/12/1、93/2/1)</p> <p>1. 對 lomefloxacin hydrochloride 易感性細菌所造成之結膜炎、眼瞼炎等之第二線用藥。</p> <p>2. 申報費用時需檢附細菌敏感試驗報告。</p> <p>14.5. 人工淚液：(87/7/1、93/2/1)</p> <p>1. 乾眼症病患經淚液分泌機能檢查(basal Schirmer test)至少單眼淚液分泌少於 5 mm 者。</p> <p>2. 因乾眼症導致角膜病變、暴露性角膜病變或其它相關之角膜病變必須時之使用。</p> <p>14.6. (刪除)(101/12/1)</p> <p>14.7. (刪除)(101/12/1)</p> <p>14.8. Ketorolac tromethamine (如 Acular Ophthalmic Solution)：(89/11/1) 限白內障手術後之眼部發炎使用。</p> <p>14.9. 其他 Miscellaneous</p> <p>14.9.1. (刪除) (95/6/1、104/5/1)</p> <p>14.9.2. 新生血管抑制劑 (Anti-angiogenic agents)：Verteporfin (如 Visudyne)及 Anti-VEGF 如 ranibizumab (Lucentis)、 aflibercept (Eylea) (100/1/1、101/5/1、102/2/1、103/8/1、</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>104/5/1、105/2/1、 105/7/1、105/11/1、 105/12/1) (附表二十九)</p> <p>本類藥品使用須符合下列條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未曾申請給付本類藥品者。 2. 須經事前審查核准後使用。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 第一次申請時需檢附一個月內之<u>病眼</u>最佳矯正視力(介於<u>0.05~0.5(含)</u>之間)、眼底彩色照片、FAG (fluorescein angiography)、OCT (optical coherence tomography)、及相關病歷紀錄資料。 (2) 經評估需續用者，再次申請時需檢附第一次申請資料及再次申請前一個月內有改善證明之相關資料。 3. 限眼科專科醫師施行。 4. <u>已產生中央窩下(subfoveal)結痂者不得申請使用。</u> 5. 依疾病別另規定如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 50歲以上血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(wAMD)：(101/5/1、105/12/1) <ol style="list-style-type: none"> I. 限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請。 II. 第一次申請時以3支為限，每眼給 | <p>104/5/1)(附表二十九)</p> <p>本類藥品使用須符合下列條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未曾申請給付本類藥品者。 2. 須經事前審查核准後使用： <ol style="list-style-type: none"> (1) 第一次申請時需檢附一個月內之最佳矯正視力，眼底彩色照片及 FAG (fluorescein angiography) OCT (optical coherence tomography)、及相關病歷紀錄資料。 (2) 經評估需續用者，再次申請時需檢附第一次申請資料及再次申請前一個月內有改善證明之相關資料。 3. 限眼科專科醫師施行。 4. <u>病眼最佳矯正視力介於0.05~0.5(含)之間。</u> 5. 依疾病別另規定如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 50歲以上血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(wAMD)：(101/5/1) <ol style="list-style-type: none"> I. Ranibizumab 及 aflibercept <u>僅能</u>擇一申請。 II. 第一次申請時以3支為限，每眼給付以7支為限，申請 | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>付以 7 支為限， 須於<u>第一次申請核准後 5 年內使用完畢。</u> (105/12/1)</p> <p>III. 若有需要排除多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變 (polypoidal choroidal vasculopathy, PCV) 之疑慮時，須執行並於申請時檢附 ICG (indocyanone green angiography)。</p> <p>IV. 必須排除下列情況：</p> <p>i. <u>血管新生型 wAMD</u> 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳。</p> <p>ii. 經確認為多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變 (PCV) (<u>註：aflibercept 適用於 PCV 部分請依 5.(3)辦理</u>)。</p> <p>iii. 高度近視，類血管狀破裂症 (angioid streaks)，或其他非 wAMD 所造成視網膜中</p> | <p>核准後<u>有效期限為 2 年。</u></p> <p>III. 若有需要排除多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變 (polypoidal choroidal vasculopathy, PCV) 之疑慮時，須執行並於申請時檢附 ICG (indocyanone green angiography)。</p> <p>IV. 必須排除下列情況：</p> <p>i. <u>已產生黃斑部結痂者。</u></p> <p>ii. <u>血管新生型 wAMD</u> 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳。</p> <p>iii. 經確認為多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變 (PCV)。</p> <p>iv. <u>高度近視，類血管狀破裂症</u></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>央窩 (fovea) 下之脈絡膜新生血管 (Choroidal neovascularization; CNV) (101/5/1)。</p> <p>(2)糖尿病引起黃斑部水腫 (diabetic macular edema, DME) 之病變：(102/2/1、103/8/1、105/2/1、105/11/1、105/12/1)</p> <p><u>I. 限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請。</u></p> <p><u>II. 中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) \geq 300 μm。</u></p> <p><u>III. 近三個月內之糖化血色素(HbA1c) 數值低於 10%，並於每次申請時檢附近三個月內之檢查結果。</u></p> <p><u>IV. 第一次申請以 5 支為限，每眼給付以 8 支為限，須於第一次申請核准後 5 年內使用完畢。</u> (105/2/1、105/12/1)</p> | <p>(angioid streaks)，或其他非 wAMD 所造成視網膜中央窩 (fovea) 下之脈絡膜新生血管 (Choroidal neovascularization; CNV) (101/5/1)。</p> <p>(2)糖尿病引起黃斑部水腫 (diabetic macular edema, DME) 之病變：<u>限 ranibizumab (Lucentis)</u> (102/2/1、103/8/1)</p> <p><u>I. 中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) \geq 300 μm。</u></p> <p><u>II. 近三個月內之糖化血色素(HbA1c) 數值低於 10%。</u></p> <p><u>III. 第一年每眼給付支數以 5 支為限，第二年給付支數以 3 支為限。</u></p> <p><u>IV. 每次申請時另需檢附下列資料：</u></p> <p><u>i. 近三個月內之糖化血色素(HbA1c) 數值。</u></p> <p><u>ii. 第一年連續使用 3 支後，經評估視力或中央視網膜厚度有改善而需續用者，後續 2 支需重新申請。</u></p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>V. 再次申請時，需檢附與第一次申請項目相同之各項最近檢查紀錄外，並檢送使用後有改善證明之相關資料。</u> (105/2/1、105/12/1)</p> <p><u>VI. 血管新生型 AMD 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳或因其他因素(如玻璃體牽引)所造成之黃斑部水腫不得申請使用。</u></p> <p>(3) 多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變(PCV)之用藥： (104/5/1、105/11/1、105/12/1)</p> <p><u>I. 限 verteporfin 及 aflibercept 擇一申請。</u></p> <p><u>II. Verteporfin 病灶限位於大血管弓內(major vessels archade)。</u></p> | <p><u>iii. 第二年重新申請時，需檢附過去二次申請及與第一次申請項目相同之各項最近檢查紀錄外，並檢送過去一年使用後有改善證明之相關資料。</u></p> <p><u>V. 有下列情況不得申請使用：</u></p> <p><u>i. 已產生中央窩下(subfoveal)結痂者。</u></p> <p><u>ii. 血管新生型 AMD 進展至視網膜下纖維化或 advanced geographic atrophy 者反應不佳或因其他因素(如玻璃體牽引)所造成之黃斑部水腫。</u></p> <p>(3) 多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變(PCV)之用藥： <u>Verteporfin(如 Visudyne)</u> (104/5/1)</p> <p><u>I. 病灶限位於大血管弓內(major vessels archade)。</u></p> <p><u>II. 每次申請給付 1 支，每次治療間隔至少 3 個月，每人每眼給付以 3 次為</u></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>III. <u>Verteporfin</u> 每次申請給付 1 支，每次治療間隔至少 3 個月，每人每眼給付以 3 次為上限；<u>aflibercept</u> 第一次申請時以 3 支為限，每眼給付以 7 支為限。須於第一次申請核准後 5 年內使用完畢。</p> <p>IV. 每次申請時需另檢附一個月內有效之 ICGA 照片、治療紀錄及病歷等資料。</p> <p>(4) <u>中央視網膜靜脈阻塞 (CRVO) 續發黃斑部水腫所導致的視力損害</u>：(105/7/1、105/11/1、105/12/1)</p> <p>I. <u>限 ranibizumab 及 aflibercept 擇一申請，且未曾申請給付 dexamethasone 眼後段植入劑者。</u></p> <p>II. <u>限 18 歲以上患者。</u></p> <p>III. <u>中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) $\geq 300 \mu\text{m}$。</u></p> <p>IV. <u>第一次申請時以 3 支為限，每眼最多給付 7 支，須於第一次申請核准後 5</u></p> | <p><u>上限，申請核准後之有效期限為二年。</u></p> <p>III. 每次申請時需另檢附一個月內有效之 ICGA 照片、治療紀錄及病歷等資料。</p> <p>IV. <u>已產生中央窩下 (subfoveal) 結痂者不得申請使用。</u></p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>年內使用完畢。</u> <u>(105/12/1)</u></p> <p><u>(5)病理性近視續發的脈絡膜血管新生所導致的視力損害：限</u> <u>ranibizumab</u> <u>(105/7/1、105/12/1)</u></p> <p><u>I. 限超過 600 度近視。</u></p> <p><u>II. 眼軸長大於 26mm。</u></p> <p><u>III. 因 CNV 病變而導致動態滲漏或中央視網膜內或視網膜下液。</u></p> <p><u>IV. 申請以一次為限，每眼最多給付 3 支，申請核准後有效期限為 5 年。</u></p> <p><u>V. 有下列情況者不得申請使用：</u></p> <p><u>i. 有中風病史。</u></p> <p><u>ii. 三個月內曾使用過類固醇眼內治療者。</u></p> <p>14. 9. 3. Cyclosporine 眼用製劑 (如 Restasis) (100/08/1、103/4/1、105/5/1) (附表二十七)</p> <p>限乾眼症嚴重程度為 <u>Level 3 以上</u>且符合下列各項條件之病患使用：(103/4/1、105/5/1)</p> <p>1. 淚液分泌測試 (Schirmer' s test without anesthesia) 少於 5mm/5min，需附檢查試紙。(103/4/1、105/5/1)</p> | <p>14. 9. 3. Cyclosporine (如 Restasis) (100/08/1、103/04/1) (附表二十七)</p> <p>限乾眼症嚴重程度為 <u>Level 4 或乾眼症嚴重程度為 Level 3</u>且符合修格蘭氏症候群診斷標準之下列病患使用：(103/04/1)</p> <p>1. 淚液分泌測試 (Schirmer' s test without anesthesia) : <u>嚴重乾眼症少於 2mm/5min，修格蘭氏症候群少於 5mm/5min，需</u></p> | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>2. 淚膜崩裂時間 (Tear Film Break-Up Time) 小於或等於 5 秒。 <u>(103/4/1、105/5/1)</u></p> <p>3. 送審時需檢附彩色外眼照片及螢光染色之照片 (顯示有嚴重角膜點狀上皮缺損，結膜充血染色且有絲狀角膜炎，角膜潰瘍，或眼瞼結膜粘連，角膜結膜角質化之情形)。</p> <p>4. 曾使用局部抗發炎藥物或淚點塞或人工淚液未見改善。<u>(105/5/1)</u></p> <p>5. 須經事前審查核准後使用，六個月審查一次。病人必須符合下列條件，方能續用： <u>(105/5/1)</u></p> <p>(1) <u>主述症狀改善：乾澀、畏光或產生眼睛分泌物。</u></p> <p>(2) <u>合併以下任一條件改善：</u></p> <p><u>I 淚液分泌測試。</u></p> <p><u>II 淚膜崩裂時間。</u></p> <p><u>III 角膜病變-螢光染色照片。</u></p> <p><u>IV 結膜充血或結膜染色-症狀改善。</u></p> <p>14. 9. 4. Dexamethasone intravitreal implant (如 Ozurdex)(<u>104/05/1、105/8/1</u>)</p> | <p>附檢查試紙。</p> <p>2. 淚膜崩裂時間 (Tear Film Break-Up Time) : <u>嚴重乾眼症為 immediate，修格蘭氏症候群為小於或等於 5 秒。</u></p> <p>3. 送審時需檢附彩色外眼照片及螢光染色之照片 (顯示有嚴重角膜點狀上皮缺損，結膜充血染色且有絲狀角膜炎，角膜潰瘍，或眼瞼結膜粘連，角膜結膜角質化之情形)。</p> <p>4. 曾使用局部抗發炎藥物或淚點塞未見改善。</p> <p>5. <u>視力功能檢查結果 < 0.6。</u></p> <p>6. <u>須經事前審查核准後使用，六個月審查一次，若未改善則需停藥。</u></p> <p>14. 9. 4. Dexamethasone intravitreal implant (如 Ozurdex)(104/05/1) <u>限用於非感染性眼後房葡萄膜炎病人，需符合下列條件：</u></p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. 用於非感染性眼後房葡萄膜炎病人，需符合下列條件：</p> <p>(1) 限地區醫院以上層級(含)之眼科專科醫師施行。</p> <p>(2) 需排除因感染性引起之眼後房葡萄膜炎如肺結核、梅毒、弓漿蟲等之感染。</p> <p>(3) 矯正後視力介於 0.05 和 0.5 之間。</p> <p>(4) 需符合下列治療方式之一：</p> <p>I. 葡萄膜炎之患者以口服類固醇控制病情，反應不良或仍有發炎與黃斑部水腫者，需輔以 cyclosporin 或其他全身性免疫抑制劑，經前述治療眼睛發炎仍無法控制者。</p> <p>II. 無法口服全身性藥物(類固醇或 cyclosporin)控制者：</p> <p>i. 懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>ii. 罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>iii. 身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症(sepsis)者。</p> <p>iv. 惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-</p> | <p>1. 限地區醫院以上層級(含)之眼科專科醫師施行。</p> <p>2. 需排除因感染性引起之眼後房葡萄膜炎如肺結核、梅毒、弓漿蟲等之感染。</p> <p>3. 矯正後視力介於 0.05 和 0.5 之間。</p> <p>4. 需符合下列治療方式之一：</p> <p>(1) 葡萄膜炎之患者以口服類固醇控制病情，反應不良或仍有發炎與黃斑部水腫者，需輔以 cyclosporin 或其他全身性免疫抑制劑，經前述治療眼睛發炎仍無法控制者。</p> <p>(2) 無法口服全身性藥物(類固醇或 cyclosporin)控制者：</p> <p>I. 懷孕或正在授乳的婦女。</p> <p>II. 罹患活動性的感染症的病患。</p> <p>III. 身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症(sepsis)者。</p> <p>IV. 惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>malignancy)的病患。</p> <p>v. 免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>vi. 曾因其他疾病服用上述口服全身性藥物，有嚴重併發症或後遺症者。</p> <p>(5) 每眼限給付 1 支。</p> <p>(6) 給付後六個月內不得使用 cyclosporin 藥品。</p> <p>(7) 需事前審查，並檢附病歷摘要及符合下列條件之一之診斷依據。</p> <p>I. 一個月內有效之 OCT 顯示中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) $\geq 300 \mu\text{m}$。</p> <p>II. 一個月內有效之 FAG (fluorescein angiography) 看到血管明顯滲漏現象或黃斑部囊狀水腫。</p> <p>2. 用於中央視網膜靜脈阻塞 (CRVO) 導致黃斑部水腫，需符合下列條件： (105/8/1)</p> <p>(1) 未曾申請給付新生血管抑制劑 (anti-angiogenic agents) 者。</p> <p>(2) 限眼科專科醫師施</p> | <p>malignancy) 的病患。</p> <p>V. 免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。</p> <p>VI. 曾因其他疾病服用上述口服全身性藥物，有嚴重併發症或後遺症者。</p> <p>5. 每眼限給付 1 支。</p> <p>6. 給付後六個月內不得使用 cyclosporin 藥品。</p> <p>7. 需事前審查，並檢附病歷摘要及符合下列條件之一之診斷依據。</p> <p>(1) 一個月內有效之 OCT 顯示中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) $\geq 300 \mu\text{m}$。</p> <p>(2) 一個月內有效之 FAG (fluorescein angiography) 看到血管明顯滲漏現象或黃斑部囊狀水腫。</p> | |
|---|---|--|

行。

(3) 病眼最佳矯正視力介於 0.05~0.5(含)之間。

(4) 限 18 歲以上患者。

(5) 中央視網膜厚度 (central retinal thickness, CRT) \geq 300 μ m。

(6) 已產生中央窩下 (subfoveal) 結痂者不得申請使用。

(7) 須經事前審查核准後使用。

I. 第一次申請時需檢附一個月內之最佳矯正視力、眼底彩色照片、FAG (fluorescein angiography)、OCT (optical coherence tomography) 及相關病歷紀錄資料。

II. 經評估需續用者，再次申請時需檢附第一次申請資料及再次申請前一個月內有改善證明之相關資料。

III. 第一次申請以 2 支為限，每眼最多給付 4 支，申請核准後有效期限為 2 年。

(現行規定)全民健康保險降血脂藥物給付規定表

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表

| | 非藥物治療 | 起始藥物治療血脂值 | 血脂目標值 | 處方規定 |
|-------------|-------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 心血管疾病或糖尿病患者 | 與藥物治療可並行 | TC \geq 160mg/dL 或 LDL-C \geq 100mg/dL | TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL | 第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次， |
| 2 個危險因子或以上 | 給藥前應有 3-6 個月非藥物治療 | TC \geq 200mg/dL 或 LDL-C \geq 130mg/dL | TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL | 第二年以後應至少每 6-12 個月抽血 |
| 1 個危險因子 | 給藥前應有 3-6 個月非藥物治療 | TC \geq 240mg/dL 或 LDL-C \geq 160mg/dL | TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL | 檢查一次，同時請注意副作用之產生 |
| 0 個危險因子 | 給藥前應有 3-6 個月非藥物治療 | LDL-C \geq 190mg/dL | LDL-C<190mg/dL | 如肝功能異常，橫紋肌溶解症。 |

● 心血管疾病定義：

- (一) 冠狀動脈粥狀硬化病人：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)
- (二) 缺血型腦血管疾病病人包含：
 1. 腦梗塞。
 2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)
 3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)

● 危險因子定義：

1. 高血壓
2. 男性 \geq 45 歲，女性 \geq 55 歲或停經者
3. 有早發性冠心病家族史(男性 \leq 55 歲，女性 \leq 65 歲)
4. HDL-C<40mg/dL
5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。

全民健康保險降三酸甘油酯藥物給付規定表

| | 非藥物治療 | 起始藥物治療三酸甘油酯值 | 三酸甘油酯目標值 | 處方規定 |
|-------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| 心血管疾病或糖尿病病人 | 與藥物治療可並行 | TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL) | TG<200mg/dL | 第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每 6-12 個月 |
| 無心血管疾病病人 | 給藥前應有 3-6 個月非藥物治療 | TG \geq 200mg/dL 且 (TC/HDL-C>5 或 HDL-C<40mg/dL) | TG<200mg/dL | 抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。 |
| 無心血管疾病病人 | 與藥物治療可並行 | TG \geq 500mg/dL | TG<500mg/dL | |

(現行規定) 法布瑞氏症心臟變異型心臟功能評估指標表

| | |
|---|--|
| 1 | 左心室厚度>12mm。 |
| 2 | 心電圖左心室肥厚 (ECG LVH Romhilt-Estes score>5 或符合 Cornell's criteria) |
| 3 | 心臟超音波左心室質量指數 (LVMI) 男性大於 134 gm/m ² , 女性大於 110gm/m ² LVMI。 |
| 4 | 心臟超音波左心室舒張功能異常 E/A ratio>2.0 及 deceleration time<150 msec 或組織超音波顯示舒張功能異常(二尖瓣環部中膈 E/E' >15 或側壁 E/E' >12). |
| 5 | 間隔至少超過 12 個月測量左心室質量 (LVM) 增加>5g/m ² |
| 6 | 心臟超音波左心房體積增加, parasternal long axis view(PLAX)>33 mm, in four chamber view>42 mm. |
| 7 | 心肌與節律出現異常: AV block, short PR interval, LBBB, ventricular or atrial tachyarrhythmias, sinus bradycardia(在沒有使用抑制心律的藥物下) |
| 8 | 中度到重度的二尖瓣與主動瓣膜閉鎖不全 |
| 9 | 心臟磁振造影心肌延遲顯影(delayed enhancement)出現左心室的輕度到中度纖維化。 |

(現行規定)

全民健康保險呼吸道疾患吸入製劑給付規定表

| | 固定劑量吸入劑(MDI)(91/8/1) | 粉狀吸入劑(DPI) | 液態吸入劑 (nebulizer) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 乙二型擬交感神經劑 (β_2 -agonists) | 一、一般使用頻率每日四到六次。 二、每月最大劑量為 180 劑 (puff)。 三、不建議長期規則使用。 四、長效劑型每日兩次(BID)，限中度持續性以上之哮喘及中等嚴重以上之慢性阻塞性肺疾病患者使用，不建議急性發作時使用，每月至多使用一支，開立時病歷上應詳細記載氣喘發作狀況及尖峰呼氣流速之數據。 | 使用劑量及調整方式同固定劑量吸入劑(MDI)。 | 一、阻塞性肺疾病急性發作時，每 20 分鐘至一小時使用一次。 二、急性症狀消失後恢復為每日四到六次。 三、視情況繼續居家使用，每次處方以一週為限。 四、每月最大劑量為 60 小瓶(vial)。 |
| 抗膽鹼劑 (anticholinergics) | 一、一般性使用為每日四到六次。 二、每月最大劑量為 180 劑 (puff)。 三、如配合儲備艙(spacer)或間歇液態吸入劑的使用，則每月使用劑量可以降低。 | | 一、阻塞性肺疾病急性發作時，每 20 分鐘至一小時使用一次。 二、急性症狀消失後恢復為每日四到六次。 三、視情況(*)繼續居家使用，每月最大劑量為 120 小瓶(vial)。 |
| 類固醇藥物吸入劑 (steroid inhalants) | 一、維持劑量視個人而定，一般建議為每日 200-800 mcg。 二、病況不穩時可加倍劑量，三到五日後回復到 200-800 mcg 的建議維持劑量。 三、最大處方量每個月兩瓶，需註明上次取藥日期。 | 使用劑量及調整方式同固定劑量吸入劑(MDI)。 | 一、阻塞性肺疾病併有其他不適合口服、靜脈注射的狀況、具有人工呼吸道需要使用類固醇的狀況。 二、拔管後、使用固定劑量吸入劑或粉狀吸入劑效果不彰、或使用技巧無法配合等狀況使用。 三、適應症或狀況消失後應儘速改用其他劑型，一般使用以不超過一週為原則。 |

***小容積化霧器或液態吸入劑**

- 一、病人被判斷為無法有效地操作固定劑量吸入劑 (MDI) 裝置
- 二、病患肺活量低於 $7 \text{ mL} \times 1.5/\text{kg}$ 或吸氣流量 (inspiratory flow) 低於每分鐘 30 公升，或停止呼吸之能力低於 4 秒時。
 - 三、使用固定劑量吸入劑之病患，反覆發作急性呼吸道阻塞損及使用此裝置之能力。
- 四、使用固定劑量吸入劑或粉狀吸入劑 (DPI) 效果並不理想時，亦可使用小容積化霧器或液態吸入劑，惟必須定期評估。

(現行規定)

全民健康保險兒童呼吸道疾患吸入製劑給付規定表

| | 固定劑量吸入劑 (MDI) | 粉狀吸入劑(DPI) | 液態吸入劑 (Nebulizer) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 乙二型擬交感神經劑 (β_2 -agonists) | 一、需要時才使用，不建議長期規則使用。 二、每日最多六次(puffs)，每月最多一百次。 三、長效劑型每日一至兩次 (BID)，急性發作不建議使用。 | 使用劑量及調整方式同固定劑量吸入劑(MDI)。 | 一、阻塞性肺病(如氣喘、哮喘等)急性發作時，每二十分至二小時使用一次。 二、急性症狀緩解後治療，有需要才使用，每日最多六次，每月最高用量三十次。 三、氣喘病人可合併使用吸入性類固醇，可減少長期使用。 四、視情況居家使用，以二天為限。 |
| 抗膽鹼劑 (anticholinergics) | 一、一般性使用為每日四到六次。 二、每月最大用量一百次，配合 spacer 使用，使用劑量可以降低。 | | 一、阻塞性肺病(如氣喘、哮喘等)急性發作時，每二十分至二小時使用一次。 二、沒有急性重症發作時，每月用量三十次以內。 |
| 類固醇藥物吸入劑 (steroid inhalants) | 一、有需要應規則使用，配合簡易尖峰吐氣量計 (PEFR) 調整。 二、維持劑量在每日 50-800 mcg。 三、每月最大用量一至二瓶。 | 使用劑量及調整方式同固定劑量吸入劑(MDI)。 | 一、阻塞性肺病(如氣喘、哮喘等)急性發作，在確定診斷下，每十二小時使用一劑(0.05mg/kg，上限 2mg/次)。 二、拔管前後之病人，亦適合使用，不超過二天。 三、使用一至三天後，應轉成其他 MDI 劑型使用。超過三天使用，應說明理由。 |

*MDI 使用於年紀小者，可配合 spacer 或 aerochamber 使用。