

裁判醫師 _____


是非題(十題，各五分)

- (O) 1. 專業局部塗氟，因學童蛀牙較嚴重。雖然健保只提供 6 歲前每半年塗氟一次，但是我們會建議這種學童，每三個月塗一次。
- (X) 2. 較易齲齒的兒童以及齒列矯正中的患者，可使用市售的漱口水，以預防蛀牙。
- (O) 3. 專業局部塗氟，濃度很高，換算下來，含氟濃度也只有 0.85%~2.26%，所以還是非常安全的。
- (X) 4. 窩溝封填目前全面補助民國 96 年 09 月 02 日以後出生的弱勢兒童。
- (O) 5. 在牙醫師施作好窩溝封填的牙齒，建議六個月回診，讓牙醫師再次進行評估檢查。
- (O) 6. 遺傳與嚴重齲齒是造成齒列不整的一大原因。
- (X) 7. 嬰兒出生後，大約長好上面 4 顆門牙及下面 4 顆門牙後，就應該立即帶去看牙，並作專業塗氟及檢查。
- (X) 8. 一般牙刷無法將牙結石洗掉，要使用跟牙醫診所用的超音波洗牙機同原理的超音波電動牙刷才能清除。
- (X) 9. 12 歲以下的兒童 3-6 個月做檢查一次，12 歲以上的成人 6-12 個月做檢查一次。
- (O) 10. 蛀牙的初期，是不會有任何疼痛感的。

填空題(十格，各五分)

1. 6 歲齒是指 乳牙 / 恒牙 (圈對的) 的 第一大臼齒 (哪一顆牙)

2. 口腔疾病預防的對策有六(1)做好口腔清潔(2)均衡的飲食(3) 諮詢牙醫師
(4) 定期檢查 (5) 窩溝封填的使用 (6) 氟化物的使用



3. 這個是什麼？琺瑯質/牙釉質

4. 這是蛀牙的示意圖：造成蛀牙是 脫鈣 (作用) > 再鈣化 (作用)

5.依照牙醫師建議的含氟狀況，請選出可用的牙膏或漱口水。(有兩個全對才給分)

AC

A.牙膏

: 牙齦牙周雙護理牙膏
: P-statin 抗菌護齒成分、Zinc Citrate、Allantoin、Sodium fluoride (1300-1450ppm 符合法規規範)。
: 每天至少2次，搭配正確刷牙方式，建議於起床後、飯後及睡前使用，可保持口腔健康。
: 請存放於乾燥陰涼處，避免陽光照射。
: 不可大量吞食，請置於幼兒無法取得處。
每次使用後請將封蓋蓋上，確保牙膏能發揮最佳功效。
: 標示於外盒(月/日/年) 保存期限：3年

B.牙膏

主要成分：日本四國天然冰鹽(Sodium Chloride天然顆粒結晶)、G酸(Dipotassium Glycyrrhizinate)、山梨醇、天然薄荷、香料等。
用途：口腔清潔保健
使用方法：成人每次用量約擠1~2公分；配合正確刷牙習慣，效果最佳。
注意事項：請勿大量吞食。

C.牙膏

成 分：花椒、防風、薄荷葉、旱蓮草、生地黃、白蒺藜、
香附、沒食子、單氟磷酸鈉 0.829% w/w(1095ppm F⁻)、
水、山梨醇、磷酸氫鈣、二氧化矽、甘油、硫酸月桂酯鈉、
氯化鈉、木糖醇、羧甲基纖維素鈉、
薄荷腦、羥乙基纖維素、生石膏、苯甲酸鈉、香精
保存方式：密封置於陰涼乾燥處，避免日光直射，並置於6歲以下兒童無法取得處。

D.牙膏

主成分：活性氟化物(氟化鈉約500 ppm F⁻)、木糖醇、山梨醇、香料等。
用途：口腔清潔保健 規格：兒童專用 原產地：印尼
保存期限：三年 製造日期：標示於盒蓋上及軟管尾(連續六碼為西元末二碼年年/月月/日日)
使用方法：6歲以下幼兒請家長陪同指導每次用量約擠一粒豌豆大小。
保存方法：存放於陰涼處 注意事項：
請勿大量吞食，使用後漱口及吐出。請置於6歲以下幼兒無法取得處。
外包裝盒請於牙膏用完後才丟棄，使用上如有問題請打服務電話詢問。

E.漱口水

含 Chlorhexidine 口腔抗菌配方
含高單位氟化物及長效抗菌配方Chlorhexidine，能鞏固牙齒琺瑯質，常保口齒清新及口腔潔淨，完整護理口腔健康。

主要成份：Chlorhexidine Gluconate 抗菌素、Sodium Fluoride 氟化鈉、Xylitol 木糖醇、Menthol 薄荷腦、Glycerin 甘油、Alcohol 乙醇
使用方法：起床後、用餐後及睡前使用。每次取出15-20ml (約一瓶蓋)，徹底漱口約30秒，即可吐出
注意事項：
■ 不可吞服，使用後30分鐘內請勿飲食
■ 請置於孩童無法取得處以免誤食
■ 口腔潰瘍者請勿使用含酒精成分漱口水

本產品為非藥物性產品，請在大人指導下使用