

國小學童含氟漱口水防齲計畫 漱口水預防誤吞及誤吞處置作業須知(Ver. 106)

預防誤吞

1. 由老師宣導預防誤吞與誤吞處置，於施行前再次加強宣導。
2. 施行時老師務必於現場控管，必要時採取口令動作施行。
3. 漱口水由老師統一管理(存放教室時)，並放置於學童不易取得之陰涼處。

誤吞處置/流程

1. 大量誤吞含氟漱口水之學童(20 公斤的學童一次喝 100c. c.，以此類推)。
2. 小量誤吞(10c. c.)。

誤吞時之處置(由老師或校護協助處理)

1. 瞭解誤吞狀況(大量誤吞或小量誤吞)。
2. 發生誤吞時由老師協助給予誤食學童飲用牛奶(200ml 以上)，以減緩氟化物之吸收。
3. 協助安撫情緒及持續追蹤學童身體狀況。

大量誤吞

1. 回報校護與紀錄。
2. 送往鄰近之醫院做進一步處置。
3. 通知學童家長，及後續追蹤。

小量誤吞(10c. c.)

1. 回報校護與紀錄。
2. 關心學童身體狀況，若有不適依大量誤吞處置。

通報

1. 通報所屬縣市牙醫師公會。
2. 通報牙醫全聯會並述明狀況，以利後續處理。

※通報專線：**02-25000133**

協助

由縣市公會口衛主委協助瞭解，並配合全聯會協助處理及關心學童。

1. 通知含氟漱口水生產廠商。
2. 提採樣檢驗(報告)結果。
3. 處置結果回報衛生福利部。

1. 案件紀錄。
2. 知會口衛主委及相關人員。
3. 誤吞紀及處置紀錄附於年度報告。