

勘誤表

頁數	錯誤	更正
p. 13 第二段第三行	為生物膜（Biofilm）。	為生物膜（Biofilm），換言之，牙菌斑可視為生物膜的一種。
p. 14 圖二	牙菌斑酸鹼值細菌「總」類	牙菌斑酸鹼值細菌「種」類
p. 15 增加圖示編碼	齲齒總是發生在不易清潔處及口水較少的位置。而剛萌出的牙齒由於鈣化未完全成熟，是最容易造成齲齒的階段。   • 咬合面上溝隙的齲齒 • 鄰接面齲齒  • 上顎門牙區齲齒	齲齒總是發生在不易清潔處（圖四、圖五）及口水較少的位置（圖六）。而剛萌出的牙齒由於鈣化未完全成熟，是最容易造成齲齒的階段。   • （圖四）咬合面上溝隙的齲齒 • （圖五）鄰接面齲齒  • （圖六）上顎乳門牙區齲齒
p. 16 第二段第二行	此外，齲風險評估…	此外，齲「齒」風險評估…
p. 26 第二段第三行	但事實上胎兒時期第十八個月左右	但事實上胎兒時期第十八「週」左右

Q & A

Q： 有關 p. 31、p. 33 窩溝封填的疑慮？

A： 窩溝封填可為預防或合併治療使用。

Q： p. 28 中牙菌斑中的氟化物之疑義？

A： 使用氟化物後，牙菌斑內亦會有氟化物且其濃度會高於口水中氟化物的濃度。氟化物預防齲齒之功能就是由存在於牙菌斑中的氟化物所進行的。