

選擇題(每題 5 分)

- (3) (1) 為了減少蛀牙的機會，我們要盡量避開易致齲食物，以下哪個食物是可以當作取代食物使用？
1. 水果罐頭
 2. 蜂蜜水
 3. 玉米
 4. 葡萄乾
- (4) (2) 牙刷的刷頭選擇較小為宜，過大的刷頭會妨礙哪裡的清潔？
1. 門牙
 2. 犬齒
 3. 小白齒
 4. 大白齒
- (1) (3) 含氟牙膏具有實質的預防齲齒的效果，需要含氟 1000ppm 以上。若使用濃度小於 500ppm 的含氟牙膏，以下效果何者錯誤？
1. 能改善口腔清潔
 2. 不能預防齲齒的效果
 3. 不能降低牙周疾病
 4. 會增加齲齒的危險性
- (4) (4) 小朋友第一次看牙的時間，以下哪一個較不妥？
1. 出生後 9 個月
 2. 出生後 11 個月
 3. 出生後 12 個月
 4. 出生後 13 個月
- (4) (5) 三歲以下的孩子所發生的嚴重齲齒，我們俗稱為奶瓶性齲齒。以下敘述何者正確？
1. 現稱早發性幼兒齲齒
 2. 夜間餵奶後，未徹底潔牙，易會發生奶瓶性齲齒。
 3. 每天進食超過 5 次，及每次進食超過 30 分鐘，易發生奶瓶性齲齒。
 4. 以上皆是
- (1) (6) 我們在使用專業塗氟中，有每三個月塗氟一次的資格者，以下何者有誤？
1. 未滿 12 歲之中低收入戶
 2. 身心障礙
 3. 設籍原住民族地區
 4. 偏遠及離島地區兒童

- (2)(7)意外受傷的牙齒經過醫師處置後恢復到原位，接下來如果發生以下的哪種狀況，是不需要儘速回程檢查的？
1. 牙齒疼痛
 2. 牙齒敏感
 3. 牙肉長膿包
 4. 牙齒變色
- (2)(8)孩童齲齒風險評估表中，哪個因子不屬於高度風險因子？
1. 每天超過三次的餐間含糖飲料或點心
 2. 身心障礙者
 3. 口內零蛀牙，零缺牙，但有兩顆填補過的牙齒
 4. 照顧者為低社經地位者
- (2)(9)年齡有別的潔牙技巧，以下何者不正確？
1. 0-3 歲，父母用紗棉布潔牙
 2. 3-6 歲，小朋友刷一次，家長加強重點
 3. 6-9 歲，學習貝式刷牙法
 4. 9-18 歲，小朋友自己刷，家長監督
- (4)(10)窩溝封填的流程中，以下哪個為第一步驟？
1. 酸蝕
 2. 窩溝封劑
 3. 照光硬化
 4. 隔離

填充題(每格 5 分)

1. 牙膏的內容成分主要成分為水、研磨劑、濕潤劑，分別佔有大約 20-40%。
2. 牙周組織是指牙齒周圍支持的組織，包含了牙周韌帶、齒槽骨及牙齦。
3. 牙冠結構由外而內為 牙釉質(琺瑯質)、牙本質(象牙質)、牙髓。
4. 在運用氟化物預防齲齒方法中的局部性使用方式有那幾種使用方法？
1. 含氟牙膏(含氟濃度 1000ppm 以上) 2. 含氟漱口水 3. 專業塗氟 等。
5. 兒童牙齒意外傷害中，如果恆齒脫落，我們應該將牙齒保存在濕潤狀態中，例如保存在牛奶、生理食鹽水或含於口中舌下，帶到附近的牙醫診所進行治療。