

課後測驗

題號	問題	答案
Q1	所有的骨鬆藥物都會引起 MRONJ? (T/F)	F
Q2	骨質疏鬆症本身就是 MRONJ 的危險因子? (T/F)	T
Q3	根據國際學術指引 (如 AAOMS) , 診斷藥物相關顎骨壞死 (MRONJ) 必須符合特定條件。關於其臨床特徵, 下列敘述何者正確? (單選) (A) 患者目前或曾經使用過抗骨吸收藥物或抗血管新生藥物 (B) 顎骨暴露於口腔內, 或可經由瘻管探測到骨頭, 且病灶持續超過 4 週 (C) 病灶處必須曾接受過頭頸部放射線治療 (D) 只要影像學檢查發現骨硬化, 即可確診為 MRONJ, 不需臨床骨暴露	A
Q4	因為顎骨壞死發生機率不高, 針對即將接受抗骨吸收療法 (ART) 的患者, 最佳的風險管理策略是先啟動藥物治療, 待患者出現牙科需求時再轉診至牙科進行口腔評估。 (T/F)	F
Q5	攝護腺癌症造成的骨轉移, 最常見(the most common)的型態是 (A) Osteolytic metastasis (B) Osteoblastic metastasis (C) Osteoporosis (D) None of above	B
Q6	How to prevent jaw necrosis before Bone-Targeted therapy?: (A) See dentist before beginning bone-targeted therapy (B) Pursue optimal preventative dental care (C) Practice good oral hygiene (D) All of above	D
Q7	拔牙後最易產生顎骨壞死之部位為上顎前牙區。 (T/F)	F
Q8	與雙磷酸鹽類藥物比較, 單株抗體抗骨吸收藥的優點是不會產生顎骨壞死。 (T/F)	F
Q9	藥物相關顎骨壞死 (MRONJ) 最常見的誘發牙科處置為何? (A) 洗牙 (B) 補牙 (C) 拔牙 (D) 牙齒矯正	C
Q10	根據目前多數國際指引, 對於接受骨質疏鬆低劑量抗骨吸收藥物治療的患者, 下列何者為較適當的處置原則? (A) 牙科治療應全面避免 (B) 優先保守治療並盡量保留牙齒 (C) 所有牙科手術均需停藥半年 (D) 不可進行根管治療	B