2026年全國國小學童潔牙觀摩-知識測驗

一、是非題：

1. （O）護牙親善院所除了預防保健與牙科治療，也能在孩子需要進一步診療時，提供轉診至專科醫師院所的服務。

2. （X）孩童的乳牙全部萌出後，上、下顎合計共有16顆乳牙。

3. （X）第一顆乳牙通常約在出生後一個月萌發。

4. （O）俗稱「六歲齒」的恆牙第一大臼齒，萌出位置在第二乳臼齒的後方。

5. （X）牙冠的組織由外到內，依序是牙釉質、牙本質及牙齦。

6. （X）牙周韌帶位於牙根與舌頭之間，能緩衝咬合力並協助穩固牙齒。

7. （X）牙菌斑的酸性恢復中性後，口水使礦物質重新沉積於牙齒的修復過程，稱為去礦化。

8. （O）0至3歲兒童若屬齲齒高度風險，且家長能配合照護，建議每3個月回診，並持續接受飲食與口腔照護指導。

9. （X）頻繁吸奶嘴或吸手指會影響前牙咬合，建議等到六歲開始戒除。

10. （O）上、下門牙的前後差距過大，俗稱「暴牙」；差距大於6mm時，較容易因意外碰撞而受傷。

11. （O）牙齒外傷經治療後，即使沒有疼痛、膿包或變色，也應依牙醫師指示定期回診追蹤，觀察後續變化。

12. （X）含氟漱口水每日使用型約含氟225ppm，其氟化鈉濃度為0.2%。

13. （X）飲用水含氟濃度低於0.3ppm，經牙醫師評估需補充氟錠時，3歲至未滿6歲兒童的建議每日補充氟量為0.25mg。

14. （O）飲食管理除了選擇較不易致齲的食物，也要控制進食頻率，減少正餐間點心的次數。

15. （X）乳牙與恆牙共用相連的神經，因此乳牙接受根管治療後，恆牙也會失去神經。

16. （O）6至12歲學齡兒童的定期口腔檢查，要注意換牙順序、齲齒、咬合與外傷等問題，一般建議間隔3個月。

<請翻背面>

續是非題：

17. （X） 0至3歲幼兒由家長負責潔牙時，應採用貝氏刷牙法。

18. （O） 牙縫空間較大，或牙齒鄰接面凹陷、不規則而使牙線不易清潔時，可使用牙間刷協助清潔。

19. （X） 2017年窩溝封填防齲計畫的兩次施作後評估，分別安排在6個月與18個月。

20. （X） 窩溝封填施作2年後，恆牙大臼齒齲齒發生率約降低1至5%。

二、選擇題：

21. （1） 護牙親善院所由孩童、家長與醫療專業人員共同參與，其口腔健康照護以什麼為中心？
①家庭 ②學校行政 ③牙科器械 ④牙科藥品

22. （1） 能緩衝咬合力的牙周韌帶，位於牙根與哪一種組織之間？
①齒槽骨 ②舌頭 ③牙冠 ④嘴唇

23. （4） 附著於牙齒表面、群聚生長的牙菌斑，屬於哪一種細菌群結構？
①牙釉質 ②牙骨質 ③牙髓 ④生物膜

24. （2） 窩溝封填劑能深入臼齒咬合面凹槽，主要利用材料的哪一種特性？
①黏住食物的能力 ②流動性 ③產酸能力 ④磨耗性

25. （3） 學童已服用氟錠時，不需再使用哪一項來重複補充氟？
①牙線 ②牙刷 ③氟鹽 ④窩溝封填